

Olopatadine Hydrochloride (1mg/ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Patanol
2. Bagaimana Patanol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Patanol
4. Cara menggunakan Patanol
5. Semasa menggunakan Patanol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Patanol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Patanol

Patanol digunakan untuk rawatan tanda-tanda dan simptom konjunktivitis (keradangan mata) yang disebabkan alahan.

Bagaimana Patanol berfungsi

Patanol berfungsi dengan mengurangkan intensiti reaksi alergi.

Sebelum menggunakan Patanol

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Patanol

Jika anda alah kepada olopatadine atau mana-mana ramuan lain ubat ini.

Jika ini berkenaan dengan anda, jangan gunakan Patanol dan beritahu doktor anda.

Kanak-kanak dan remaja (bawah 18 tahun)

Patanol boleh digunakan pada kanak-kanak atau remaja antara umur 3 tahun dan 18 tahun dengan dos yang sama seperti untuk orang dewasa.

Orang tua (65 tahun ke atas)

Anda boleh menggunakan Patanol jika anda berumur 65 tahun ke atas dengan dos yang sama seperti orang dewasa lain.

Kehamilan dan menyusu

Sekiranya anda hamil atau sedang menyusu, anda fikir anda mungkin mengandung atau merancang untuk

mendapatkan bayi, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum menggunakan ubat ini.

- Sebelum mula menggunakan Patanol

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Patanol.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang menggunakan, baru-baru ini menggunakan atau mungkin menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Patanol

- Berapa banyak harus digunakan

Dos yang dicadangkan ialah 1 titis dalam setiap mata yang terjejas.

- Bila perlu digunakan

Gunakan dua kali sehari atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda terlupa menggunakan Patanol, menggunakan dos yang seterusnya seperti yang dirancang.

Walau bagaimanapun, sekiranya sudah hampir masanya bagi dos yang seterusnya, abaikan dos yang terlupa dan kembali ke jadual dos biasa anda.

Jangan menggunakan dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda menggunakan Patanol lebih banyak daripada yang anda perlu, bilas dengan air suam. Jangan menggunakan lebih banyak lagi titisan sehingga sampai masanya untuk dos biasa yang seterusnya.

Semasa menggunakan Patanol

- Perkara yang perlu dilakukan

- Hanya menitis Patanol pada mata anda sahaja.
- Setelah penutup ditanggalkan, jika kolar botol menjadi longgar, keluarkannya sebelum menggunakan ubat ini.
- Jika titsan terlepas mata anda, cuba lagi.
- Apabila menutup kelopak mata selama 2 minit (menggunakan oklusi nasolacrimal), penyerapan ubat di bahagian badan lain (penyerapan sistemik) akan berkurangan. Ini boleh mengurangkan kesan sampingan umum yang menjejaskan bahagian badan yang lain dan meningkatkan aktiviti pada mata yang terjejas.
- Pastikan botol ditutup rapat apabila tidak digunakan.
- Sekiranya terdapat lebih daripada satu ubat mata digunakan, biarkan sekurang-kurangnya 5 minit antara setiap ubat. Salap mata perlu digunakan terakhir.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Patanol kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Untuk mengelakkan kontaminasi, penghujung penitis mata harus dielakkan menyentuh mana-mana permukaan. Penghujung penitis mata tidak harus menyentuh mata kerana ini mungkin mengakibatkan kecederaan pada mata.
- Jangan memakai kanta sentuh jika mata anda merah.
- Patanol tidak harus digunakan untuk merawat kerengsaan mata diakibatkan oleh kanta sentuh.

Patanol mengandungi benzalkonium chloride

Pengawet dalam Patanol (benzalkonium chloride) boleh menyebabkan iritasi mata dan mengubah warna kanta sentuh lembut. Sekiranya anda memakai kanta sentuh, anda harus mengeluarkannya sebelum menggunakan Patanol dan tunggu sekurang-kurangnya 15 minit sebelum memakai kanta sentuh mata anda kembali.

Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan mengenai penggunaan ubat ini, sila tanya doktor atau ahli farmasi atau jururawat anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Patanol boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan-kesan sampingan berikut telah didapati dengan penggunaan ubat titis mata Olopatadine:

Biasa: boleh menjejaskan sehingga 1 dalam setiap 10 orang

- Kesan pada mata: ketidakselesaan mata

Tidak biasa: boleh menjejaskan sehingga 1 dalam setiap 100 orang

- Kesan di mata: keradangan permukaan mata sama ada dengan atau tanpa kelukaan pada permukaan (tanda 'punctate keratitis'), sakit mata, mata kering, penglihatan kabur, bengkak kelopak mata, mata gatal, lelehan mata, kemerahan mata.
- Kesan sampingan umum: sakit kepala, perubahan rasa ('dysgeusia'), kekeringan hidung, keletihan ('fatigue')

Jarang berlaku: boleh menjejaskan sehingga 1 dalam setiap 1,000 orang

- Kesan di mata: peningkatan sensitiviti kepada cahaya ('photophobia'), , kemerahan kelopak mata.
- Kesan sampingan umum: pening, ruam gatal ('contact dermatitis').

Kekerapan tidak diketahui: frekuensi tidak dapat dianggar daripada data yang tersedia

- Kesan di mata: mata berair (peningkatan pengeluaran air mata).
- Kesan sampingan umum: alergi, mual.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Patanol

- Penyimpanan

- Jangan simpan pada suhu melebihi 30 °C.
- Pastikan botol ditutup dengan ketat apabila tidak digunakan.
- Jangan gunakan ubat ini sekiranya melebihi tarikh luput yang dinyatakan pada bungkusan.
- Buangkan 4 minggu selepas pembukaan pertama.
- Jauhi daripada penglihatan dan jangkauan kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Larutan titisan mata.
Larutan steril yang tidak berwarna atau kuning pucat.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

1.11 mg olopatadine hydrochloride dalam satu mL larutan (0.1% w/v)

- Bahan tidak aktif

Benzalkonium chloride, sodium chloride, disodium phosphate dodecahydrate, sodium hydroxide dan/atau hydrochloric acid, purified water.

- Nombor MAL

MAL20031912ARZ

Pengilang

Novartis Manufacturing N.V.,
Rijksweg 14
2870 Puurs-Sint-Amands,
Belgium

Pemegang Pendaftaran Produk

Novartis Corporation (Malaysia) Sdn. Bhd.

Level 18, Imazium,
No. 8, Jalan SS21/37,
Damansara Uptown,
47400 Petaling Jaya, Selangor

Informasi dikeluarkan

17 Jul 2020

Tarikh kemaskini RiMUP

23/02/2025

Nombor Siri

NPRA (R1/3) 04032025/045