

NEVANAC Ophthalmic Suspension

Nepafenac 0.1% w/v

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Nevanac
2. Bagaimana Nevanac berfungsi
3. Sebelum menggunakan Nevanac
4. Cara menggunakan Nevanac
5. Semasa menggunakan Nevanac
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Nevanac
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Nevanac

Nevanac mengandungi bahan aktif nepafenac, dan merupakan jenis ubat *non-steroidal anti-inflammatories* (NSAIDs).

Nevanac digunakan untuk merawat kesakitan dan keradangan yang berkaitan dengan pembedahan katarak. Mengurangkan risiko selepas makula operasi edema (bengkak pada makula, bahagian tengah retina yang terletak di bahagian belakang mata) yang berkaitan dengan pembedahan katarak pada pesakit kencing manis.

Bagaimana Nevanac berfungsi

Nevanac mengurangkan kesakitan dan keradangan yang berkaitan dengan pembedahan katarak.

Sebelum menggunakan Nevanac

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Nevanac:

- sekiranya anda mempunyai alahan terhadap Nepafenac atau kandungan yang lain dalam produk ini
- sekiranya anda mempunyai alahan kepada *non-steroidal anti-inflammatories* (NSAIDs)
- sekiranya anda pernah menghidapi asma, alahan kulit, atau keradangan teruk di hidung anda apabila menggunakan NSAID lain. Contohnya, acetylsalicylic acid, ibuprofen, ketoprofen, piroxicam, diclofenac.

- Sebelum menggunakan Nevanac

Sila beritahu doktor, ahli farmasi atau jururawat anda sebelum menggunakan Nevanac jika anda mengalami keadaan berikut:

1. kecenderungan untuk pendarahan
2. gangguan mata

3. jangkitan mata
4. kencing manis
5. arthritis reumatoid
6. pembedahan mata

Elakkan cahaya matahari semasa rawatan dengan Nevanac.

Memakai kanta lekap tidak digalakkan selepas pembedahan katarak. Doktor anda akan menasihati anda apabila anda boleh menggunakan kanta lekap semula.

Kehamilan dan penyusuan susu ibu

Jika anda hamil, atau mungkin hamil, berbincang dengan doktor anda sebelum anda menggunakan Nevanac. Wanita yang mungkin hamil dinasihatkan untuk menggunakan perancang kehamilan yang berkesan semasa rawatan Nevanac. Penggunaan Nevanac tidak disyorkan semasa kehamilan. Jangan gunakan Nevanac melainkan dinyatakan dengan jelas oleh doktor anda.

Jika anda sedang menyusu, Nevanac mungkin masuk ke dalam susu anda. Walau bagaimanapun, tiada kesan terhadap kanak-kanak yang diberi susu ibu dijangkakan. Nevanac boleh digunakan semasa menyusu.

Jika anda hamil atau menyusu, rasa anda mungkin hamil atau merancang untuk melahirkan bayi, minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain


Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda menggunakan atau mungkin mengambil sebarang ubat lain.

Nevanac boleh menjejaskan atau terjejas oleh ubat lain yang anda gunakan, termasuk ubat titis mata lain untuk rawatan glaukoma.

Juga beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat yang mengurangkan pembekuan darah (warfarin) atau NSAID lain. Ubat-ubat ini boleh meningkatkan risiko pendarahan.

Cara menggunakan Nevanac

Cuci tangan sebelum bermula.



- Goncang sebelum digunakan.
- Pusing penutup botol.
- Pegang botol, tuding ke bawah, antara ibu jari dan jari anda.
- Condongkan kepala anda ke belakang.
- Tarik ke bawah kelopak mata bawah anda dengan jari yang bersih, sehingga terdapat 'poket' di antara kelopak mata dan mata anda. Ubat titisan akan masuk ke sini (gambar 1).
- Dekatkan hujung botol ke mata. Lakukan ini di hadapan cermin jika ia membantu.
- Jangan sentuh mata atau kelopak mata anda, kawasan sekeliling atau permukaan lain dengan penitis. Ia boleh menjangkiti ubat titisan.
- Tekan perlahan-lahan pada hujung botol untuk melepaskan satu titisan Nevanac pada satu masa.
- Jangan picit botol: ia direka bentuk supaya hanya perlu ditekan lembut di bahagian bawah (gambar 2).

Jika anda menggunakan titisan pada kedua-dua mata, ulangi langkah untuk mata anda yang satu lagi. Tutup penutup botol dengan ketat serta-merta selepas digunakan.

Jika ubat titis mata terlepas mata anda, cuba lagi.

Jika anda menggunakan ubat titis mata yang lain, tunggu sekurang-kurangnya lima minit antara menggunakan Nevanac dan titisan lain.

- Berapa banyak harus digunakan

Dos yang disyorkan adalah 1 titisan dalam mata yang terlibat setiap 3 kali sehari mulai sehari sebelum pembedahan katarak dan pada hari pembedahan dan teruskan selama 2 minggu pertama tempoh selepas pembedahan.

Untuk mengurangkan risiko edema makular selepas pembedahan yang berkaitan dengan pembedahan katarak pada pesakit kencing manis, dos disyorkan adalah 1 titisan Nevanac dalam kantung konjunktiva mata yang terjejas setiap 3 kali sehari awal 1 hari sebelum pembedahan katarak, teruskan sehingga pada hari pembedahan dan sehingga 60 hari selepas pembedahan seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Doc tambahan perlu diberikan 30 hingga 120 minit sebelum pembedahan.

- **Bila perlu digunakan**

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- **Berapa lama perlu digunakan**

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- **Jika terlupa menggunakan**

Ambil satu dos sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal. Jangan menggunakan pada mata yang terjangkit melebihi satu titis 3 kali sehari.

- **Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)**

Bilas mata anda dengan air suam. Jangan masukkan sebarang titisan lagi sehingga tiba masanya untuk dos biasa anda yang seterusnya.

Semasa menggunakan Nevanac

- **Perkara yang perlu dilakukan**

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor atau ahli farmasi. Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika tidak pasti.

Hanya gunakan Nevanac untuk mata anda sahaja. Jangan telan atau menyuntik. Jangan gunakan Nevanac tanpa berbincang dengan doktor dahulu. Selalunya, anda boleh terus gunakan ubat titis mata, melainkan anda mengalami kesan sampingan yang serius. Jika anda bimbang, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi.

Jika anda mempunyai soalan lanjut

mengenai penggunaan ubat titis mata ini, tanya doktor, ahli farmasi atau jururawat.

- **Perkara yang tidak boleh dilakukan**

Jangan berikan ubat ini kepada kanak-kanak atau remaja berumur 18 tahun ke bawah kerana keselamatan dan keberkesanan dalam golongan ini belum dinyatakan lagi.

Jangan memandu atau menggunakan mesin sehingga penglihatan anda menjadi jelas. Penglihatan anda mungkin menjadi kabur buat sementara waktu selepas menggunakan Nevanac.

- **Perkara yang perlu diberi perhatian**

Ubat ini mengandungi 0.25mg benzalkonium chloride dalam setiap 5ml yang bersamaan dengan 0.05mg/ml.

Bahan pengawet dalam Nevanac, benzalkonium chloride mungkin diserap oleh kanta mata lembut dan ini akan menukar warna kanta mata lembut. Anda harus mengeluarkan kanta mata lembut sebelum menggunakan ubat ini dan memakai semula selepas 15 minit. Benzalkonium chloride mungkin menyebabkan kerengsaan mata, terutamanya jika anda mempunyai masalah mata kering atau masalah kornea (lapisan yang jernih di permukaan mata). Sekiranya anda berasa sensasi mata yang tidak normal, rasa sakit pada mata selepas menggunakan ubat ini, beritahu doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Nevanac boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Risiko kesan sampingan kornea yang lebih tinggi (masalah permukaan mata) jika anda mempunyai:

- pembedahan mata yang rumit
- pembedahan mata berulang dalam tempoh masa yang singkat
- sesentengah masalah pada permukaan mata, seperti keradangan atau mata kering
- sesentengah penyakit umum, seperti diabetes atau arthritis

reumatoid

Hubungi doktor anda dengan segera jika mata anda menjadi lebih merah atau lebih menyakitkan semasa menggunakan titisan. Ini mungkin disebabkan oleh keradangan pada permukaan mata dengan atau tanpa kehilangan atau kerosakan sel atau keradangan bahagian mata yang berwarna (iritis). Kesan sampingan ini telah diperhatikan sehingga 1 dalam 100 orang.

Kesan sampingan berikut juga telah diperhatikan dengan titisan mata nepafenac 1 mg/ml atau titisan mata nepafenac 3 mg/ml atau kedua-duanya.

Tidak biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang)

- **Kesan pada mata:** keradangan permukaan mata dengan atau tanpa kehilangan atau kerosakan sel, sensasi badan asing di mata, kelopak mata berkerak atau terkulai.

Jarang (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 1,000 orang)

- **Kesan pada mata:** keradangan iris, sakit mata, ketidakselesaian mata, mata kering, kelopak mata bengkak, kerengsaan mata, mata gatal, pelepasan mata, alahan konjunktivitis (alahan mata), peningkatan pengeluaran air mata, mendapan pada permukaan mata, cecair atau bengkak di bahagian belakang mata, mata merah.
- **Kesan sampingan am:** pening, sakit kepala, gejala alahan (alahan bengkak kelopak mata), loya, keradangan kulit, kemerahan dan gatal-gatal.

Tidak diketahui (kekerapan tidak boleh dianggarkan dari data yang tersedia)

- **Kesan pada mata:** kerosakan pada permukaan mata seperti penipisan atau perforasi, penyembuhan mata terjejas, parut permukaan mata, keruh, penglihatan berkurangan, bengkak mata, penglihatan kabur.

Kesan sampingan am: muntah, tekanan darah meningkat. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.moh.gov.my [Public→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Selangor, Malaysia.

Informasi dikeluarkan
19 Nov 20

Tarikh kemaskini RiMUP
23/02/2025

Nombor siri:

Cara penyimpanan dan pelupusan
Nevanac

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan pada suhu 30°C. Buang selepas 28 hari dibuka.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah- langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Nevanac adalah dalam bentuk cecair steril yang berwarna kuning muda atau kuning.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Nepafenac

Bahan tidak aktif

Mannitol, carbomer 974P, sodium chloride, tyloxapol, edetate disodium, benzalkonium chloride 0.005% (preservative), sodium hydroxide and/or hydrochloric acid and purified water, USP.

- MAL number:

MAL20081732ARZ

Pengilang

Novartis Manufacturing N.V.,
Rijkweg 14, 2870
Puurs-Sint-Amands,
Belgium.

Pemegang Pendaftaran Produk

Novartis Corporation (M) Sdn Bhd
Level 18, Imazium,
No. 8, Jalan SS21/37,
Damansara Uptown,
47400 Petaling Jaya,