# PATADAY EYE DROPS

Olopatadine hydrochloride (2mg/ml)

**Apakah yang ada pada risalah ini**


1. Apakah kegunaan PATADAY
2. Bagaimana PATADAY berfungsi
3. Sebelum menggunakan PATADAY
4. Cara menggunakan PATADAY
5. Semasa menggunakan PATADAY
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan PATADAY
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri


**Apakah kegunaan PATADAY**

Pataday digunakan untuk rawatan kegatalan mata yang disebabkan oleh alahan terhadap habuk rumah, debunga, bulu haiwan, atau alergen lain (alergi konjungtivitis).

**Bagaimana PATADAY berfungsi**

Pataday berfungsi dengan mengurangkan intensiti masalah alahan.

**Sebelum menggunakan PATADAY**

*- Bila tidak boleh menggunakan*

Jangan menggunakan Pataday jika anda alah pada olopatadine atau mana-mana bahan lain dalam Pataday.

Sekiranya ini berkaitan dengan anda, jangan menggunakan Pataday and beritahu doktor anda.

Kanak-kanak dan remaja (berumur 18 tahun dan ke bawah)

Keselamatan dan keberkesanan kanak-kanak di bawah umur 3 tahun belum dibuktikan.

Orang tua (berumur 65 tahun ke atas)

Anda boleh menggunakan Pataday jika anda berumur 65 tahun ke atas dengan dos yang sama seperti orang dewasa lain.

Mengandung dan menyusu

Sekiranya anda mengandung atau menyusu, anda mungkin mengandung atau merancang untuk mempunyai bayi, minta nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini.

*- Sebelum mula menggunakan Pataday*

Pataday mengandungi benzalkonium chloride yang mungkin menyebabkan iritasi pada mata dan juga boleh mengubah warna kanta sentuh. Kanta sentuh harus dikeluarkan sebelum menggunakan Pataday dan tunggu sekurang-kurangnya 15 minit sebelum memakai kanta sentuh anda kembali.

*- Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang menggunakan, baru-baru ini menggunakan atau mungkin meggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang diambil tanpa preskripsi.

**Cara menggunakan PATADAY**

Sentiasa gunakan ubat ini sama seperti yang dijelaskan dalam risalah ini atau seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi atau jururawat anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi atau jururawat anda jika anda tidak pasti.

*- Berapa banyak harus digunakan*

Dos yang disyorkan adalah satu titis pada mata yang terjejas sekali sehari.

*- Bila perlu digunakan*

Gunakan sekali sehari atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

*- Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

*- Jika terlupa menggunakan*

Jika anda terlupa menggunakan Pataday, teruskan dengan dos seterusnya seperti yang dirancang. Walau bagaimanapun, jika hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan mengikut jadual dos biasa anda. Jangan gunakan dos berganda untuk menggantikan balik dos yang tertinggal.

*- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)*

Jika anda menggunakan Pataday lebih daripada yang anda perlukan, bilas dengan air suam. Jangan gunakan Pataday sehingga tiba masanya untuk dos seterusnya yang ditetapkan.

**Semasa menggunakan PATADAY**

*- Perkara yang perlu dilakukan*

- Hanya gunakan Pataday untuk mata.
- Untuk mengelakkan kontaminasi, hujung penitis tidak boleh menyentuh mana-mana permukaan. Hujung penitis juga tidak boleh bersentuhan dengan mata kerana ini boleh menyebabkan kecederaan pada mata.
- Cuba lagi sekiranya titisan tidak memasuki mata.
- Apabila menutup kelopak mata selama 2 minit (menggunakan oklusi nasolakrimal), penyerapan ubat ke bahagian badan lain (penyerapan sistemik)

dikurangkan. Ini boleh menurunkan kesan sampingan umum yang menjejaskan bahagian badan yang lain dan meningkatkan aktiviti tempatan.
- Pastikan botol ditutup dengan ketat apabila tidak digunakan.
- Sekiranya lebih daripada satu ubat mata digunakan, tunggu sekurang-kurangnya 5 minit antara setiap penggunaan ubat. Ubat salap mata perlu digunakan akhir sekali.

*- Perkara yang tidak boleh dilakukan*
Jangan memakai kanta sentuh jika mata anda merah.

Pataday tidak boleh digunakan untuk merawat kerengsaan mata yang disebabkan oleh kanta sentuh.

**Kesan-kesan sampingan**
Seperti semua ubat, pengguna ubat Pataday mungkin mengalami kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang serius, hentikan ubat ini dan beritahu doktor dengan serta-merta.

Kesan sampingan berikut telah diperhatikan dengan Pataday:
*Umum: mungkin menjejaskan sehingga 1 dari setiap 10 orang*
- Kesan pada mata: ketidakselesaan mata

*Tidak umum: mungkin menjejaskan sehingga 1 dari setiap 100 orang:*
- Kesan pada mata: mata kering, mata kabur, mata gatal, kemerahan mata, keruping kulit kelopak mata
- Kesan sampingan umum: sakit kepala, penukaran rasa (dysgeusia), kekeringan hidung

*Jarang berlaku: mungkin menjejaskan sehingga 1 dari setiap 1,000 orang:*
Kesan sampingan umum: mulut kering

*Tidak diketahui: kekerapan tidak boleh dianggarkan daripada data yang sedia ada*
- Kesan pada mata: peningkatan penghasilan air mata
- Kesan sampingan am: alahan, loya

Sekiranya anda mendapati kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi atau pembekal penjaga kesihatan anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my *[Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]*.

**Cara penyimpanan dan pelupusan PATADAY**
*- Penyimpanan*
Jangan simpan melebihi suhu 30°C.
Buang dalam 28 hari selepas dibuka.

*- Pelupusan*
Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

**Maklumat lanjut**
*- Rupa dan warna produk*
Pataday adalah larutan yang tidak berwarna hingga berwarna kuning muda.

*- Bahan-bahan kandungan*
- Bahan aktif
2.22mg olopatadine hydrochloride dalam 1mL larutan (0.2%w/v)

- Bahan tidak aktif
Benzalkonium chloride, edetate disodium, povidone, sodium chloride, dibasic sodium phosphate (anhydrous), sodium hydroxide dan/atau hydrochloric acid, air tulen

*- Nombor MAL*:
MAL08021516ARZ

**Pengilang**
Novartis Manufacturing NV,
Rijkweg 14,
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium

**Pemegang Pendaftaran Produk**
Novartis Corporation (M) Sdn. Bhd.
Level 18, Imazium,
No. 8, Jalan SS21/37,
Damansara Uptown,
47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

**Informasi dikeluarkan**
17-Jul-2020

**Tarikh kemaskini RiMUP**
14-Jan-2025

**Nombor Siri**