

BETAMOX TABLET

Amoxycillin (250mg, 500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan BETAMOX
2. Bagaimana BETAMOX berfungsi
3. Sebelum menggunakan BETAMOX
4. Cara menggunakan BETAMOX
5. Semasa menggunakan BETAMOX
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan BETAMOX
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan BETAMOX

Amoxycillin ialah antibiotik yang digunakan untuk merawat jangkitan disebabkan oleh bakteria pada bahagian tertentu badan. Ini termasuklah jangkitan paru-paru, tonsil, sinus, saluran kencing dan kemaluan, kulit dan tisu badan.

Doktor anda mungkin mempreskripsikan BETAMOX untuk tujuan lain. Tanya doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tentang sebab BETAMOX dipreskripsikan kepada anda.

Bagaimana BETAMOX berfungsi

Amoxycillin merupakan antibiotik yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai penicillin. Antibiotik ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan BETAMOX

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil BETAMOX jika anda alah kepada

- amoxycillin,
- penicillin atau cephalosporin yang lain

- sebarang kandungan yang disenaraikan pada bahagian akhir risalah ini.

Sesetengah simptom reaksi alahan termasuklah ruam kulit, gatal-gatal, sesak nafas, bengkak pada muka, bibir atau lidah.

Jangan menggunakan BETAMOX jika:

1. Pembungkusan terkoyak atau menunjukkan tanda salahguna
2. Jangan menggunakan selepas tarikh luput seperti yang dicetak pada botol atau kotak.
3. Jika anda tidak pasti sama ada anda harus mula mengambil BETAMOX hubungi doktor atau ahli farmasi anda

- Sebelum menggunakan BETAMOX

Beritahu doktor anda jika anda pernah mengalami reaksi alahan terhadap sebarang antibiotik sebelum ini.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat lain, makanan atau pengawet.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai atau pernah mengalami sebarang masalah kesihatan seperti yang berikut:

- masalah hati
- masalah buah pinggang
- gangguan pendarahan
- perut dan penyakit usus
- demam kelenjar
- masalah perubatan yang lain
- Sila maklumkan kepada doktor jika anda perlu menjalani ujian darah atau kencing.

Beritahu doktor anda jika anda hamil atau bercadang untuk hamil atau menyusukan bayi. Doktor anda akan berbincang dengan anda mengenai risiko dan manfaat mengambil ubat ini.

Jika anda belum memberitahu doktor anda tentang mana-mana perkara di atas, beritahunya sebelum anda mula mengambil BETAMOX.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuklah sebarang ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan BETAMOX boleh bertindak balas satu sama lain. Anda mungkin perlu mengambil ubat anda dalam jumlah yang berlainan atau anda mungkin perlu mengambil ubat yang berlainan e.g.

- probenecid dan allopurinol , ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat gout
- pil perancang (kelahiran kawalan pil) .

Doktor dan ahli farmasi anda mempunyai lebih banyak maklumat tentang ubat lain yang perlu diberi perhatian atau dielakkan semasa anda mengambil BETAMOX.

Cara menggunakan BETAMOX

Patuhi semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

Arahan-arahan ini mungkin berbeza daripada informasi yang terkandung dalam risalah ini.

Sekiranya anda tidak faham arahan pada pek, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan memberitahu berapa banyak anda perlu ambil setiap hari dan bila untuk mengambilnya. Ini bergantung sama ada anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain.

Untuk rawatan kebanyakan jangkitan, dos dewasa biasa adalah 250 hingga 500 mg setiap 8 jam. Bagi kanak-kanak, dos mungkin berbeza bergantung kepada berat badan.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat anda pada masa yang sama setiap hari.
Mengambil setiap dos BETAMOX pada masa yang sama setiap hari akan memberi kesan terbaik. Ia juga akan membantu anda mengingati masa mengambil ubat.
Ia boleh diambil bersama atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil BETAMOX secara berterusan sehingga pek ini habis atau seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika sudah dekat waktu dos seterusnya, tinggalkan dos yang terlupa dan ambil dos seterusnya mengikut jadual biasa.
Jika tidak, ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat dan kemudian kembali mengambil ubat anda seperti biasa.
Jangan gantikan dos untuk menggantikan dos yang terlupa.
Jika anda sukar mengingati masa untuk mengambil pil anda, minta petua daripada ahli farmasi anda.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terlebih mengambil BETAMOX, hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang terdekat dengan segera.
Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda ketidakselesaian atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.
Sesetengah simptom terlebih dos termasuklah:

- Rasa loya
- Muntah-muntah
- Cirit-birit

Semasa menggunakan BETAMOX

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang sedang merawat anda bahawa anda sedang mengambil BETAMOX.

Jika simptom jangkitan anda tidak bertambah baik dalam beberapa hari, atau jika ia menjadi lebih buruk, beritahu doktor anda.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami cirit-birit teruk. Ini mestilah dilakukan walaupun ia berlaku beberapa minggu selepas BETAMOX dihentikan.

Cirit-birit boleh bermakna anda mengalami keadaan yang serius yang menjejaskan usus anda. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera. Jangan mengambil sebarang ubat cirit-birit tanpa memeriksa dengan doktor anda terlebih dahulu.

Jika anda hamil semasa anda mengambil BETAMOX beritahu doktor anda dengan segera.

Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil BETAMOX.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil BETAMOX jika keadaan anda bertambah baik, melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

Jika anda tidak menghabiskan semua ubat yang dipreskripsikan oleh doktor anda, semua bakteria yang menyebabkan jangkitan anda mungkin tidak dibunuh. Bakteria ini akan terus membiak dan bertambah menyebabkan jangkitan anda tidak pulih sepenuhnya atau ia mungkin kembali.

Jangan mengambil BETAMOX untuk merawat sebarang masalah lain melainkan diarah oleh doktor anda.

Jangan beri ubat anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana BETAMOX mempengaruhi anda.

BETAMOX mungkin menyebabkan keletihan atau rasa pening di kalangan sesetengah orang. Pastikan anda tahu bagaimana anda bertindak balas terhadap BETAMOX sebelum anda

memandu kereta atau melakukan apa-apa yang boleh membahayakan jika anda terjejas.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh membawa kesan sampingan. Kadang kala kesan sampingan ini serius, tetapi selalunya tidak.

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai sebarang kebimbangan mengenai kesan mengambil ubat ini.

Jangan khuatir dengan senarai ini. Anda mungkin tidak mengalami sebarang kesan sampingan tersebut. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami sebarang kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda:

- cirit-birit yang teruk (pergerakan usus longgar beberapa sehari), yang juga boleh menjadi berdarah
- loya
- muntah-muntah
- sakit kepala
- seraiwan-oral (sakit pada lidah dan mulut)
- seraiwan-faraj (faraj sakit dan gatal dan ada keputihan).
- masalah hati (kekuningan mata atau kulit)
- sukar atau sakit semasa buang air kecil dan jumlah sedikit.
- tanda-tanda jangkitan yang kerap berlaku seperti demam, sakit tekak atau ulser mulut.
- gangguan -mental
- pendarahan atau lebam dengan lebih mudah daripada biasa
- sawan

Jika mana-mana alahan berikut reaksi terjadi, berhenti mengambil BETAMOX dan beritahu doktor anda serta-merta, atau pergi ke Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat:

- apa-apa jenis ruam kulit, gatal-gatal, melepuh atau pengelupasan kulit
- muka, bibir atau tekak bengkak yang boleh menyebabkan sukar untuk menelan atau bernafas
- berdehit, sesak nafas atau kesukaran bernafas.

Senarai di atas termasuk kesan sampingan yang serius. Anda mungkin perlu segera rawatan perubatan atau di hospital.

Beritahu doktor anda jika anda mendapati apa-apa yang membuatkan anda rasa tidak sihat. Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin berlaku di kalangan sesetengah pesakit.

Berhenti mengambil BETAMOX dan hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami mana-mana yang berikut:

- Reaksi alergi yang serius seperti Reaksi Dadah dengan Eosinophilia dan Gejala Sistemik (DRESS). Gejala seperti selesma dengan ruam pada muka akan muncul sebagai gejala awal DRESS dan kemudian sambung sebagai ruam berlanjutan, suhu tinggi dan pembesaran kelenjar limfa.

BETAMOX boleh menyebabkan alahan yang teruk dan reaksi kulit yang serius.

Berhenti menggunakan BETAMOX - dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami - sebarang gejala berikut:

Kulit kemerah-merahan, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumers -> Reporting -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan BETAMOX

- Penyimpanan

Simpan ubat anda dalam peknya sehingga tiba masa untuk mengambilnya.

Jika anda mengeluarkan ubat daripada peknya, ia mungkin tidak dapat dikekalkan dalam keadaan yang baik. Simpan ubat anda di tempat suhu bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya. Untuk penyediaan granul, selepas pembancuhan, simpan antara 2-8 ° C, dan buang 7 hari selepas pembancuhan. Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

- Pelupusan

Jika doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan anda berhenti mengambil BETAMOX atau ubat ini sudah melepasi tarikh luputnya, sila tanya ahli farmasi anda apa yang patut dilakukan dengan sebarang ubat yang tinggal.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

i) BETAMOX 250MG TABLET

- Tablet berbentuk kapsul berwarna kuning, bergores dan tanda 'USP250'.

ii) BETAMOX 500MG TABLET

- Tablet berbentuk kapsul berwarna kuning, bergores dan tanda 'UP500'.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

- Amoxycillin

Bahan tidak aktif:

BETAMOX 250MG TABLET

- Saccharin sodium
- Sodium starch glycolate
- Magnesium stearate
- Pineapple flavour
- Aluminium Lake quinoline yellow
- Kollidon 30
- Aerosil 200
- Microcrystalline cellulose (Ph102)

BETAMOX 500MG TABLET

- Quinoline yellow
- Saccharin sodium
- Sodium starch glycolate
- Microcrystalline cellulose (102)
- Aerosil 200

- Pineapple
- Povidone
- Magnesium stearate

- Nombor MAL

1. BETAMOX 250MG TABLET
MAL20020025AZ
2. BETAMOX 500MG TABLET
MAL19860468AZ

Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang

DUOPHARMA (M) SDN. BHD.
Lot 2599, Jalan Seruling 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

14/1/2022

Nombor siri:

NPRA(R2/1)190723/201