

LOWIN CAPSULE

Gemfibrozil (300mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan LOWIN CAPSULE
2. Bagaimana LOWIN CAPSULE berfungsi
3. Sebelum menggunakan LOWIN CAPSULE
4. Cara menggunakan LOWIN CAPSULE
5. Semasa menggunakan LOWIN CAPSULE Kesan-kesan sampingan
6. Cara penyimpanan dan pelupusan LOWIN CAPSULE
7. Maklumat lanjut
8. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
9. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan LOWIN CAPSULE

LOWIN CAPSULE digunakan bersama diet rendah lemak dan rawatan bukan perubatan lain seperti bersenam dan penurunan berat, untuk menurunkan paras lemak dalam darah. LOWIN CAPSULE juga boleh digunakan apabila ubatan lain (statins) tidak sesuai untuk mengurangkan risiko masalah jantung dan peningkatan kolesterol jahat.

LOWIN CAPSULE juga boleh digunakan kepada mereka yang tidak boleh menggunakan ubatan pengurangan lemak yang lain yang digunakan untuk menurunkan paras kolesterol dalam darah.

Bagaimana LOWIN CAPSULE berfungsi

LOWIN CAPSULE mengandungi gemfibrozil yang merupakan ejen pengawalan lemak dan mampu mengurangkan paras lemak (lipid) dalam darah.

Sebelum menggunakan LOWIN CAPSULE

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan LOWIN CAPSULE jika anda alah terhadap *gemfibrozil* atau sebarang bahan kandungan lain yang disenaraikan di akhir risalah ini.

- Sebelum menggunakan LOWIN CAPSULE

Sebelum mengambil LOWIN CAPSULE, anda perlu beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami:

- Masalah hati dan buah pinggang yang kronik.
- Pernah mengalami penyakit pundi kencing atau salur kencing, termasuk batu karang.
- Hypersensitif terhadap gemfibrozil.
- Pernah mengalami photoallergik (sensitiviti yang tidak normal dalam kulit yang disebabkan oleh cahaya matahari) ketika dalam rawatan bersama fibrates.

Jika anda tidak pasti jika anda mempunyai atau ada salah satu gejala berikut, anda perlu memberitahu doktor atau ahli farmasi anda.

Kehamilan

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mengandung atau mungkin hamil semasa mengambil ubat ini.

Penyusuan

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mulai penyusuan atau mungkin sedang menyusu semasa mengambil ubat ini.

LOWIN CAPSULE berpotensi untuk ketumbuhan tumor,

keputusan perlu dibuat sama ada berhenti menyusu atau hentikan pengambilan ubat tersebut.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil LOWIN CAPSULE.

Sebelum menggunakan adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, yang diperoleh dengan atau tanpa preskripsi doktor.

Penggunaan LOWIN CAPSULE bersama ejen hypoglycaemic (ejen oral atau insulin) boleh mengakibatkan tindak balas hypoglycaemic (paras gula dalam darah rendah).

Gemfibrozil berpotensi mengganggu antikoagulan vitamin K jenis coumarin seperti warfarin, acenocoumarol atau phenprocoumon.

Penggunaan LOWIN CAPSULE bersama ubat-ubatan dibawah adalah tidak boleh dan tidak disyorkan:

- Ubat anti-diabetik, Rapaglinide dan Rosiglitazone
- Ubat untuk mengurangkan kolesterol, Simvastatin
- Ejen anti-kanser, Bexarotene
- Ubat granule daripada resine seperti colestipol (ubat untuk menurunkan kolesterol)
- Ubat untuk mencegah gout, Colchicine

Cara menggunakan LOWIN CAPSULE

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan dengan teliti. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor, atau ahli farmasi untuk mendapatkan bantuan.

Dos yang disyorkan untuk orang dewasa ialah 1200 mg dalam 2 dos, 30 minit sebelum sarapan dan makan malam. Seseorang orang akan mengalami kesan teraputik pada 900mg sehari; beberapa orang memerlukan 1500mg sehari untuk kesan yang memuaskan.

- Kekerapan penggunaan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama untuk digunakan

Teruskan mengambil LOWIN CAPSULE seperti yang doktor anda syorkan. Sekiranya keadaan berterusan, sila berjumpa dengan doktor anda.

- Jika anda lupa menggunakannya

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi mengenai apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakannya. Ambil dos terlepas sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga waktu mengambil ubat itu dan langkau dos yang tidak diambil. Jangan mengambil dos berganda sebagai pampasan untuk dos yang tidak diambil.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda menganggap anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak

ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa anda menggunakan LOWIN CAPSULE

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil LOWIN CAPSULE.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh anda lakukan

- Jangan mengambil lebih daripada dos yang dicadangkan kecuali jika disyorkan oleh ahli farmasi atau doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan LOWIN CAPSULE kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera operasi sehingga anda tahu bagaimana LOWIN CAPSULE memberi kesan kepada anda. Keselamatan dan keberkesanan dalam penggunaan kanak-kanak belum pernah direkodkan.

Kesan-Kesan sampingan

Seperti semua ubat, LOWIN CAPSULE boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Sekiranya kesan sampingan berterusan, jangan

ambil ubat dan rujuk kepada doktor.

Beritahu doktor anda jika anda melihat mana-mana kesan sampingan berikut atau perhatikan apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- **Kulit:** ruam, keradangan pada kulit, ekzema (gatal-gatal yang teruk pada kulit).
- **Sistem saraf tunjang:** sakit kepala, pening, pandangan kabur, pening, susah tidur, rasa kebas yang tidak normal, bunyi berdering di telinga.
- **Muskuloskeletal:** sakit dibahagian tangan dan kaki, sakit belakang, sakit sendi, kejang otot, sakit otot, sendi bengkok, keradangan otot.
- **Salur Darah:** anaemia (kurang sel darah merah), tinggi eosinophil dalam darah, kurang sel darah putih.
- **Sistem pencernaan:** mulut kering, sakit perut, sembelit, anoreksia (gangguan makan yang dicirikan oleh berat badan rendah yang luar biasa), kembung perut, ketidakhadaman, kesusahan menelan, cirit-birit, muntah, loya.
- **Lain-lain:** kepenatan, sakit, tidak selesa tanpa sebab, pengsan, rambut gugur.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda berasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]”

**Cara penyimpanan dan
pelupusan LOWIN
CAPSULE**

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.
Lindungi dari cahaya. Jauhi
dari kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubatan tidak boleh dibuang
melalui air buangan atau sisa
isi rumah di rumah. Tanya ahli
farmasi anda cara pelupusan
ubatan yang betul. Langkah ini
boleh membantu menjaga alam
sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul merah/putih bertanda
'DUO 861'

- Bahan Aktif

Bahan aktif:

- Gemfibrozil

Kandungan lain:

- Polyvinyl pyrrolidone, PVP
- Polysorbate 80
- Magnesium Stearate
- Croscarmellose Sodium
- Sodium Starch Glycolate
- Microcrystalline Cellulose

- Nombor MAL

MAL19950150AZ

**Pengilang dan Pemegang
Pendaftaran Produk**

Duopharma (M) Sdn. Bhd.
Lot. 2599, Jalan Seruling 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia

Tarikh kemaskini RIMUP

21/02/2023

Serial Number

NPRA(R4/1)201119/00316