

BETAWIN TABLET

Metoprolol Tartrate

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan BETAWIN TABLET
2. Bagaimana BETAWIN TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan BETAWIN TABLET
4. Cara menggunakan BETAWIN TABLET
5. Semasa menggunakan BETAWIN TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan BETAWIN TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan BETAWIN TABLET

BETAWIN TABLET digunakan dalam rawatan tekanan darah tinggi (hipertensi), sakit dada (angina), serangan atau komplikasi jantung dan penyakit migrain.

Bagaimana BETAWIN TABLET berfungsi

BETAWIN TABLET tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil penghalang beta atau beta-blocker. Ia berfungsi dengan memberi kesan tindak balas memberi kesan tindak balas badan terhadap beberapa impuls saraf terutama di bahagian jantung.

Dengan itu, ia dapat mengurangkan keperluan darah dan oksigen kepada jantung dan seterusnya mengurangkan daya kerja jantung tersebut. Ia juga berfungsi dengan membesarkan saluan darah di dalam badan dan membantu

jantung berdenyut dengan tetap.

Sebelum menggunakan BETAWIN TABLET

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan BETAWIN TABLET jika anda alah terhadap Metoprolol tartrate atau sebarang bahan kandungan lain yang disenaraikan di akhir risalah ini.

- Sebelum menggunakan ubat ini

Sebelum mengambil BETAWIN TABLET, anda perlu beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami:

- asma
- diabetes (kencing manis)
- kelenjar tiroid terlebiaktif
- masalah hati
- masalah buah pinggang
- sesetengah jenis angina (sakit dada)
- sebarang masalah lain jantung
- phaeochromocytoma (penyakit tumor pada kelenjar adrenal)

Jika anda tidak pasti jika anda mempunyai atau ada salah satu gejala berikut, anda perlu memberitahu doktor atau ahli farmasi anda.

Kehamilan:

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda hamil atau mungkin hamil semasa mengambil ubat ini.

BETAWIN TABLET boleh menjejaskan janin jika anda mengambilnya pada peringkat awal atau minggu-minggu terakhir sebelum kelahiran.

Penyusuan:

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mulai penyusuan atau mungkin sedang menyusu semasa mengambil ubat ini.

BETAWIN TABLET boleh menyerap masuk ke dalam susu badan dan seterusnya boleh menjejaskan bayi yang sedang disusui.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil BETAWIN TABLET.

Sebelum menggunakan BETAWIN TABLET, adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, yang diperolehi dengan atau tanpa preskripsi doktor.

Ubat-ubatan ini boleh menjejaskan BETAWIN TABLET atau ubat-ubatan itu sendiri terjejas disebabkan olehnya:

- ubat penghalang beta yang lain, termasuk ubat titis mata penghalang beta
- ubat untuk merawat tekanan darah tinggi atau angina
- ubat untuk merawat masalah jantung
- ubat tablet untuk merawat kencing manis atau ubat insulin
- ubat untuk merawat kemurungan

Cara menggunakan BETAWIN TABLET

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan dengan teliti. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor, atau

ahli farmasi untuk mendapatkan bantuan.

Untuk tekanan darah tinggi:

Dos permulaan biasa ialah satu tablet (50mg) sekali sehari selama seminggu

Biasanya dos akan ditingkatkan kepada 50 gm atau 100 gm sekali atau dua kali sehari.

Untuk angina pectoris:

Dos biasa ialah satu tablet diambil sebanyak dua atau tiga kali sehari.

Selepas terkena serangan jantung (miokardia infarksi):

Dos biasa ialah dua tablet diambil dua kali sehari, selalunya dimulai dengan dos yang rendah selama 2 hari.

Untuk mencegah migraine:

Dos biasa ialah 50mg hingga 75mg diambil dua kali sehari (100-150mg sehari).

Jangan berhenti mengambil BETAWIN TABLET secara mendadak. Dosnya perlu dikurangkan secara perlahan-lahan selama 7 hingga 14 hari supaya keadaan penyakit anda tidak menjadi bertambah teruk.

- Kekerapan penggunaan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda

- Berapa lama untuk digunakan

Teruskan mengambil BETAWIN TABLET seperti yang doktor anda syorkan. Sekiranya keadaan berterusan, sila berjumpa dengan doktor anda.

- Jika anda lupa menggunakannya

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi mengenai apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakannya. Ambil dos terlepas sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya

hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga waktu mengambil ubat itu dan langkau dos yang tidak diambil. Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tidak diambil.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda menganggap anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Beberapa simptom dos berlebihan adalah seperti berikut:

- Tekanan darah sangat rendah
- Berasa pitam atau pengsan
- Kadar denyutan jantung menjadi perlahan
- Loya
- Muntah
- Sawan
- Masalah jantung dan paru-paru yang teruk mungkin berlaku pada sesetengah kes yang ekstrim.

Semasa anda menggunakan BETAWIN TABLET

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil BETAWIN TABLET.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh anda lakukan

- Jangan mengambil lebih daripada dos yang dicadangkan kecuali jika

disyorkan oleh ahli farmasi atau doktor anda.

- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan BETAWIN TABLET kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Pengambilan BETAWIN TABLET boleh menyebabkan pening atau pengsan. Berhati-hati semasa memandu atau mengunakan jentera operasi sehingga anda tahu bagaimana BETAWIN TABLET memberi kesan kepada anda.

Pastikan anda minum air yang mencukupi semasa bersenam dan sewaktu hari panas ketika anda mengambil BETAWIN TABLET, terutamanya jika anda banyak berpeluh.

Jangan berhenti mengambil BETAWIN TABLET secara mendadak tanpa nasihat doktor anda.

Kesan-Kesan sampingan

Seperti semua ubat, BETAWIN TABLET boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Sekiranya kesan sampingan berterusan, jangan ambil ubat dan rujuk kepada doktor.

Beritahu doktor anda jika anda melihat mana-mana kesan sampingan berikut atau perhatikan apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

Kesan-kesan ringan:

- sakit kepala, keletihan, rasa mengantuk, lemah atau lesu
- sakit, sakit sendi-sendi
- loya, muntah
- sakit perut, cirit-birit atau sembelit
- berat badan bertambah

- mulut kering, perubahan deria rasa
- sukar untuk tidur, mimpi ngeri
- perubahan sikap
- keliru, hilang ingatan jangka pendek, hilang daya tumpuan
- banyak berpeluh, hidung berair atau tersumbat
- rambut gugur

Kesan-kesan yang serius:

- pening atau pitam terutamanya ketika hendak bangun
- rasa berdenyut atau kebas
- ruam kulit atau psoriasis yang teruk
- kulit mudah terselar matahari daripada biasa
- fikiran tidak normal atau berhalusinasi
- telinga berdengung, rasa pekak
- sakit mata atau penglihatan kabur
- masalah seksual

Kesan-kesan yang amat serius:

- sesak nafas, kurang daya untuk bersenam
- bengkak pergelangan kaki atau kaki
- sesak dada, nafas berdehit, pernafasan kuat
- sakit dada, perubahan kadar denyutan jantung atau berdebar-debar
- Pembengkakan pada muka, bibir, lidah atau tekak.
- kulit atau mata menjadi kuning (jaundis), rasa tidak sihat
- sentiasa mengalami gejala seperti selesema, rasa letih atau kurang bertenaga.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda berasa sesuatu lain yang membuatkan anda rasa kurang sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan BETAWIN TABLET

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi dari cahaya. Jauhi dari kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubatan tidak boleh dibuang melalui air di rumah. Tanya ahli farmasi anda cara perlupusan ubatan yang betul. Langkah ini boleh membantu menjaga alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

BETAWIN TABLET 50MG
Berbentuk bulat dengan tanda 'd' pada kedua-dua permukaan. Berukuran diameter 9mm.

BETAWIN TABLET 100MG

Berbentuk bulat dengan tanda garisan pada permukaan yang lain. Berukuran diameter 11 mm, dan berwarna putih.

- Bahan Aktif

Bahan aktif:

- Metoprolol tartrate

Kandungan lain:

- Cornstarch
- Lactose
- Polysorbate
- Povidone
- Microcrystalline Cellulose
- Croscarmellose Sodium
- Colloidal Silicon Dioxide
- Talcum
- Magnesium Stearate

- Nombor MAL

BETAWIN TABLET 50MG
MAL19913261AZ

BETAWIN TABLET 100MG
MAL19913262AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Duopharma (M) Sdn. Bhd.
Lot. 2599, Jalan Seruling 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia

Tarikh kemaskini RIMUP

18/01/2024

Serial number:

NPRA(R2/1)190905/245