

RALSIN TABLET

Terazosin Hydrochloride (2mg, 5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan RALSIN TABLET
2. Bagaimana RALSIN TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan RALSIN TABLET
4. Cara menggunakan RALSIN TABLET
5. Semasa menggunakan RALSIN TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan RALSIN TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan RALSIN TABLET

RALSIN TABLET digunakan untuk merawat penyakit hiperplasia benigna prostatik iaitu keadaan penyakit pembesaran kelenjar prostat yang membuatkan anda sukar membuang air kecil.

RALSIN TABLET juga digunakan untuk merawat penyakit tekanan darah tinggi.

Bagaimana RALSIN TABLET berfungsi

RALSIN TABLET membantu melegakan halangan dalam kelenjar prostat dan meningkatkan aliran air kencing.

Sebelum menggunakan RALSIN TABLET

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan RALSIN TABLET jika anda alah

terhadap Terazosin Hydrochloride atau sebarang bahan kandungan lain yang disenaraikan di akhir risalah ini.

- Sebelum menggunakan RALSIN TABLET

Sebelum mengambil RALSIN TABLET, anda perlu beritahu doctor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami:

- Alahan terhadap sebarang ubat yang sama seperti prazosin, ubatan lain, makanan, pewarna dan bahan pengawet.
- Sebarang masalah jantung
- Tekanan darah rendah

Jika anda tidak pasti jika anda mempunyai atau ada salah satu gejala berikut, anda perlu memberitahu doktor atau ahli farmasi anda.

Kehamilan

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda hamil atau mungkin hamil semasa mengambil ubat ini.

RALSIN TABLET tidak disyorkan untuk wanita mengandung.

Penyusuan

Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mulai penyusuan atau mungkin sedang menyusu semasa mengambil ubat ini.

Langkah berjaga-jaga perlu diterapkan ketika pengambilan RALSIN TABLET bagi wanita menyusu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil RALSIN TABLET.

Sebelum menggunakan RALSIN TABLET adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda

jika anda mengambil apa-apa ubat lain, yang diperoleh dengan atau tanpa preskripsi doktor.

RALSIN TABLET tidak disyorkan untuk digunakan bersama ubatan berikut:

- Analgesik/ anti-keradangan (e.g. paracetamol, aspirin, codeine, ibuprofen, indomethacin)
- Antibiotik (e.g. erythromycin, trimethoprim and sulphamethaxole)
- Antikolinergik/sympathomimetics (e.g. phenylephrine hydrochloride; phenylpropanolamine hydrochloride, pseudoephedrine hydrochloride)
- Antigout (e.g. allopurinol)
- Antihistamin (e.g. chlorpheniramine)
- Ejen kardiovaskular (e.g. atenolol, hydrochlorothiazide, methyclothiazide, methylclothiazide, propranolol)
- Kortikosteroid
- Ejen penghadaman (e.g. antacids)
- Hypoglycaemics
- Ubat penenang (e.g. diazepam)

Cara menggunakan RALSIN TABLET

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan dengan teliti. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor, atau ahli farmasi untuk mendapatkan bantuan.

Dos Permulaan: 1 mg pada waktu tidur adalah dos permulaan untuk semua pesakit, dan tidak boleh melebihi dos ini.

Dos Selepas:

Untuk Rawatan Prostatic Hyperplasia Benign (BPH): Dos ditingkatkan perlahan-lahan untuk mencapai tindak balas klinikal yang dikehendaki. Julat dos yang disyorkan biasanya 5 hingga 10 mg sekali sehari. Rawatan hendaklah bermula dengan satu tablet 1 mg diambil pada waktu tidur untuk 4 hari pertama, kemudian setiap pagi untuk 3 hari akan datang. Untuk tujuh hari akan datang, dos adalah satu tablet 2 mg setiap pagi. Pada minggu ketiga, dos meningkat kepada satu tablet, 5 mg setiap pagi.

Dari minggu keempat, dos penyelenggaraan 5 – 10 mg diambil setiap pagi.

Untuk rawatan tekanan darah tinggi: Dos ditingkatkan perlahan-lahan untuk mencapai tindak balas tekanan darah yang diinginkan. Julat dos yang disyorkan biasanya adalah 1 mg hingga 5 mg diberikan sekali sehari

- *Bila perlu digunakan*
Guna sepertimana diarahkan oleh doktor anda. Biasanya RALSIN TABLET diambil sebelum tidur 4 malam pertama untuk mengurangkan rasa pening. Selepas itu, ianya diambil sekali sehari, pada setiap pagi.

- *Berapa lama perlu digunakan*
Teruskan mengambil RALSIN TABLET seperti yang doktor anda syorkan. Sekiranya keadaan berterusan, sila berjumpa dengan doktor anda.

- *Jika anda terlupa menggunakannya*
Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi mengenai apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakannya. Ambil dos terlepas sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga

waktu mengambil ubat itu dan langkau dos yang tidak diambil. Jangan mengambil dos berganda sebagai ganti untuk dos yang tidak diambil.

- *Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda menganggap anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil RALSIN TABLET berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah rendah.

Semasa menggunakan RALSIN TABLET

- *Perkara yang perlu dilakukan*

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil RALSIN TABLET.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

- Jangan mengambil lebih daripada dos yang dicadangkan kecuali jika disyorkan oleh ahli farmasi atau doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan RALSIN TABLET kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera operasi sehingga anda tahu bagaimana RALSIN TABLET memberi kesan kepada anda.

RALSIN TABLET boleh menyebabkan rasa pening, ringan kepala atau keletihan pada sesetengah orang.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, RALSIN TABLET boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Sekiranya kesan sampingan berterusan, jangan ambil ubat dan rujuk kepada doktor.

Beritahu doktor anda jika anda melihat mana-mana kesan sampingan berikut atau perhatikan apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- Pening
- Sakit kepala
- Asthenia (fizikal lemah)
- Hidung tersumbat
- Simptom demam
- Keletihan
- Loya
- Penglihatan kabur
- Tachycardia
- Palpitasi
- Sakit dada
- Kesukaran bernafas
- Penganan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda berasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumersà Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

**Cara penyimpanan dan
pelupusan RALSIN
TABLET**

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.
Lindungi dari cahaya. Jauhi
dari kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubatan tidak boleh dibuang
melalui sisa isi rumah. Tanya
ahli farmasi anda cara
perlupusan ubatan yang betul.
Langkah ini boleh membantu
menjaga alam sekitar.

**Pengilang dan Pemegang
Pendaftaran Produk**

Duopharma (M) Sdn. Bhd.
Lot. 2599, Jalan Seruling 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia

Tarikh kemaskini RIMUP

08/01/2025

No. Siri:

NPRA(R2/1)200410/423

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

RALSIN TABLET 2mg :
Tablet bulat bergarisan tengah,
berwarna biru, diameter 7mm
dan bertanda
'DUOMA/DUOMA' pada
permukaannya.

RALSIN TABLET 5mg :
Tablet bulat bergarisan tengah,
berwarna hijau, diameter 7mm
dan bertanda
'DUOMA/DUOMA' pada
permukaannya.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

- Terazosin hydrochloride

Bahan tidak aktif:

- Polyvinylpyrrolidone
- Magnesium Sterate
- Silicone Dioxide
- Quinoline Yellow
- Sodium Starch Glycolate
- Cornstach
- Brilliant Blue
- Lactose

- Nombor MAL

RALSIN TABLET 2mg :
MAL 20014349AZ

RALSIN TABLET 5mg :
MAL 20014348AZ