

Pantone 1595U size : 297 mm X 210 mm



ZhuBee

VITAMIN C

TABLET 300 mg

錠片



KETERANGAN:

Tablet bulat berwarna jingga dengan diameter 13 mm bertanda 'duo 861'.

KANDUNGAN:

Setiap Tablet Mengandungi 300 mg VITAMIN C (Asid Askorbik 115.368 mg, Natrium Askorbat 207.948 mg)
Tiada tambahan bahan pengawet.

CIRI-CIRI:

Asid Askorbik (Vitamin C) penting dalam pembentukan kolagen dan bahan antara sel. Ia berperanan dalam:

- Pembangunan rawan, tulang dan gigi.
- Penukaran asid folik ke asid folinik.
- Pemulihan tisu.

FARMAKOLOGI:

Asid Askorbik (Vitamin C) adalah vitamin larut air. Ia sedia diserap oleh saluran gastrousus dan diedarkan secara meluas dalam tisu tubuh. Memandangkan ia adalah larut air, maka sebarang lebihannya disingkirkan segera dalam air kencing.

PETUNJUK:

Untuk rawatan dan pencegahan kekurangan Vitamin C yang menjurus kepada skurvi.

DOS YANG DISYORKAN:

Kanak-kanak (di bawah 12 tahun) : 1-2 tablet sehari
Dewasa : 2-4 tablet sehari

Tablet boleh dikunyah atau dicairkan di dalam mulut. Diambil selepas makan.

KONTRAPENUNJUKAN:

Kontrapenunjukan bagi individu yang hipersensitif terhadap sebarang kandungan persediaan ini.

AMARAN & PENGAWASAN:

Dos besar Asid Askorbik meningkatkan tahap urinari oksalat dan mungkin memendakkan pembentukan kalsium oksalat kalkulus

urinari. Pesakit dengan fungsi ginjal yang lemah dan / atau pernah mengalami batu ginjal adalah lebih rentan kepada kesan ini. Oleh kerana Asid Askorbik meningkatkan penyerapan zat besi, dos yang banyak adalah berbahaya bagi pesakit hemokromatosis, talasemia, polisitemia, leukemia atau anemia sideroblastik. Pesakit yang mempunyai zat besi berlebihan harus mengekalkan pengambilan Asid Askorbik yang minimum.

KESAN SAMPINGAN:

Asid Askorbik selalunya serasi dengan baik. Dos yang banyak dilaporkan menyebabkan cirit-birit dan gangguan gastrousus yang lain.

SIMPtom DAN RAWATAN DOS BERLEBIHAN: Tiada.

KEADAAN SIMPANAN:

Simpan di bawah suhu 30°C. Jauhi dari cahaya matahari dan kelembapan. Pastikan penutup botol ditutup ketat selepas dibuka. **JAUHKAN DARIPADA KANAK-KANAK.**

JENIS PEMBUNGKUSAN:

Botol 80 tablet.

TEMPOH SIMPANAN: 2 tahun.

DESCRIPTION:

A round 13 mm diameter, orange colour tablet with 'duo 861' marking.

COMPOSITION:

Each Tablet Contains VITAMIN C 300 mg (Ascorbic Acid 115.368 mg, Sodium Ascorbate 207.948 mg).
No added preservatives.

PROPERTIES:

Ascorbic Acid (Vitamin C) is essential for the formation of collagen and intercellular material. Hence, it plays a part in:

- The development of cartilage, bone and teeth.
- The conversion of folic acid to folinic acid.
- Tissue repair.

PHARMACOLOGY:

Ascorbic Acid (Vitamin C) is a water-soluble vitamin. It is readily absorbed from the gastro-intestinal tract and is widely distributed

in the body tissue. As it is water soluble, any excess is rapidly eliminated in the urine.

INDICATIONS:

For the treatment and prevention of Vitamin C deficiency which may lead to scurvy.

RECOMMENDED DOSAGE:

Children (under 12) : 1 - 2 tablets daily
Adult : 2 - 4 tablets daily

Tablets can be chewed or dissolved in the mouth.
To be taken after meal.

CONTRAINDICATIONS:

Contraindicated in individuals who are hypersensitive to any of the ingredients within the preparation.

WARNING & PRECAUTIONS:

Large doses of ascorbic acid elevate urinary oxalate levels and may precipitate the formation of calcium oxalate urinary calculi. Patients with impaired renal function and/or a history of renal stones can be more susceptible to this effect. As ascorbic acid increases iron absorption, large doses can be dangerous in patients with haemochromatosis, thalassaemia, polycythaemia, leukaemia or sideroblastic anaemia. Patients with iron overload should keep their ascorbic acid intake to a minimum.

SIDE EFFECTS:

Ascorbic Acid is usually well tolerated. Large doses are reported to cause diarrhoea and other gastro-intestinal disturbances.

SYMPTOMS AND TREATMENT OF OVERDOSE: None available.

STORAGE CONDITIONS:

Store below 30°C. Protect from light and moisture. Ensure bottle lid is closed tightly after opening. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

PACK SIZE:

Bottle of 80 tablets.

SHELF LIFE: 2 years.

说明:

圆形直径 13 mm, 有 'duo 861' 字样的橙色錠片。

成分:

每錠片含有 300 毫克的维他命 C (抗坏血酸 115.368 毫克、抗坏血酸钠 207.948 毫克)
不含添加防腐剂。

特性:

抗坏血酸 (维他命 C) 是胶原蛋白及细胞间物质的形成所必需的元素。故此, 它有助于以下的过程:

- 软骨、骨骼及牙齿的建造。
- 叶酸至亚叶酸的转化过程。
- 组织的修复。

药理学:

抗坏血酸 (维他命 C) 是一种水溶性维他命, 肠胃非常容易吸收, 且在身体组织内广泛分布。由于属水溶性, 任何过多的维他命 C 将随着尿液快速排出体外。

提示:

供治疗和预防缺乏维他命 C 而引致的坏血病。

建议剂量:

孩童 (12 岁以下): 1 - 2 片剂
成年人: 2 - 4 片剂
錠片可咀嚼或含于口中直至溶化。用餐后服用。

禁忌症:

对此药剂的任何成分过敏者禁用。

警告及注意事项:

服用高剂量的抗坏血酸会提高尿酸水平, 而可能突然引起尿石症尿酸钙的形成。肾功能受损或曾有肾生石病者较容易产生这种作用。由于抗坏血酸能促进铁质的吸收, 服用高剂量可能对血铁质沉积症、地中海贫血症、红血球增多症、白血病、铁粒幼细胞贫血症等患者带来危险。铁质过多的病患者也必须尽量减少吃抗坏血酸。

副作用:

抗坏血酸的适应性一般良好。据报告, 高剂量可能导致腹泻或其它肠胃不适。

服食过量之症状及治疗: 无。

贮存法:

存放于摄氏 30 度以下之处, 避免阳光及潮湿。每打开后须确保再将瓶盖关紧。
置于儿童无法取得之处。

包装: 80 錠片瓶装。

保质期: 两年。



Peringatan: Semua maklumat termasuk sebarang imej, pembungkusan, harga atau butiran yang terkandung di sini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis awal.

Note: All information including any images, packaging, prices or details contained herein are subject to change without prior notice.

注: 所载之全部资料, 包括任何图像、包装、价格或详情均可依时所需而更改, 并无需预先通知。

Pemegang Daftar Produk & Pengilang /
Product Registration Holder & Manufacturer:

DUOPHARMA (M) SDN BHD
Lot 2599, Jalan Seruling 59, Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Diedarkan oleh / Distributed by:

ZHULIAN MARKETING (M) SDN BHD (186059-7)
Plot 41, Bayan Lepas Industrial Estate,
Phase IV, 11900 Penang, Malaysia.
Direct Sales Licence No.: AJL 93195

No. PBKD / Reg. No: MAL19961675XZ

Rev. Date: 14.2.2022

15000