

EYE GLO PLUS EYE DROPS®

Borax/Hamamelis water/Boric acid (0.3% w/v / 5%w/v /1.3% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Eye Glo Plus
2. Bagaimana Eye Glo Plus berfungsi
3. Sebelum menggunakan Eye Glo Plus
4. Cara menggunakan Eye Glo Plus
5. Semasa menggunakan Eye Glo Plus
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Eye Glo Plus
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Eye Glo Plus

Eye Glo Plus digunakan untuk melegakan ketegangan dan keletihan mata.

Doktor anda mungkin mempreskripsikan Eye Glo Plus untuk tujuan lain. Tanya doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tentang sebab Eye Glo Plus dipreskripsikan kepada anda.

Bagaimana Eye Glo Plus berfungsi

Eye Glo Plus mengandungi borax, Hamamelis water/witch hazel water dan boric acid sebagai bahan aktif.

Ubat mata ini mengandungi ciri-ciri antiseptik ringan dan sesuai untuk rawatan keradangan mata yang disebabkan oleh kerengsaan dan ketegangan.

Sebelum menggunakan Eye Glo Plus

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Eye Glo Plus jika anda alah kepada borax, Hamamelis water/witch hazel water, boric acid atau sebarang kandungan lain yang

disenaraikan pada bahagian akhir risalah ini.

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput pada pek ini.

Jika anda menggunakan ubat ini selepas tarikh luputnya, ia tidak akan berfungsi dengan baik.

Jangan menggunakan Eye Glo Plus jika bungkusannya koyak atau terdapat tanda bungkusannya dibuka.

- Sebelum menggunakan Eye Glo Plus

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat lain, makanan atau pengawet.

Beritahu doktor anda jika anda mengandung atau menyusukan bayi. Tiada maklumat berkaitan yang sedia ada.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Doktor dan ahli farmasi anda mempunyai lebih banyak maklumat tentang ubat lain yang perlu diberi perhatian atau dielakkan semasa anda menggunakan Eye Glo Plus.

Cara menggunakan Eye Glo Plus

Patuhi semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Arahan-arahan ini mungkin berbeza daripada informasi yang terkandung dalam risalah ini.

Sekiranya anda tidak faham arahan pada pek, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk pertolongan.

- Berapa banyak harus digunakan

Titis 2 hingga 3 titik ubat ke dalam setiap mata.

- Bila perlu digunakan

Guna 3 hingga 4 kali sehari, jika perlu atau seperti yang diarahkan oleh doktor.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Eye Glo Plus seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat dan kemudian kembali menggunakan ubat anda seperti biasa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terlebih menggunakan Eye Glo Plus, hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang terdekat dengan segera.

Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan Eye Glo Plus

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang sedang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Eye Glo Plus.

Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang menggunakan Eye Glo Plus.

Jika anda mengalami sakit mata yang teruk, perubahan dalam penglihatan, kemerahan atau kerengsaan mata yang berterusan, atau jika simptom semakin teruk atau berlarutan, hentikan penggunaan dan berjumpa dengan doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menggunakan Eye Glo Plus untuk merawat sebarang masalah lain melainkan diarah oleh doktor anda.

Jangan beri ubat anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

Jangan menggunakan ubat ini jika larutan berubah warna atau menjadi keruh, atau terdapat bendasing dalam larutan.

Jangan memakai kanta sentuh lembut semasa dan untuk satu tempoh selepas penggunaan ubat ini.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila memandu atau mengendalikannya mesin sehingga anda tahu bagaimana Eye Glo Plus mempengaruhi anda.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh membawa kesan sampingan. Kadang kala kesan sampingan ini serius, tetapi selalunya tidak.

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai sebarang kebimbangan mengenai kesan mengambil ubat ini.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mendapati apa-apa yang membuatkan anda rasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Eye Glo Plus

- Penyimpanan

Simpan ubat anda dalam pek asalnya sehingga tiba masa untuk menggunakannya.

Simpan ubat anda di tempat kering pada suhu bawah 25°C. Lindungi daripada cahaya.

Jangan guna ubat ini selepas 4 minggu dibuka.

Jangan simpan Eye Glo Plus atau ubat lain dalam bilik mandi atau dekat sinki.

Jangan tinggalkan ubat di atas unjuran tapak tingkap atau dalam kereta.

Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai ialah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

- Pelupusan

Jika doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan anda berhenti menggunakan Eye Glo Plus atau ubat ini sudah melepasi tarikh luputnya, sila tanya ahli farmasi anda apa yang patut dilakukan dengan sebarang ubat yang tinggal.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Eye Glo Plus merupakan larutan steril, tampan dan jernih.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

- Borax
- Hamamelis water/witch hazel water
- Boric acid

- Bahan tidak aktif:

- Disodium edetate
- Benzalkonium chloride solution 50%
- Sodium dihydrogen phosphate
- Sodium chloride

- Nombor MAL

MAL10120046X

Pengilang

Duopharma (M) Sdn. Bhd. (42491-M)
Lot. 2599, Jalan Seruling 59, Kawasan 3, Taman Klang Jaya, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Duopharma (M) Sdn. Bhd. (42491-M)
Lot. 2599, Jalan Seruling 59, Kawasan 3, Taman Klang Jaya, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP

14/03/2025

Nombor Siri:

NPRA (R4/1)071118/00323