

CETIL TABLET

Cefuroxime 250 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CETIL
2. Bagaimana CETIL berfungsi
3. Sebelum menggunakan CETIL
4. Cara menggunakan CETIL
5. Semasa menggunakan CETIL
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan CETIL
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan CETIL

CETIL digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria, seperti:

- Jangkitan saluran pernafasan (contohnya bronkitis, pneumonia)
- Jangkitan telinga, hidung, dan tekak (contohnya jangkitan telinga, jangkitan sinus/ resdung, radang tonsil)
- Jangkitan saluran kencing (contohnya jangkitan pundi kencing atau buah pinggang)
- Jangkitan kulit (contohnya bisul, impetigo)
- *Gonorrhea* (jangkitan kelamin)

Bagaimana CETIL berfungsi

CETIL mengandungi bahan aktif cefuroxime yang bertindak dengan menghalang sintesis dinding sel bakteria melalui pengikatan kepada protein sasaran penting, seterusnya membunuh bakteria tersebut.

Sebelum menggunakan CETIL

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap cefuroxime, antibiotik yang serupa dipanggil *cephalosporins*, penisilin atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Sebelum menggunakannya

- Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan CETIL. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini jika:
- anda mempunyai sejarah mengalami cirit-birit selepas mengambil antibiotik

- anda mempunyai masalah buah pinggang, kerana dos anda mungkin perlu disesuaikan

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

CETIL hanya harus digunakan semasa kehamilan jika doktor anda memutuskan ia benar-benar diperlukan.

CETIL boleh dirembeskan ke dalam susu ibu dalam jumlah yang kecil. Ini mungkin boleh menyebabkan cirit-birit atau jangkitan kulat (thrush) pada bayi. Bincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini semasa menyusu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Maklumkan kepada doktor anda jika anda mengambil:

- Ubat diuretik (ubat yang meningkatkan pengeluaran air kencing)
- Sebarang antibiotik lain
- Ubat yang mungkin menjejaskan fungsi buah pinggang anda

Cara menggunakan CETIL

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa:

- Kebanyakan jangkitan: 1 tablet, dua kali sehari
- Jangkitan saluran kencing: ½ tablet, dua kali sehari
- Jangkitan yang lebih teruk: 2 tablet, dua kali sehari
- *Gonorrhea*: 4 tablet sebagai dos tunggal

Kanak-kanak:

- Kebanyakan jangkitan: ½ tablet, dua kali sehari
- Jangkitan yang lebih serius: 1 tablet, dua kali sehari

- Bila perlu digunakan

Ambil dua kali sehari atau mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda, bersama makanan atau selepas makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Rawatan biasa mengambil masa kira-kira 5–10 hari.

Selesaikan keseluruhan tempoh rawatan seperti yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan boleh menyebabkan kerengsaan serebrum yang membawa kepada sawan.

Semasa menggunakan CETIL

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan CETIL

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

Gunakan CETIL hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan CETIL kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda:
 - Mengalami reaksi alahan seperti ruam, bengkak, atau sukar bernafas (hentikan pengambilan dan dapatkan rawatan perubatan segera)
 - Mengalami cirit-birit yang teruk atau berterusan
 - Perasan simptom anda tidak bertambah baik atau menjadi lebih teruk

Jangan gunakan lebih lama daripada yang ditetapkan kerana penggunaan yang berpanjangan boleh menyebabkan jangkitan lain.

Ubat ini mungkin mempengaruhi keputusan ujian gula dalam air kencing.

Memandu dan menggunakan jentera
Tidak berkaitan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, CETIL boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku:
Kesan sampingan biasa (biasanya ringan):

- Cirit-birit
- Loya atau muntah
- Sakit kepala

Kesan sampingan kurang biasa tetapi serius (dapatkan rawatan perubatan segera):

- Reaksi alahan yang teruk (ruam, bengkak, sukar bernafas)
- Reaksi kulit yang teruk (gelembung atau kulit mengelupas)
- Kulit atau mata menjadi kuning (jaundis)

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan adverse ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse* Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan CETIL

- Penyimpanan

Simpan di tempat kering pada suhu tidak melebihi 30°C.

Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem (*film-coated*) berwarna putih hingga putih kekuningan, berbentuk bikonveks dengan garisan belah pada satu sisi dan perkataan "LUPIN" tertera pada sisi yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
 - Cefuroxime axetil
- Bahan tidak aktif
Polyethylene glycol 4000, propylene glycol, colloidal silicon dioxide, purified water, talc, hydroxypropyl

methyl cellulose (Methocel E15), titanium dioxide, sodium lauryl sulphate, croscarmellose sodium, hydroxypropyl methyl cellulose (Methocel E5), microcrystalline cellulose, hydrogenated vegetable oil.

- Nombor MAL

MAL08061556AZ

Pengilang

LUPIN LTD.

198-202, New Industrial Area No. 2,
Mandideep-462 046
Dist. Raigarh (M.P.) INDIA

Pemegang Pendaftaran Produk

Biocare Pharmaceutical (M) Sdn. Bhd.
No. 28G, 28-1 & 28-2, Pusat Dagangan
PJCC, Jalan P JS 5/28, 46150 Petaling
Jaya, Selangor

Tarikh kemas kini RiMUP

06/04/2026

Nombor Siri

NPRA(R4/1)300326/00010