IXIME SUSPENSION

Cefixime (100mg dalam setiap 5ml)

Apakah yang ada dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan Ixime Suspension?
2. Bagaimana Ixime Suspension berfungsi
3. Sebelum anda menggunakan Ixime Suspension
4. Cara menggunakan Ixime Suspension
5. Semasa menggunakan Ixime Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Penyimpanan dan Pelupusan Ixime Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Ixime Suspension

Ixime Suspension digunakan untuk merawat jangkitan bakteria berikut: jangkitan tidak rumit pada pundi kencing atau saluran kencing, jangkitan telinga tengah (otitis media), jangkitan tekak (pharyngitis) atau radang tonsil (tonsillitis). Ia juga digunakan untuk merawat jangkitan dada seperti bronkitis akut atau bronkitis kronik yang tiba-tiba menjadi teruk, demam kepialu (typhoid fever) termasuk yang disebabkan oleh strain bakteria yang resistan terhadap ubat lain, serta gonorea), iaitu sejenis jangkitan kelamin yang menjejaskan serviks atau uretra.

Bagaimana Ixime Suspension berfungsi

Ixime Suspension mengandungi cefixime sebagai bahan aktif. cefixime tergolong dalam kumpulan antibiotik cephalosporin, yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria. Ia berfungsi dengan membunuh bakteria dan menghalang pertumbuhannya.

Sebelum menggunakan Ixime Suspension

- *Bila tidak boleh menggunakannya*

  Jangan ambil ubat ini jika:
  - Anda mempunyai alahan terhadap cefixime, antibiotik yang serupa atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- *Sebelum menggunakannya*

  Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Ixime Suspension, jika anda:
  - Menghidap penyakit buah pinggang atau sedang menjalani sebarang bentuk dialisis (seperti CAPD atau hemodialisis)
  - Mempunyai sejarah masalah saluran penghadaman, terutamanya keadaan keradangan usus yang teruk yang dikenali sebagai *colitis*.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

  Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

  Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil:
  - Carbamazepine (ubat epilepsi/sawan dan sakit saraf)
  - Warfarin dan Antikoagulan (pencair darah)
  - Probenecid (ubat gout)
  - Nifedipine (ubat tekanan darah tinggi dan sakit dada)

Cara menggunakan Ixime Suspension

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Berapa banyak harus digunakan

Cara mencampurkan ubat cecair:
1. Ketuk botol beberapa kali untuk melonggarkan serbuk di dalamnya.
2. Gunakan air mendidih yang telah disejukkan. Tuangkan ke dalam botol sehingga mencapai separuh daripada garisan penanda yang ditanda pada botol, kemudian goncangkannya dengan kuat.
3. Tambahkan lebih banyak air mendidih yang telah disejukkan sehingga ia mencapai garisan penanda dengan sempurna, dan goncangkan sekali lagi dengan baik untuk memastikan ubat bercampur dengan sebati.

Dos untuk kanak-kanak

- Ubat ini tidak sesuai untuk kanak-kanak di bawah umur 6 bulan.
- Untuk jangkitan umum, doktor anak anda akan menentukan dos berdasarkan berat badan mereka.
- Untuk diambil sekali sehari, atau dibahagikan kepada dua dos yang sama rata dengan jarak 12 jam.
- Jika berat anak anda lebih daripada 50 kg atau berumur lebih daripada 12 tahun, mereka harus mengambil dos dewasa standard.
- Kanak-kanak dengan masalah buah pinggang: Dos akan diselaraskan berdasarkan fungsi buah pinggang.

- *Bila perlu digunakan*

  Ambil sekali atau dua kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Untuk jangkitan tekak Strep/Tonsilitis: Jika jangkitan disebabkan oleh Streptococcus pyogenes, rawatan mesti diteruskan selama sekurang-kurangnya

10 hari untuk memastikan bakteria hilang sepenuhnya.

Untuk demam kepialu: Jika digunakan untuk merawat demam kepialu (*typhoid fever*) yang disebabkan oleh bakteria yang resistan terhadap ubat, dos yang lebih tinggi akan diberikan, dibahagikan kepada dua kali sehari selama 7 hari.

- *Jika anda terlupa menggunakan*
  Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- *Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)*
  Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa anda menggunakan Ixime Suspension

Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Ixime Suspension.

Maklumkan kepada doktor anda dengan segera sekiranya anda disahkan hamil semasa menggunakan ubat ini.

Gunakan Ixime Suspension hanya dengan preskripsi doktor.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Ixime Suspension kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Jika anda mengalami sebarang tanda-tanda reaksi alahan (seperti ruam, gatal-gatal, atau sesak nafas) semasa mengambil ubat ini, berhenti mengambilnya dengan segera dan mendapatkan rawatan perubatan.

Penggunaan ubat ini untuk tempoh yang lama kadangkala boleh menyebabkan pertumbuhan kuman atau kulat lain yang berbahaya dan resistan terhadap ubat (*drug-resistant germs or fungi*) di dalam badan anda. Jika anda menjalani rawatan untuk tempoh yang panjang, doktor akan memantau keadaan anda dengan teliti bagi memastikan tiada jangkitan baharu berlaku.

Ubat ini boleh menyebabkan keputusan "positif palsu" pada ujian perubatan tertentu. Beritahu doktor atau juruteknik makmal anda bahawa anda sedang mengambil ubat ini jika anda akan menjalani:

- Ujian air kencing tertentu untuk gula (glukosa), melainkan ujian berasaskan enzim digunakan.
- Ujian darah tertentu (seperti ujian Coombs langsung), yang boleh memberi kesan kepada penentuan jenis darah atau pemadanan transfusi.
- Ujian air kencing tertentu untuk keton.

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda berasa pening atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.
Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan Ixime Suspension terhadap anda.

Kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Ixime Suspension boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku adalah:

- Sistem penghadaman: Cirit-birit, perubahan najis, loya, sakit perut, ketidakhadaman (dispepsia), muntah, gas berlebihan (kembung perut), dan keradangan usus yang teruk *(pseudomembranous colitis*).
- Otak dan saraf: Sakit kepala, pening, dan sawan (terutamanya jika seseorang mempunyai masalah buah pinggang dan dosnya tidak dikurangkan).
- Reaksi hipersensitiviti: Ruam kulit, kegatalan, geligata (urtikaria), demam akibat ubat, sakit sendi dan keadaan kulit mengelupas/melepuh yang sangat jarang berlaku dan teruk (Erythema multiforme, Sindrom Stevens-Johnson dan Nekrolisis Epidermis Toksik).
- Gangguan darah: Kiraan platelet rendah, kiraan sel darah putih rendah, dan peningkatan dalam jenis sel imun tertentu (eosinofilia).
- Gangguan hati: Peningkatan sementara dalam enzim hati (transaminase, alkaline phosphatase)

dan kekuningan pada kulit atau mata (*jaundice*).
- Buah pinggang: perubahan pada fungsi buah pinggang (sementara)
- Lain-lain: Gatal-gatal di kawasan alat kelamin dan kerengsaan atau jangkitan faraj (vaginitis).

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Penyimpanan dan Pelupusan Ixime Suspension

- *Penyimpanan*
  Selepas dicampurkan, cecair tersebut boleh disimpan pada suhu bilik atau di dalam peti sejuk selama 14 hari. Pastikan botol ditutup rapat, goncangkannya dengan baik sebelum setiap penggunaan, dan buang sebarang ubat yang tinggal selepas 14 hari.
  Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

  Simpan serbuk kering pada suhu 20-25°C.

- *Pelupusan*
  Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*
  Serbuk berwarna putih pucat hingga kuning pucat yang membentuk suspensi putih pucat hingga kuning dengan bau buah yang khas.

- *Bahan-bahan*
  - Bahan aktif
    - Cefixime
  - Bahan-bahan tidak aktif
    - Xanthan Gum
    - Sodium Benzoate
    - Sucrose
    - Strawberry Flavor (052311 AP0551)
    - Colloidal Silicon Dioxide (Aerosil 200)

- *Nombor MAL:*
  MAL08051746AZ

Pengilang
Lupin Limited
198-202, New Industrial Area No.2, Mandideep 462046, INDIA

Pemegang Pendaftaran Produk
BioCare Pharmaceutical (M) Sdn. Bhd
No. 28G, 28-1 & 28-2, Pusat Dagangan PJCC Jalan PJS 5/28 46150 PETALING JAYA SELANGOR MALAYSIA

Tarikh kemas kini RiMUP
29/09/2026

Nombor Siri
NPRA(R4/1)180626/00033