

BIOWELL FAMOTAC FILM-COATED TABLETS 40 MG

Famotidine 40 mg

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg
2. Bagaimana BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg berfungsi
3. Sebelum menggunakan BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg
4. Cara menggunakan BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg
5. Semasa menggunakan BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg

Famotidine digunakan untuk rawatan jangka pendek bagi:

- Ulser duodenum
- Ulser gastrik (perut)
- Pengeluaran asid gastrik berlebihan dalam perut seperti *Zollinger-Ellison syndrome*)

Famotidine juga digunakan untuk:

- Mengelakkan berlakunya semula ulser duodenum
- Melegakan pedih ulu hati yang disebabkan oleh asid gastrik dalam saluran pernafasan
- Merawat hakisan dan ulser pada saluran pernafasan

Bagaimana BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg berfungsi

Famotidine tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai perencat atau penghalang reseptor H₂. Ia berfungsi dengan mengurangkan jumlah asid yang dihasilkan oleh perut. Ini membantu untuk mengurangkan kesakitan dan juga membolehkan ulser untuk sembuh.

Sebelum menggunakan BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg

- Bila tidak boleh mengambil

- Jangan mengambil ubat ini jika anda pernah mempunyai alahan kepada famotidine, ubat yang serupa atau mana-mana bahan terkandung dalam produk ini yang disenaraikan di bahagian akhir risalah ini.
- Jika anda tidak pasti untuk mula menggunakan famotidine, sila jumpa doktor atau ahli farmasi anda.

- Sebelum mula mengambil

Anda perlu memberitahu doktor anda:

1. Jika anda mempunyai alahan kepada:
 - Apa-apa ubatan
 - Apa-apa bahan seperti makanan, pengawet atau pewarna
2. Jika anda mempunyai apa-apa penyakit, terutamanya:
 - Masalah buah pinggang
 - Ulser gastrik (doktor kemungkinan akan mengaturkan ujian tambahan untuk membuat diagnosis kanser perut sebelum memulakan famotidine tablet kerana famotidine boleh melambatkan diagnosis tersebut)
 - Masalah kesihatan yang lain
3. Jika anda hamil atau menyusui atau merancang untuk hamil atau menyusui. Famotidine tidak boleh digunakan semasa hamil melainkan potensi manfaat melebihi potensi risiko kepada bayi. Famotidine boleh dikesan dalam susu manusia. Oleh itu, keputusan perlu dibuat sama ada untuk menghentikan penyusuan atau menghentikan ubat.

Jika anda belum memberitahu doktor atau ahli farmasi anda tentang perkara-perkara di atas, sila memberitahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mula menggunakan BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Sila memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi.
- Sila memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil sebarang ubat-ubatan yang disenaraikan di bawah:
 - Antasid – Jangan mengambil antasid dalam setengah hingga satu jam selepas mengambil famotidine.
 - Ketoconazole (ubat anti-kulat) – Famotidine harus diambil sekurang-kurangnya dua jam selepas mengambil ketoconazole.

Cara menggunakan BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg

- Berapa banyak harus digunakan

Dos bagi orang dewasa dan remaja:

Ulser duodenum: 40mg satu kali setiap hari sebelum tidur atau 20mg dua kali setiap hari

Mencegah ulser duodenum berulang: 20mg sebelum tidur

Ulser gastrik: 40mg sekali setiap hari sebelum tidur

Pengeluaran asid gastrik berlebihan (contohnya, *Zollinger-Ellison syndrome*): 20mg setiap 6 jam. Dos boleh diselaraskan mengikut keperluan. Sesetengah orang yang mengalami *Zollinger-Ellison syndrome* serius telah ditetapkan dos 160mg setiap 6 jam.

Penyakit Refluks Asid: 20mg dua kali sehari sehingga 6 minggu. Rawatan untuk orang yang mempunyai radang yang disebabkan oleh refluks asid adalah 20mg hingga 40mg dua kali sehari sehingga 12 minggu.

Masalah buah pinggang: Pelarasan dos diperlukan untuk orang yang mempunyai masalah buah pinggang. Oleh sebab

BIOWELL FAMOTAC FILM-COATED TABLETS 40 MG

Famotidine 40 mg

kesan sampingan telah dilaporkan pada orang yang mempunyai masalah buah pinggang, dos famotidine boleh dikurangkan kepada separuh daripada dos yang disyorkan atau kekerapan dos boleh dipanjangkan kepada 36 hingga 48 jam bergantung kepada respons individu untuk mengelakkan pengumpulan ubat berlebihan dalam badan.

- Bila perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Adalah penting untuk mengambil ubat mengikut preskripsi doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jangan gantikan dos anda untuk menggantikan dos yang tertinggal. Ambil dos seterusnya seperti biasa pada masa yang ditetapkan.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda terambil terlalu banyak ubat, hubungi doktor anda atau dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Simptom terlebih dos termasuk muntah, gelisah, membran mukus pucat, kemerahan mulut dan telinga dan ruam.

Semasa menggunakan BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat mengikut arahan doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat anda melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil ubat-ubatan lain sebelum mendapatkan nasihat doktor anda.

Jangan berkongsi ubat-ubatan anda dengan orang lain walaupun mereka mengalami simptom atau masalah yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda memandu dan mengendalikan mesin. Jika ubat ini menyebabkan anda rasa loya, pening atau penat atau sakit kepala, pastikan anda tidak memandu atau mengendalikan jentera dan beritahu doktor anda segera.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan famotidine biasa ialah seperti sakit kepala, mengantuk, loya, muntah, tiada selera makan, sembelit, cirit-birit, mulut dan kulit kering, ruam kulit, keguguran rambut, sakit otot atau sendi serta kekeliruan.

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan yang menjadi serius atau mengalami apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan BioWell Famotac Film-Coated Tablets 40mg

- Penyimpanan

Jauh daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah 30°C.

Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Pulangkan ubat yang tidak digunakan kepada ahli farmasi.

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa air atau bahan buangan isi rumah.

Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Pil segi empat, warna oren muda, serong dengan muka cembung cetek.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

BioWell Tablets	Famotac 40mg	Film-Coated mengandungi Famotidine 40 mg.
--------------------	-----------------	---

- Bahan Tidak Aktif

Lactose Monohydrate
Microcrystalline Cellulose
Polyvinylpyrrolidone K-30
Sodium Starch Glycolate
Colloidal Silicon Glycolate
Magnesium Stearate
Propylene Glycol
Sunset Yellow Lake
Iron Oxide Yellow
Hydropropyl Methyl Cellulose E-5
Hydropropyl Methyl Cellulose E-15
Titanium Dioxide
Talc

- Nombor MAL

MAL20XXXXXXAZ

Bentuk Dos: Oral

Cara Pembungkusan:

Pek blister 10 x 10's

Pengilang

HOVID Bhd.

Lot 56442, 7 ½ Miles, Jalan
Ipoh/Chemor,
31200 Chemor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Nutriworld Sdn Bhd

121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan
Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak.

Tarikh kemaskini RiMUP

12/02/2022

BIOWELL FAMOTAC FILM-COATED TABLETS 40 MG

Famotidine 40 mg

Nombor Siri

NPRA (R2) 22/104