

Bredicon® 75mcg Tablet

Desogestrel 75mcg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Bredicon® 75mcg Tablet
2. Bagaimana Bredicon® 75mcg Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Bredicon® 75mcg Tablet
4. Cara menggunakan Bredicon® 75mcg Tablet
5. Semasa menggunakan Bredicon® 75mcg Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Bredicon® 75mcg Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Bredicon® 75mcg Tablet

Bredicon digunakan untuk memberi keberkesanan kontraseptif bagi wanita yang ingin mencegah kehamilan.

Bagaimana Bredicon® 75mcg Tablet berfungsi

Bredicon dipanggil pil progestogen sahaja, atau pil mini. Bertentangan dengan pil gabungan, Bredicon tidak mengandungi hormon estrogen selain progestogen. Bredicon adalah berbeza daripada pil mini lain dengan mempunyai dos yang pada kebanyakan kes adalah cukup tinggi untuk menghalang sel telur masak. Akibatnya, Bredicon memberi keberkesanan kontraseptif yang tinggi. Bertentangan dengan pil gabungan, Bredicon boleh digunakan oleh wanita yang tidak bertoleransi dengan estrogen dan oleh wanita yang menyusui.

Sebelum mengambil Bredicon® 75mcg Tablet

Jangan gunakan Bredicon jika anda mempunyai mana-mana keadaan yang disenaraikan di bawah. Jika mana-mana ini berkenaan dengan anda, maklumkan doktor sebelum mula menggunakan Bredicon.

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Bredicon jika:

- Mempunyai trombosis. Trombosis adalah pembekuan darah dalam saluran darah, yang boleh mengakibatkan halangan dalam saluran darah tersebut {contohnya kaki (trombosis vena dalam), paru-paru (pulmonari embolia), jantung (sakit jantung) atau otak(strok)}
- Anda mempunyai atau pernah mempunyai penyakit hati dan fungsi hati (berdasarkan keputusan darah makmal) tidak pulih kepada biasa.
- Jika anda mempunyai kanser yang merebak apabila dipengaruhi oleh hormon (progestogens) seperti barah payudara yang tertentu.
- Wanita dengan pendarahan vagina yang tidak biasa, yang sebabnya belum didiagnosis.
- Kehamilan yang diketahui atau disyaki.
- Anda mempunyai alahan kepada desogestrel atau bahan kandungan lain Bredicon

Mengandung dan menyusui

Mengandung

Bredicon tidak boleh digunakan semasa mengandung. Jika kehamilan berlaku semasa rawatan dengan Bredicon, berhenti pengambilan Bredicon dengan serta-merta.

Menyusui

Bredicon tidak mempengaruhi pengeluaran atau kualiti susu ibu. Walau bagaimanapun, jumlah yang kecil etonogestrel dikumuhkan dalam susu ibu. Desogestrel boleh digunakan semasa menyusui. Walaupun begitu, perkembangan dan pertumbuhan bayi yang menyusui, di mana ibunya mengambil Bredicon harus diperhatikan dengan teliti.

-Sebelum mula mengambil

Jika anda tidak menggunakan kontraseptif hormon pada masa ini (atau pada bulan lepas), tunggu sehingga datang haid. Pada hari pertama haid anda, ambil tablet Bredicon yang pertama. Jika anda mengambil tablet pertama pada hari ke-2 hingga ke-5 haid anda, gunakan kaedah halangan tambahan kontrasepsi bagi 7 hari pertama pengambilan tablet.

Beritahu doktor jika anda mempunyai diabetes kerana anda perlu dipantau dengan teliti. Beritahu doktor bahawa anda mengambil Bredicon sebelum sebarang pembedahan.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda harus memaklumkan doktor atau ahli farmasi ubat apa yang anda ambil, terutamanya yang disenaraikan di bawah, sebelum anda mula mengambil kontraseptif ini. Ini termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dan ubat herba. Begitu juga, semak dengan doktor atau ahli farmasi sebelum memulakan sebarang ubat baru semasa anda mengambil kontraseptif ini, jadi mereka boleh menyemak agar gabungan itu selamat.

Terdapat ubat yang boleh menyebabkan enzim lalu meningkatkan pembuangan mengakibatkan pendarahan dan kegagalan kontraseptif. Ini boleh dilihat dengan hydantoins, barbiturates, primidone, carbamazepine, rifampicin, oxcarbazepine, rifabutin, felbamate, ritonavir, griseofulvin dan produk yang mengandungi St John's Wort.

Semasa rawatan dengan ubat arang, penyerapan tablet boleh dikurangkan dan boleh mengakibatkan kekurangan keberkesanan kontraseptif.

Jika anda dipreskripsikan satu siri rawatan yang pendek (sehingga dua bulan) bagi mana-mana ubat di atas, ia juga akan menjadikan kontraseptif ini kurang berkesan. Doktor akan mengesyorkan agar anda buat sementara menggunakan bentuk

kontraseptif yang berbeza untuk mencegah kehamilan.

Namun, jika anda mahu terus mengambil pil ini, anda perlu juga menggunakan kaedah kontraseptif tambahan (contohnya, kondom) selagi anda mengambil ubat yang mempengaruhi hati dan untuk sekurang-kurangnya empat minggu selepas berhentinya. Penting untuk anda bincang dengan doktor tentang pilihan anda.

Cara menggunakan Bredicon® 75mcg Tablet

-Berapa banyak harus digunakan

Satu tablet pada masa yang sama setiap hari.

-Bila perlu digunakan

Sejalur Bredicon mengandungi 28 tablet. Anak panah tercetak di sebelah hadapan jalur, antara tablet. Jika anda membalikkan jalur, di sebelah setiap tablet tercetak hari minggu setiap tablet harus diambil. Tablet harus diambil dalam masa 3 jam pada masa yang sama setiap hari. Telan tablet seluruhnya dengan air. Setiap kali anda memulakan jalur Bredicon yang baru, ambil tablet dari baris teratas. Contohnya, jika anda bermula pada hari Rabu, anda harus ambil tablet dari baris teratas yang ditandakan hari yang khususnya itu. Anda harus terus mengambil satu tablet sehari sehingga jalur itu kosong, sentiasa mengikut hala tuju yang ditunjukkan oleh anak panah. Dengan demikian anda boleh menyemak dengan mudah sama ada anda telah mengambil tablet harian anda. Anda mungkin mengalami pendarahan semasa menggunakan Bredicon tetapi anda perlu terus mengambil tablet seperti normal. Apabila jalur itu telah kosong, anda perlu bermula dengan pek Bredicon yang baru pada hari berikut tanpa gangguan dan tanpa menunggu untuk mengalami pendarahan.

Apabila bertukar daripada pil gabungan

Mulakan Bredicon pada hari pertama selepas tablet aktif pil gabungan yang terakhir; dalam kes ini langkah

berjaga-jaga kontraseptif tambahan tidak diperlukan.

Apabila bertukar daripada pil mini, suntikan, implant atau IUD hormon

Beralih pada bila-bila hari daripada pil mini yang lain. Mulakan Bredicon pada hari implant atau IUD dikeluarkan atau pada hari suntikan seterusnya akan diadakan, langkah berjaga-jaga kontraseptif tidak diperlukan.

Jika anda telah mempunyai pengguguran trimester pertama

Mula pengambilan Bredicon selepas pengguguran trimester pertama, langkah berjaga-jaga tambahan kontraseptif tidak diperlukan.

Selepas bersalin atau pengguguran trimester kedua

Anda boleh mula mengambil Bredicon antara 21 hingga 28 hari selepas kelahiran bayi anda. Jika anda mula mengambil Bredicon selepas itu, pastikan anda menggunakan kaedah halangan tambahan kontraseptif sehingga anda telah selesai 7 hari pertama pengambilan tablet. Walau bagaimanapun, jika anda telah mengadakan hubungan seks, pastikan anda tidak hamil sebelum memulakan Bredicon. Sila lihat bahagian 'Mengandung dan menyusu'.

-Berapa lama perlu digunakan

Anda boleh berhenti mengambil Bredicon bila-bila masa anda ingin. Pada hari anda berhenti, anda tidak lagi dilindungi daripada kehamilan.

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda lebih daripada 12 jam lewat:

Ambil tablet sebaik saja anda ingat dan ambil yang seterusnya pada masa biasa. Ini bermakna mengambil dua tablet dalam satu hari. Ini tidak memudaratkan. (Jika anda terlupa lebih daripada satu tablet, anda tidak perlu mengambil tablet-tablet yang terlepas sebelum ini.) Terus mengambil tablet anda seperti biasa, tetapi anda juga perlu menggunakan kaedah tambahan seperti kondom

untuk tujuh hari berikut kerana anda tidak dilindungi daripada kehamilan.

Jika anda kurang daripada 12 jam lewat:

Ambil tablet sebaik saja anda ingat, dan ambil tablet seterusnya pada masa biasa. Tindakan kontraseptif Bredicon dikekalkan. Jika anda terlepas satu atau lebih tablet pada hari pertama tablet diambil dan telah mengadakan hubungan seks dalam minggu sebelum terlepas tablet, anda berkemungkinan menjadi mengandung. Semakin banyak tablet berturut-turut tertinggal, semakin tinggi risiko bagi keberkesanan kontraseptif dikurangkan.

-Jika mengambil berlebihan (Terlebih dos)

Tiada kesan mudarat yang serius dilaporkan mengenai terlebih dos. Simptom lain termasuk meloya, muntah dan pada anak-anak gadis, sedikit pendarahan vagina. Rawatan perlu simptomatik.

Semasa menggunakan Bredicon® 75mcg Tablet

-Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda menyusu dan ingin menggunakan Bredicon, sila hubungi doktor.

Jika anda muntah atau menggunakan arang perubatan dalam tempoh 3-4 jam selepas mengambil tablet Bredicon, bahan aktif mungkin tidak diserap sepenuhnya. Ikut nasihat untuk dos yang tertinggal.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan Bredicon jika anda mengandung, atau jika rasa anda mungkin mengandung.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Ambil ubat ini dengan mulut, biasanya sekali sehari.

- Gunakan ubat ini secara tetap untuk mendapat manfaat yang terbanyak.
- Ingat mengambil ubat ini pada masa yang sama setiap hari melainkan jika diberitahu arahan lain oleh doktor.
- Ia mungkin mengambil masa sehingga seminggu sebelum manfaat sepenuhnya daripada ubat ini berkesan.
- Keadaan perubatan tertentu boleh memerlukan arahan dosis yang berbeza sebagaimana yang diarahkan oleh doktor.

Kesan-kesan sampingan

- Perubahan pada pendarahan haid, contohnya pendarahan yang tidak teratur
- Tiada haid
- Sakit kepala
- Berat badan meningkat
- Buah dada sakit
- Loya
- Jerawat
- Perubahan emosi
- Nafsu seks menurun

Sila berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi jika mempunyai kesan-kesan sampingan yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers →Reporting).

Cara penyimpanan dan pelupusan Bredicon[®] 75mcg Tablet

-Penyimpanan

Simpan pada suhu bilik (di bawah 30°C). Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada pakej.

-Pelupusan

Membuang produk ini dengan cara yang betul apabila luput atau tidak diperlukan lagi. Dapatkan nasihat ahli farmasi atau syarikat pelupusan sisa tempatan untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana membuang produk ini dengan selamat.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet berwarna putih, bulat rata serong tepi, sebelah mengandungi logo "B/75" dan sebelah lain 'plain'.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif adalah: Desogestrel

-Bahan kandungan bukan aktif : Polyvinyl Pyrrolidone (Povidone K-30), Lactose Monohydrate, Pre-gelatinized Maize Starch, Maize Starch, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide (Aerosil-200), DL- α -Tocopherol, Acetone

-Nombor MAL

Pengilang

[®]Cap Dagangan



Renata Limited
Milk Vita Road,
Section 7, Mirpur,
Dhaka- 1216, Bangladesh

Pemegang Pendaftaran Produk

VITAMODE SDN BHD

55 & 57, Lorong Sempadan 2,
(Off Boundary Road)
11400 Ayer Itam, Penang, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

25 Jun 2014