

HEXIDIN CREAM

Chlorhexidine Gluconate (1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hexidin cream
2. Bagaimana Hexidin cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hexidin cream
4. Cara menggunakan Hexidin cream
5. Semasa menggunakan Hexidin cream
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hexidin cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Hexidin cream

Ini adalah krim disinfektan yang boleh digunakan untuk pembasmian kuman atau pelinciran semasa prosedur wanita atau semasa bersalin.

Bagaimana Hexidin cream berfungsi

Hexidin mengandungi chlorhexidine yang mempunyai kesan bakterisidal (membunuh bakteria) atau bakteriostatik (menghentikan pertumbuhan bakteria).

Sebelum menggunakan Hexidin cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika anda mempunyai alahan terhadap Chlorhexidine Gluconate atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat Lanjut).

- Sebelum menggunakan Hexidin cream

Mengandung dan menyusukan anak. Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Hexidin Cream tidak sesuai digunakan bersama-sama dengan bahan yang dikenali sebagai agen anionik (bercas negatif).

Cara menggunakan Hexidin cream

- Berapa banyak harus digunakan

Bersihkan dan keringkan kawasan yang dirawat. Kemudian sapukan krim mengikut keperluan.

- Bila perlu digunakan

Sapukan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sapukan Hexidin Cream untuk tempoh yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Hexidin cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Hexidin cream.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Hexidin cream kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan krim disinfektan daripada terkena mata, telinga, dan mulut.

Untuk kegunaan luaran sahaja.

Kesan-kesan sampingan

Hexidin Cream mengandungi chlorhexidine. Maklumkan kepada anggota kesihatan anda jika anda mempunyai alahan terhadap chlorhexidine.

Berhenti menggunakan produk ini dan dapatkan bantuan perubatan segera jika anda mengalami reaksi hipersensitiviti seperti ruam, gatal-gatal, bengkak, kesukaran bernafas, pening, degupan jantung yang cepat atau kejutan anafilaksis (reaksi alahan yang teruk dan mengancam nyawa).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Hexidin cream

- Penyimpanan

Simpan di tempat kering di bawah suhu 30°C. Pastikan bekas ditutup rapat.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sebatian yang halus, homogen, berwarna putih hingga putih kekuningan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Chlorhexidine Gluconate Solution

- Bahan tidak aktif

Ceteostearyl alcohol, liquid paraffin poloxyl 40 stearate dan purified water

- Nombor MAL:

MAL06051585XZ

HEXIDIN CREAM

Chlorhexidine Gluconate (1% w/w)

Pengilang & Pemegang Pendaftaran

Produk

NORIPHARMA SDN. BHD.

Lot 5030, Jalan Teratai,
5 1/2 Mile off Jalan Meru,
41050 Klang,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

18/12/2024

No Siri

NPRA(R4/1)031224/00125