

Goutnor Tablet

Colchicine (0.5mg, 0.6mg).

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Goutnor
2. Bagaimana Goutnor berfungsi
3. Sebelum menggunakan Goutnor
4. Cara menggunakan Goutnor
5. Semasa menggunakan Goutnor
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara menyimpan dan pelupusan Goutnor
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP
12. Nombor Siri

Apakah kegunaan Goutnor

Colchicine adalah anti-gout ejen. Goutnor digunakan untuk merawat serangan gout. Goutnor juga boleh digunakan untuk mencegah keradangan gout apabila rawatan dimulakan dengan ubat lain seperti allopurinol and uricosuric drugs.

Bagaiman Goutnor berfungsi

Asid urik adalah salah satu bahan buangan badan. Bagi gout, kristal asid urik disimpan pada sendi menyebabkan sakit dan radang. Colchicine dianggap bertindak melawan tindak balas keradangan terhadap kristal urat, dengan kemungkinan menghalang pergerakan granulosit ke kawasan yang meradang. Sifat Colchicine lain, seperti interaksi dengan mikrotubulus, juga boleh menyumbang kepada operasi.

Sebelum menggunakan

Goutnor

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Goutnor jika:

- anda mempunyai alahan terhadap colchicine atau mana-mana ramuan lain dalam ubat ini
- anda mempunyai gangguan darah yang teruk.
- anda hamil

- anda menyusui
- anda mempunyai masalah buah pinggan atau hati yang teruk
- anda menjalani hemodialisis
- anda mempunyai masalah buah pinggan atau hati yang teruk dan mengambil ubat tertentu.

Jika anda tidak pasti sama ada mana-mana di atas berkaitan dengan anda, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil Goutnor tablet.

Sebelum mula menggunakan Goutnor

Beritahu dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Goutnor jika ada:

- mempunyai masalah dengan jantung, buah pinggang, sistem hati atau penghadaman
- telah lanjut usia dan mempunyai masalah kesihatan.
- mempunyai gangguan darah
- mempunyai alahan terhadap beberapa jenis gula (Produk ini mengandungi laktosa)

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat lain kebelakangan ini. Apabila Goutnor diambil bersama-sama dengan mana-mana ubat berikut, kesan sampingan yang disebabkan oleh keracunan colchicine mempunyai kemungkinan yang tinggi dan boleh menjadi serius dan mengancam nyawa:

- Antibiotik tertentu seperti clarithromycin, erythromycin, telithromycin, azithromycin (digunakan untuk merawat jangkitan) dan Nefazodone
- Ubat anti-virus seperti digunakan untuk merawat jangkitan HIV
- Ciclosporin (digunakan untuk mencegah penolakan organ

selepas pemindahan, psoriasis dan rheumatoid arthritis)

- Ubat anti-kulat seperti ketoconazole, dan itraconazole
- Ubat jantung tertentu seperti verapamil dan diltiazem

Sekiranya anda mengambil mana-mana ubat di atas, doktor anda mungkin menyesuaikan dos Colchicine anda atau menghentikan rawatan andasecara sementara. Sekiranya anda mempunyai masalah hati atau ginjal dan anda mengambil salah satu ubat di atas, anda harus berhenti mengambil tablet colchicine.

Ia juga penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil mana-mana ubat berikut:

- Cimetidine (digunakan untuk mengurangkan asid perut), kerana boleh meningkatkan jumlah colchicine dalam darah anda.
- Tolbutamide (digunakan untuk mengawal gula darah), kerana dapat meningkatkan jumlah colchicine dalam darah anda.
- Digoxin (digunakan untuk merawat keadaan jantung tertentu) dan 'fibrasi' (ubat-ubatan yang digunakan untuk menurunkan kolesterol), kerana Colchicine boleh meningkatkan risiko penyakit otot yang dikenali sebagai 'rhabdomyolysis'. Mengambil colchicine bersama cyclosporin atau "statin" juga meningkatkan risiko anda menghidap penyakit ini.

Cara menggunakan Goutnor

Sentiasa ambil dos ubat ini seperti mana yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Goutnor harus ditelan keseluruhan dengan segelas air.

Goutnor Tablet

Colchicine (0.5mg, 0.6mg).

Berapa banyak harus digunakan

Kemampuan pesakit bertindakbalas terhadap ubat adalah berbeza. Dos harus berbeza-beza mengikut berat badan atau reaksi individu terhadap toksisiti Colchicine.

Gout sirius

1-2 tablet setiap 2 jam sehingga hilang rasa sakit atau sehingga mual, muntah dan cirit-birit berlaku.

Kesakitan dan bengkak biasanya berkurang dalam masa 12 jam dan biasanya hilang dalam 48-72 jam.

Prophylaxis

Bergantung pada keadaan dan tindak balas dan toleransi pesakit, dosnya berbeza dari 1 tablet setiap hari 1-4 kali seminggu hingga 1 tablet setiap hari.

Pseudogout

Untuk melegakan serangan akut, 1-2 tablet setiap 2 jam sehingga rasa sakit hilang atau sehingga mual, muntah dan cirit-birit berlaku.

Prophylaxis

Bergantung pada keadaan dan tindak balas dan toleransi pesakit, sehingga 2 tablet setiap hari.

Bila perlu digunakan

Anda boleh gunakan untuk tujuan berikut:

- Rawatan gout akut
- Prophylaxis serangan gout semasa memulakan terapi dengan ubat allopurinol dan uricosuric

Berapa lama perlu digunakan

Anda tidak boleh mengambil lebih daripada 12 biji Goutnor dalam satu kursus rawatan. Setelah selesai satu kursus Goutnor, anda tidak boleh memulakan kursus lain sekurang-kurangnya tiga hari.

Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda terlupa mengambil dos, ambil dengan segera sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya hampir masa untuk dos seterusnya, jangan ambil dos yang

terlupa. Jangan ambil dos berganda untuk memenuhi dos yang terlupa. Jangan mengambil Colchicine dalam selang yang lebih pendek daripada yang ditetapkan oleh doktor anda. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut mengenai penggunaan ubat ini, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda mengambil lebih banyak Colchicine daripada anda sepatutnya, hubungi doktor atau kemalangan hospital terdekat dan jabatan kecemasan dengan serta-merta.

Dos Colchicine yang terlalu tinggi boleh menjadi serius toksik, malah membawa maut. Gejala awal dos Colchicine yang terlalu tinggi (yang muncul secara purata selepas 3 jam tetapi boleh memakan waktu lebih lama) termasuk rasa mual, muntah, sakit perut, cirit-birit berdarah dan tekanan darah rendah.

Semasa menggunakan Goutnor

Perkara yang perlu dilakukan

Ikuti arahan mengenai cara untuk menggunakan Goutnor dari profesional kesihatan anda. Kenal pasti gejala dan keperluan yang mendorong anda untuk berjumpa doktor dengan segera.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berlebihan dengan Goutnor atau mengambil ubat serentak lain tanpa berunding dengan doktor farmasi anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatikan symptom Goutnor yang berlebihan atau intoleransi.

Kesan-kesan sampingan

Sekiranya anda mengalami apa-apa kesan sampingan berikut, berhenti mengambil Colchicine dan segera hubungi doktor atau unit kecemasan hospital terdekat:

- Mual (rasa sakit), muntah (sakit), sakit perut dan cirit-birit.
- Gejala seperti demam, keradangan mulut, sakit tekak, pendarahan yang berpanjangan, lebam atau masalah kulit. Ini boleh menjadi tanda bahawa anda mengalami masalah darah yang serius akibat masalah di sum-sum tulang.
- Keradangan saraf yang boleh menyebabkan sakit, rasalemah, kesemutan atau kebas
- Kerosakan saraf
- Pendarahan gastrousus
- Kerosakan hati
- Ruam
- Sakit atau kelemahan otot
- Kerosakan otot yang tidak normal yang boleh menyebabkan masalah buah pinggang (rhabdomyolysis)
- Kerosakan buah pinggang
- Kitaran haid tidak teratur
- Keguguran rambut

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan adverbial kepada Pusat Pemantauan KesaAdvers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Goutnor

Jauhkan ubat ini daripada penglihatan dan jangkauan kanak-kanak. Simpan di dalam bungkusan asal untuk melindungi dari cahaya. Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada kotak dan blister selepas EXP. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan itu.

Jangan buang ubat-ubatan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah.

Goutnor Tablet

Colchicine (0.5mg, 0.6mg).

Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat-ubatan yang tidak digunakan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Goutnor 0.5mg

Tablet berbentuk bulat putih hingga putih dengan ukiran 'C' pada satu sisi

Goutnor 0.6mg

Tablet berbentuk bulat putih hingga putih dengan garis putus pada satu sisi

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Colchicine

Bahan tidak aktif:

Lactose monohydrate, corn starch, magnesium stearate, povidone k30, isopropyl alcohol purified water, talc, colloidal silicone dioxide

Nombor MAL

Goutnor 0.5mg

MAL11035010AZ

Goutnor 0.6mg

MAL11035011AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Noripharma Sdn. Bhd.

Lot 5030, Jalan Teratai,
5 ½ Mile off Jalan Meru,
41050 Klang, Selangor
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

28/4/2023

Nombor Siri

NPRA(R2/1)230427/1050