

PREDNISOLONE TABLET

Prednisolone 5mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Prednisolone Tablet
2. Bagaimana Prednisolone Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Prednisolone Tablet
4. Cara menggunakan Prednisolone Tablet
5. Semasa menggunakan Prednisolone Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Prednisolone Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Prednisolone Tablet

Merawat alahan, arthritis, masalah pernafasan (contohnya, asma), gangguan darah tertentu, penyakit kolagen (misalnya, lupus), kanser (contohnya, leukemia), masalah usus (contohnya, ulser kolitis), bengkak disebabkan oleh keadaan tertentu, atau keadaan kulit. Ia juga boleh digunakan untuk keadaan lain yang ditentukan oleh doktor anda.

Bagaimana Prednisolone Tablet berfungsi

Prednisolone adalah kortikosteroid. Ia berfungsi dengan mengubah tindak balas imun badan untuk pelbagai keadaan dan mengurangkan keradangan.

Sebelum mengambil Prednisolone Tablet

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil tablet Prednisolone jika anda:

- alah (hipersensitif) kepada prednisolone atau mana-mana bahan-bahan lain dalam tablet Prednisolone.
- Reaksi alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, kesukaran bernafas atau bengkak muka, bibir, tekak atau lidah.
- mempunyai kudis sejuk yang memberi kesan kepada mata
- mempunyai jangkitan yang tidak dirawat.

- Sebelum mula mengambil

Dapatkan nasihat ahli farmasi sebelum mengambil tablet Prednisolone jika anda:

- telah bersentuhan dengan sesiapa sahaja yang mempunyai cacar air, kayap atau campak. Hubungi doktor anda dengan segera untuk mendapatkan nasihat.
- mempunyai atau mempunyai sejarah keluarga diabetes atau glaukoma
- mempunyai oestoporosis, tekanan darah tinggi, serangan jantung baru-baru ini, ulser perut, kelenjar tiroid tidak begitu aktif, epilepsi, batuk kering atau septisemia
- telah mengambil tablet prednisolone (atau ubat yang sama) sebelum dan mempunyai masalah otot (steroid myopathy)
- mempunyai masalah / penyakit jantung, buah pinggang atau hati
- mengalami atau telah mengalami apa-apa penyakit mental
- sedang dirawat dengan vaksin
- pernah mempunyai kemurungan yang teruk atau manik-kemurungan (gangguan bipolar). Ini termasuk setelah mempunyai kemurungan sebelum semasa mengambil ubat-ubatan steroid seperti prednisolone.

- Maklumkan kepada doktor anda sebelum mengambil Prednisolone-Tablet, jika anda menghadapi:

- Sklerosis sistemik (gangguan autoimun). Pengambilan dos harian sebanyak 15 mg atau lebih boleh meningkatkan risiko komplikasi serius iaitu scleroderma renal crisis yang boleh menyebabkan tekanan darah

anda meningkat dan mengurangkan pengeluaran air kencing.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sesetengah ubat boleh berinteraksi dengan prednisolone. Beritahu pembekal penjagaan kesihatan anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain, terutamanya mana-mana yang berikut :

- *Clarithromycin*, *cyclosporine*, *estrogen* (contohnya, estradiol), kontraseptif oral (contohnya, pil kawalan kelahiran), atau *ketoconazole* kerana mereka boleh meningkatkan risiko kesan sampingan prednisolone ini
 - Barbiturat (contohnya, *phenobarbital*), *carbamazepine*, *ephedrine*, *hydantoins* (contohnya, *phenytoin*), atau rifampin kerana ia boleh mengurangkan keberkesanan prednisolone ini
 - *Anticholinesterases* (contohnya, *pyridostigmine*), aspirin, diuretik (contohnya, *hydrochlorothiazide*, *furosemide*), *methotrexate*, *mifepristone*, antibiotik quinolone (contohnya, *ciprofloxacin*), ritodrine, atau vaksin hidup dilemahkan atau vaksin hidup kerana risiko kesan sampingan mereka boleh ditambah dengan prednisolone
 - *Anticoagulants* (misalnya, *warfarin*), *hydantoins* (contohnya, *phenytoin*), atau dibunuh atau vaksin tidak aktif kerana keberkesananannya boleh dikurangkan oleh prednisolone
- Ini mungkin tidak senarai lengkap semua interaksi yang mungkin berlaku. Tanya pembekal penjagaan kesihatan anda jika prednisolone boleh berinteraksi dengan ubat-ubatan lain yang anda ambil. Semak dengan pembekal penjagaan kesihatan anda sebelum anda bermula, berhenti, atau menukar dos ubat-ubatan.

PREDNISOLONE TABLET

Prednisolone 5mg

Cara menggunakan Prednisolone Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan remaja: 5 hingga 60mg dalam dos tunggal atau dibahagikan.

Untuk eksaserbasi akut multiple sklerosis: 200mg setiap hari selama seminggu dan diikuti dengan 80mg setiap hari selama satu bulan.

Bagi kanak-kanak: 0.14mg untuk 2mg setiap hari dalam dos dibahagikan bergantung kepada tanda-tanda dan faktor-faktor klinikal yang lain.

Dos penyelenggaraan: Tidak lebih daripada 40mg setiap hari.

Dos buat orang tua: seperti untuk orang dewasa walaupun dos yang seharusnya minimum yang diperlukan untuk mencapai kesan terapeutik yang dikehendaki.

- Bila perlu digunakan

Telan tablet, dengan sedikit air sebagai dos tunggal atau dibahagikan seperti diarahkan oleh doktor.

- Berapa lama perlu digunakan

Jangan berhenti mengambil ubat tanpa berbincang dengan doktor anda, anda, mungkin perlu mengurangkan dos secara beransur-ansur.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlepas dos prednisolone, ambil secepat mungkin. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos tertinggal dan kembali kepada jadual dos biasa anda. Jangan mengambil 2 dos sekaligus.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda (atau orang lain) menelan banyak pil pada masa yang sama, atau anda berfikir

kanak-kanak mungkin tertelan apa-apa, hubungi jabatan kecemasan hospital yang terdekat atau beritahu doktor anda dengan segera.

Semasa menggunakan Prednisolone Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Elakkan alkohol semasa anda menggunakan prednisolone.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menerima vaksin hidup (contohnya, campak, beguk, cacar) semasa anda mengambil prednisolone. Berbincanglah dengan doktor anda sebelum anda menerima sebarang vaksin.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Prednisolone boleh mengurangkan keupayaan badan anda untuk melawan jangkitan. Elakkan sentuhan dengan orang-orang yang mempunyai selesema atau jangkitan. Beritahu doktor anda jika anda dapati tanda-tanda jangkitan seperti demam, sakit tekak, ruam, atau menggigil. Pesakit kencing manis - Prednisolone boleh menjejaskan gula darah anda. Periksa paras gula darah dengan teliti. Tanya doktor anda sebelum anda menukar dos ubat kencing manis anda.

Kehamilan dan penyusuan: Jika anda hamil, hubungi doktor anda. Anda perlu berbincang manfaat dan risiko menggunakan prednisolone semasa anda hamil. Prednisolone ditemui dalam susu ibu. Jika anda sedang atau akan menyusu semasa anda menggunakan prednisolone, periksa dengan doktor anda. Membincangkan apa-apa risiko yang mungkin untuk bayi anda.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat-ubatan boleh menyebabkan kesan sampingan, tetapi ramai orang tidak, atau kecil, kesan sampingan. Semak dengan doktor anda jika ada kesan-kesan sampingan yang paling biasa ini berterusan atau menjadi mengganggu: Jerawat; kecuai; pening; curahan muka; rasa gerakan berpusing-pusing; ketidakselesaan badan umum; sakit kepala; meningkat selera makan; meningkat berpeluh, mual; gemuruh; tidur; sakit perut. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my (Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Prednisolone Tablet

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang kering di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat putih ke hampir putih dengan skor pada satu belah.

- Bahan-bahan kandungan
-Bahan aktif

PREDNISOLONE TABLET

Prednisolone 5mg

Prednisolone

-Bahan tidak aktif

Sodium starch glycolate,
Corn starch, Lactosa,
Magnesium stearate,
Povidone K30, Colloidal
silicone dioxide, Air.

- Nombor MAL:
MAL20012727A

**Pengilang & Pemegang
Pendaftaran Produk**

Pahang Pharmacy Sdn. Bhd.
Lot 5979, Jalan Teratai,
5 ½ Miles off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor

Tarikh Kemaskini RiMUP
27/9/2023

Nombor siri:
NPRA(R2/1)230622/1087