

RHINITIN TABLET

RHINITIN SYRUP

Loratadine (10mg, 5mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Rhinitin
2. Bagaimana Rhinitin berfungsi
3. Sebelum mengambil Rhinitin
4. Cara menggunakan Rhinitin
5. Semasa menggunakan Rhinitin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Rhinitin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Rhinitin

Rhinitin Tablet digunakan untuk melegakan gejala yang berkaitan dengan rinitis alergi (contohnya, demam alergi), seperti bersin, hidung berair atau gatal, dan mata pedih atau gatal, geligata atau ruam netel dan lain-lain gangguan alergi kulit.

Bagaimana Rhinitin berfungsi

Loratadine tergolong dalam satu kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai antihistamina. Antihistamina membantu mengurangkan gejala alahan dengan mencegah kesan daripada bahan yang dipanggil histamina, yang dihasilkan dalam badan semasa tindak balas alergi.

Sebelum mengambil Rhinitin

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Rhinitin

- Jika anda alah (hipersensitif) dengan loratadine atau mana-mana bahan yang terkandung dalam ubat ini.

- Sebelum mula mengambil

Berbincang dengan doktor anda atau ahli farmasi jika anda mempunyai penyakit hati yang teruk atau mengalami kemerosotan fungsi buah pinggang.

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan susu ibu kepada anak.

Loratadine dirembeskan ke dalam susu ibu. Pertimbangkan untuk menghentikan penyusuan susu ibu semasa dirawat dengan loratadine, atau untuk menghentikan ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda mengenai semua ubat yang anda gunakan. Ini termasuk ubat yang memerlukan preskripsi, ubat tanpa preskripsi, vitamin, dan produk herba. Jangan memulakan ubat baharu tanpa memberitahu doktor anda.

Ubat yang boleh berinteraksi dengan Rhinitin adalah

- Ketoconazole (antikulat)
- Erythromycin (antibiotik)
- Cimetidine (untuk rawatan ulser gastrik)

Terdapat ubat-ubat lain yang mungkin boleh berinteraksi dengan loratadine.

Cara menggunakan Rhinitin

- Berapa banyak harus digunakan

Rhinitin Tablet
Dewasa & kanak-kanak 12 tahun ke atas: Ambil satu tablet sehari.

Rhinitin Syrup

Kanak-kanak berumur 2 hingga 12 tahun:

Berat Badan >30 kg : Beri dua 5 ml sudu teh sirap sekali sehari.

Berat Badan ≤ 30 kg : Beril satu 5 ml sudu the sirap sekali sehari.

Keselamatan dan keberkesanan loratadine pada kanak-kanak di bawah umur dua tahun belum diketahui.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat sekali sehari dengan atau tanpa makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil ia selama yang doktor anda telah mengarahkan anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk mengambil satu dos, ambil sebaik sahaja anda ingat. Walau bagaimanapun, jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal itu. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Sedasi, kadar jantung yang meningkat dan sakit kepala juga telah dilaporkan bagi kes dos berlebihan.

Semasa menggunakan Rhinitin

- Perkara yang perlu dilakukan

- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Rhinitin.

- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Gunakan loratadine tepat seperti yang diarahkan pada label, atau sebagaimana yang ditetapkan oleh doktor anda. Jangan gunakan dalam jumlah yang berbeza atau lebih lama daripada yang disyorkan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Loratadine boleh meresap ke dalam susu ibu dan boleh membahayakan bayi yang menyusu. Jangan gunakan ubat ini tanpa memberitahu doktor anda jika anda menyusukan bayi.

RHINITIN TABLET

RHINITIN SYRUP

Loratadine (10mg, 5mg/5ml)

Jangan berikan Rhinitin kepada sesiapa, walaupun mereka mengalami simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda dijadualkan untuk menjalani apa-apa ujian kulit untuk alahan, anda harus berhenti mengambil ubat ini selama dua hari sebelum ujian itu.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan yang paling biasa boleh berlaku termasuk keletihan, sakit kepala, mulut kering, sedasi, radang perut dan loya.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Rhinitin

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang kering di bawah suhu 30°C.
Lindungi daripada cahaya.
Simpan jauh daripada kanak-kanak
Pastikan bekas tertutup rapat

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui sisa air atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

- Rupa dan warna produk

Rhinitin Tablet
Tablet putih atau putih pudarberbentuk segiempat bujur dengan skor pada satu permukaan

Rhinitin Syrup
Sirap jernih dengan rasa buah

- Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif
Loratadine

-Bahan-bahan tidak aktif
Rhinitin Tablet
Corn starch, Pregelatinised starch, Lactose, Microcrystalline cellulose, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate, Sodium starch glycolate. Purified water.

Rhinitin Syrup
Glycerin, Citric Acid Monohydrate, Refined sugar, Sodium benzoate, peach flavor, propylene glycol, purified water.

- Nombor MAL:

Rhinitin Tablet
MAL20020536AZ

Rhinitin Syrup
MAL20020537AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Noripharma Sdn. Bhd.
Lot 5030, Jalan Teratai,
5 1/2 Miles off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor, Malaysia

Tarikh Kemaskini RiMUP

14/08/2024

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)170724/00093

Maklumat lanjut