

PROME SYRUP

Promethazine hydrochloride (5 mg/5ml, 10 mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Prome Syrup.
2. Bagaimana Prome Syrup berfungsi.
3. Sebelum mengambil Prome Syrup.
4. Cara menggunakan Prome Syrup.
5. Semasa menggunakan Prome Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Prome Syrup.
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Prome Syrup

Ubat ini digunakan:

- melegakan alahan yang menyebabkan bersin, kesesakan, hidung gatal dan mata berair (rinitis alergi), gatal-gatal, dan juga tindak balas alahan yang teruk akibat ubat atau bahan asing
- membantu dalam penenang sebelum atau selepas pembedahan atau semasa bersalin (rawatan tambahan)
- mencegah dan mengurangkan loya dan muntah
- penggunaan jangka pendek sahaja: Untuk membantu orang dewasa tidur jika mereka mengalami kesukaran tidur (insomnia) dan untuk menenangkan kanak-kanak apabila ubat penenang diperlukan.

Bagaimana Prome Syrup berfungsi

Prome Syrup mengandungi bahan aktif promethazine, yang berfungsi dengan menghalang histamin yang dihasilkan oleh badan semasa tindak balas alahan. Ia juga berfungsi secara langsung pada otak, mengelakkan loya dan muntah, membantu anda tidur, mengurangkan kebimbangan, dan meningkatkan kesan ubat penahan sakit dan sedatif.

Sebelum mengambil Prome Syrup

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini dan beritahu doktor anda jika:

- Anda alah (hipersensitif) kepada promethazine hydrochloride atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- Anda mengambil antidepresan tertentu [dipanggil monoamine oxidase inhibitors (MAOI)] dalam 14 hari yang lalu.
- Sebelum mula mengambil
Beritahu doktor anda jika anda mempunyai:
 - Peningkatan tekanan mata (glaucoma)
 - Ulser perut atau tersumbat
 - masalah prostat atau kesukaran membuang air kecil
 - Sejarah sawan
 - Apnea tidur (berhenti bernafas semasa tidur).
 - Masalah hati (kulit/mata menguning, dikenali sebagai jaundis).
 - Alahan yang diketahui kepada natrium metabisulfid (ubat ini mengandunginya, dan ia boleh menyebabkan tindak balas yang teruk pada orang yang sensitif).
 - Apabila digunakan untuk rawatan batuk dan selsema:
 - (a) Tidak boleh digunakan pada kanak-kanak berumur kurang daripada 2 tahun.
 - (b) Untuk digunakan dengan berhati-hati dan nasihat doktor/ahli farmasi pada kanak-kanak berumur 2 hingga 6 tahun.

Mengandung dan penyusuan

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk mengandung atau menyusu sebelum menggunakan sebarang ubat.

Jangan gunakan sirap promethazine dalam dua minggu terakhir kehamilan, kerana ia boleh menyebabkan memberi kesan pada bayi. Hanya gunakan ubat ini semasa mengandung jika manfaat melebihi risiko kepada bayi.

Sebilangan kecil ubat ini boleh masuk ke dalam susu ibu, tetapi biasanya terlalu sedikit untuk menyebabkan kemudatan. Sentiasa semak dengandoktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan jika anda sedang menyusukan bayi.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil:

- Alkohol
- Pil tidur
- Ubat penahan sakit yang kuat (jenis opioid)
- Sedatif / penenang (ubat yang menenangkan atau melegakan anda)
- Antidepresan
- Barbiturat (sejenis ubat tidur atau penenang)

Jika anda akan menjalani sebarang prosedur atau pembedahan, beritahu doktor atau jururawat anda bahawa anda sedang mengambil promethazine.

Cara menggunakan Prome Syrup

- Berapa banyak harus diambil

Untuk gejala alahan:

Kanak-kanak 2-5 tahun: 5 - 15 mg sebagai dos tunggal ATAU 5 mg dua kali sehari. Dos harian maksimum 15 mg.

Kanak-kanak 5-10 tahun: 10 - 25 mg sebagai dos tunggal ATAU 5-10 mg dua kali sehari

Dewasa (termasuk warga tua) dan kanak-kanak berumur 10 tahun ke atas: Mulakan dengan 10 mg dua kali sehari; boleh meningkat sehingga 20 mg tiga kali sehari.

PROME SYRUP

Promethazine hydrochloride (5 mg/5ml, 10 mg/5ml)

Untuk loya dan muntah:

Kanak-kanak 2-5 tahun: 5 mg untuk diambil pada malam sebelum perjalanan, ulang setiap 6-8 jam jika perlu.

Kanak-kanak 5-10 tahun: 10 mg untuk diambil pada malam sebelum perjalanan, ulang setiap 6-8 jam jika perlu.

Dewasa (termasuk warga emas) dan kanak-kanak berumur 10 tahun ke atas: 25 mg untuk diambil pada malam sebelum perjalanan, ulangi setiap 6-8 jam jika perlu.

- Bila perlu diambil

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu diambil

Gunakan ubat ini untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa mengambil

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika hampir tiba masanya untuk dos seterusnya, tunggu sehingga kemudian untuk mengambil ubat dan langkau dos yang terlepas. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (Terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda atau sesiapa sahaja mungkin menggunakan terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak ubat ini boleh menyebabkan tidur nyenyak atau tidak sedarkan diri (kesan mungkin lewat terjadi), sawan, melihat atau mendengar perkara yang tidak nyata (halusinasi), kekeliruan teruk, kebingungan, kepekaan luar biasa terhadap sentuhan atau kesakitan, degupan jantung yang sangat cepat, kulit memerah, mulut kering, dan anak mata yang membesar.

Semasa menggunakan Prome Syrup

- Perkara yang perlu lakukan

- Guna ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Prome Syrup.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan Prome Syrup kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika ubat ini membuatkan anda berasa mengantuk, pening, atau kurang berjaga-jaga, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Prome Syrup boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Kesan sampingan yang mungkin adalah:

- Mengantuk pada siang hari
- Pening
- Berasa agak keliru atau tidak ketahuan
- Sakit kepala ringan
- Gegaran atau sentakan pada tangan atau kaki pada waktu malam
- Kawalan otot yang lemah

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan Pelupusan Prome Syrup

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Pastikan bekas sentiasa ditutup rapat. Lindungi dari cahaya. Jauhi ubat dari kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair jernih yang berwarna perang cair dengan rasa raspberi

PROME SYRUP

Promethazine hydrochloride (5 mg/5ml, 10 mg/5ml)

- Bahan-bahan Kandungan

Bahan aktif

Promethazine Hydrochloride

Bahan tidak aktif

Refined sugar, purified water,
methylparaben, citric acid monohydrate,
liquid caramel colour, raspberry
flavour, sodium saccharin, Sodium
metabisulfite dan Disodium Edetate.

- Nombor MAL:

Prome 5mg/5ml Syrup

MAL08042449AZ

Prome 10mg/5ml Syrup

MAL08042450AZ

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

Noripharma Sdn. Bhd.,
Lot 5030, Jalan Teratai,
5 ½ Mile off Jalan Meru,
41050 Klang, Selangor.

Tarikh kemaskini RiMUP

13/03/2026

Nombor Serial:

NPRA(R4/1)270825/00067