

ACETAMOL TABLET

Paracetamol (650mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Acetamol
2. Bagaimana Acetamol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Acetamol
4. Cara menggunakan Acetamol
5. Semasa menggunakan Acetamol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Acetamol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Acetamol

Acetamol digunakan untuk melegakan kesakitan yang ringan hingga sederhana seperti:

- sakit kepala,
- sakit belakang
- sakit haid
- Sakit badan akibat selesema dan demam
- Arthritis yang ringan (sakit sendi)

Ia juga membantu melegakan demam.

Bagaimana Acetamol berfungsi

Acetamol mengandungi paracetamol yang berfungsi menghalang penghantaran signal rasa sakit sampai ke otak. Ia juga bertindak pada otak untuk mengurangkan demam.

Sebelum mengambil Acetamol

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ubat ini jika anda alah kepada paracetamol atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Sebelum mula menggunakan Acetamol

Sila dapatkan nasihat doktor anda atau ahli farmasi jika anda mempunyai:

- Kerosakan buah pinggang
- Kerosakan hati
- Ketagihan alcohol

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Walaupun paracetamol merentasi plasenta, ia adalah selamat digunakan dalam jangka pendek semasa kehamilan.

Paracetamol dirembes ke dalam susu ibu, tetapi ia nampaknya tidak membawa risiko kepada bayi.

- Jika mengambil ubat- ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Ubat-ubatan yang mungkin mengganggu Acetamol Tablet adalah:

- Ubat anti-tibi: isoniazid, rifampicin
- Ubat antiviral: zidovudine
- *Immunomodulator*: interferon alpha
- Ubat anti-sawan: carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, primidone, lamotrigine
- Ubat anti-muntah: metoclopramide, domperidone
- Ubat tahan sakit: analgesik narkotik: pethidine
- Ubat antikolinergik: propantheline
- Ubat anti-gout: Probenecid
- Ubat penurunan kolesterol: Colestyramine
- Ubat kanser: Busulfan
- Alkohol
- Ubat cair darah: Warfarin

Cara menggunakan Acetamol

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: 1 hingga 1 ½ tablet untuk diambil setiap 4 hingga 6 jam atau mengikut keperluan, tidak melebihi 6 tablet sehari.

- Bila perlu digunakan

Untuk diambil setiap 4 hingga 6 jam atau apabila perlu atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Acetamol untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan Acetamol

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Tanda-tanda awal terlebih dos (biasanya loya dan muntah, walaupun mungkin juga termasuk kelesuan dan berpeluh) biasanya reda dalam tempoh 24 jam.

Nekrosis hati (kematian tisu hati) atau nekrosis buah pinggang, yang jarang berlaku, mungkin berlaku dalam tempoh 24 jam selepas pengambilan dos berlebihan paracetamol.

Sakit perut mungkin merupakan tanda pertama kerosakan hati, yang biasanya tidak ketara selama 24 hingga 48 jam dan kadang-kadang boleh tertangguh sehingga 4 hingga 6 hari selepas pengambilan.

Kerosakan hati biasanya mencapai tahap maksimum dalam tempoh 72 hingga 96 jam selepas pengambilan. Kegagalan hati, ensefalopati (kerosakan atau penyakit otak), koma, dan kematian mungkin berlaku.

Semasa menggunakan Acetamol

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Acetamol.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Persediaan ini mengandungi paracetamol. Jangan ambil bersama

ACETAMOL TABLET

Paracetamol (650mg)

ubat-ubatan lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Acetamol kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

Jangan melebihi dos yang disyorkan.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Paracetamol memberikan kelegaan simptomatik sahaja, terapi tambahan untuk merawat punca kesakitan atau demam patut dimulakan apabila perlu.

Pesakit perlu menghubungi anggota kesihatan jika sakit berterusan lebih daripada 10 hari atau demam berterusan lebih daripada 3 hari.

Kesan-kesan sampingan

Amaran alahan:

Paracetamol boleh menyebabkan tindak balas kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam.

Ini mungkin merupakan tanda-tanda keadaan serius. Jika tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaannya dan dapatkan bantuan perubatan segera.

Kesan advers lain yang dilaporkan termasuk gangguan darah.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Acetamol

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi

anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem berbentuk bujur berwarna putih hingga putih kekuningan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:
Paracetamol

- Bahan tidak aktif:-

Sodium starch Glycolate, Corn Starch, Colloidol Silicone Dioxide, Povidone, Purified water, Talc, Magnesium stearate, *Coating*: Opadry QX Quick and Flexible Film Coating System 321A180025 white.

- Nombor MAL

MAL10100184XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Noripharma Sdn. Bhd.
Lot 5030, Jalan Teratai,
5 ½ Mile off Jalan Meru,
41050 Klang,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP:

06/01/2025

Nombor siri:

NPRA(R4/1)201224/00128