

FUSATE H CREAM

Fusidic acid 20mg and Hydrocortisone acetate 10mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan FUSATE H CREAM
2. Bagaimana FUSATE H CREAM berfungsi
3. Sebelum menggunakan FUSATE H CREAM
4. Cara menggunakan FUSATE H CREAM
5. Semasa menggunakan FUSATE H CREAM
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan FUSATE H CREAM
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan FUSATE H CREAM

FUSATE H CREAM menggabungkan tindakan anti-bakteria asid fusidic (antibiotik) dengan kesan anti-radang hydrocortisone asetat (corticoid). Ia digunakan untuk rawatan topikal dijangkiti atopik dermatitis (dikenali sebagai ekzema, penyakit kulit yang disertai oleh keradangan, kemerahan, exudation atau scabs dan gatal-gatal, kerap daripada yang asal alahan). Kerana kandungan hydrocortisone kemuncak, Fusate-H Cream amat sesuai dalam kes-kes di mana kortikosteroid yang lebih ringan (sekumpulan hormon steroid yang dihasilkan dalam korteks adrenal vertebrata, dan bahan-bahan sintetik dengan ciri-ciri seperti.) Ia ditandakan, termasuk lebih ringan dermatoses radang pada muka dan Kanak-kanak `kulit. Fusate-H Cream adalah kosmetik yang boleh diterima untuk digunakan pada muka dan tangan dan mudah untuk digunakan dalam garis menyertai, dan kawasan ketiak.

Bagaimana FUSATE H CREAM berfungsi

Asid Fusidic membunuh kuman (bakteria) terutamanya gram organisma positif yang menyebabkan jangkitan.

The kortikosteroid mengurangkan apa-apa bengkak, kemerahan atau gatal kulit anda. Ia digunakan untuk merawat Syarat mana kulit meradang (ekzema atau dermatitis) dan dijangkiti, atau mungkin menjadi dijangkiti, oleh kuman (bakteria).

Sebelum menggunakan FUSATE H CREAM

Bila tidak boleh menggunakan

jika anda alah (hipersensitif) kepada asid fusidic / fusidate natrium atau hydrocortisone asetat.

Disebabkan ubat ini mengandungi steroid.

jangan menggunakan jika:

- Untuk merawat jangkitan kulit yang disebabkan oleh kulat, seperti kaki atau kurap makan air.
- Untuk merawat keadaan kulit yang disebabkan oleh virus, seperti kudis sejuk atau cacar air.
- Untuk merawat keadaan kulit yang disebabkan hanya oleh bakteria, seperti bisul atau tempat.
- Untuk merawat keadaan kulit yang disebabkan oleh batuk kering (TB).
- Untuk merawat keadaan yang dipanggil dermatitis perioral. Ini adalah ruam turun naik merah di sekeliling mulut atau dagu.
- Untuk merawat keadaan kulit dipanggil rosacea. Ini adalah kemerahan dan keradangan lebih hidung dan pipi anda.

Tanya doktor anda jika anda tidak pasti.

Mengandung dan menyusukan anak

Jika anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusukan anak bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil sebarang ubat

Sebelum mula menggunakan FUSATE H CREAM

- ☐ Beritahu doktor anda sebelum anda mula mengambil ubat ini.
- ☐ FUSATE H CREAM hendaklah digunakan dengan berhati-hati apabila digunakan berhampiran mata. tidak boleh ia masuk mata. - Penggunaan
- ☐ FUSATE H CREAM adalah terhad kepada 2 minggu. rawatan jangka panjang boleh mengakibatkan risiko kesan sampingan yang meningkat dan risiko rintangan antibiotik, contohnya kulit anda boleh menjadi nipis
- ☐ FUSATE H CREAM mungkin topeng gejala potensi jangkitan
- ☐ FUSATE H CREAM mungkin membuat anda lebih terdedah kepada jangkitan, gangguan jangkitan yang sedia ada dan pengaktifan jangkitan pendam.

Kanak-kanak dan remaja

FUSATE H CREAM harus digunakan dengan penjagaan kanak-kanak.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru

FUSATE H CREAM

Fusidic acid 20mg and Hydrocortisone acetate 10mg

ini mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi. Kesan dari sebarang ubat-ubatan ini atau FUSATE H CREAM

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan tanpa preskripsi.

Cara menggunakan FUSATE H CREAM

Berapa banyak harus digunakan

Masa rawatan biasa adalah kira-kira dua minggu. Tanya doktor anda sebelum menggunakan ubat ini untuk apa-apa lagi. Biasanya anda perlu menggunakan krim ini dua atau tiga kali setiap hari.

Untuk luka-luka dilindungi, sapuan kurang kerap mungkin mencukupi

Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Dua kali sehari mungkin setiap pagi dan petang.

Berapa lama perlu digunakan

Anda akan melihat kulit anda bertambah baik selepas hanya beberapa hari menggunakan krim tersebut. Jika tidak terdapat sebarang peningkatan selepas tujuh hari anda perlu berhenti menggunakan krim ini dan

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini hanya untuk menggunakan pada kulit atau kulit kanak-kanak. Jangan menelannya

Perkara yang perlu diberi perhatian

kembali kepada doktor anda. Jangan gunakan untuk masa yang lama, secara berterusan (tanpa henti), kerana ubat ini

mengandungi steroid. Jangan gunakan krim pada diri anda atau anak lebih daripada 2 minggu

Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat.

Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan FUSATE H CREAM

Perkara yang perlu dilakukan

Basuh tangan anda sebelum menggunakan FUSATE H CREAM

- Keluarkan penutup. Semak meterai tidak rosak sebelum anda mula-mula menggunakan krim. Kemudian tolak kenaikan dalam topi melalui meterai dalam tiub.
- Gosok krim perlahan-lahan pada kulit. Jika doktor anda telah memberitahu anda untuk menggunakannya di wajah anda
- berhati-hati untuk
- mengelakkan mata anda. Jika
- anda secara tidak sengaja
- mendapat apa-apa perubatan di mata anda, basuh dengan
- air sejuk dengan segera. Kemudian bilas mata anda dengan air. mata anda mungkin menyengat. Jika anda mula mempunyai masalah dengan penglihatan dan mata

anda adalah sakit, hubungi doktor anda dengan segera.

Jika anda menggunakan krim untuk merawat tangan anda, sentiasa membasuh tangan anda selepas menggunakan FUSATE H CREAM. Melainkan anda menggunakan krim untuk merawat tangan anda, sentiasa membasuh tangan anda selepas menggunakan FUSATE H CREAM

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini hanya untuk menggunakan pada kulit atau kulit kanak-kanak. Jangan menelannya

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan gunakan untuk masa yang lama, secara berterusan (tanpa henti), kerana ubat ini mengandungi steroid. Jangan gunakan krim pada

diri anda atau kanak-kanak untuk lebih daripada 2 minggu, ini adalah untuk mengelakkan bakteria menjadi tahan kepada antibiotik dan untuk mengelakkan steroid yang menyebabkan kesan sampingan contohnya kulit anda boleh menjadi nipis.

- Jangan gunakan krim pada kawasan yang besar badan anda.
- Jangan gunakan krim di bawah pembalut atau kuah (kerana ini meningkatkan tindakan steroid).
- Elakkan krim di dalam atau berhampiran mata anda (contohnya sengaja dari tangan anda) kerana ia boleh merosakkan mereka atau menyebabkan tekanan meningkat di mata anda.
- Jangan menggunakan sejumlah besar krim (ikut arahan doktor anda). Jangan gunakan krim pada

FUSATE H CREAM

Fusidic acid 20mg and Hydrocortisone acetate 10mg

penipisan kulit, ulser kulit, jerawat (tempat) atau dalam lipatan kulit (contohnya di bawah payudara, bahagian sulit atau ketiak).

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapat mereka

Kesan sampingan yang biasa reaksi di laman permohonan (contoh kerengsaan kulit, pembakaran kulit atau gatal-gatal) kesan sampingan tak biasa

- hipersensitiviti
- dermatitis
- gangguan ekzema
- Ruam

Kesan sampingan yang lain disebabkan oleh rawatan berpanjangan corticoids ringan seperti hydrocortisone termasuk: penipisan kulit (atrofi kulit)

tanda dermatitis

regangan (striae)

dilatasi pembuluh darah kecil pada kulit

kemerahan muka yang berterusan (rosacea)

- kemerahan kulit (erythema)
- depigmentation
- pertumbuhan berlebihan rambut (hypertrichosis)
- berlebihan (hiperhidrosis)
- lebam
- kesan sampingan sistemik kortikosteroid ringan, seperti hydrocortisone, termasuk penindasan adrenal terutama semasa pentadbiran topikal yang berpanjangan.
- komplikasi jika ditadbir terlalu dekat dengan mata (iaitu peningkatan tekanan dan glaukoma intra-okular)

Jika kesan-kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers Reporting*).

7. Cara penyimpanan dan pelupusan FUSATE H CREAM

Penyimpanan

Store in a cool dry place below 30°C.

Simpan ubat daripada capaian kanak-kanak. Untuk kegunaan luar sahaja.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

8. Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Dari warna putih ke putih cerah., krim licin

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Fusidic acid 20mg or 2.0% w/w
Hydrocortisone acetate 10mg or 1.0% w/w

Bahan tidak aktif

- Cetostearyl Alcohol
- White Soft Paraffin
- Liquid parafin
- Polysorbate 80
- Butylated Hydroxy Anisole
- Glycerin
- Potassium sorbate
- Purified Water

Nombor MAL

MAL

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

NORIPHARMA SDN.

BHD.(792633-A)

Lot 5030, Jalan Teratai. 51/2

Mile Off Jalan Meru,

41050 Klang, Selangor, Malaysia

Tarikh Kemaskini RiMUP

15/12/2016