

NoriPAPAIN Tablet

Papain (10 000 USP Unit, 150 000 USP Unit)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan NoriPAPAIN Tablet
2. Bagaimana NoriPAPAIN Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan NoriPAPAIN Tablet
4. Cara menggunakan NoriPAPAIN Tablet
5. Semasa menggunakan NoriPAPAIN Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan NoriPAPAIN Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan NoriPAPAIN Tablet

NoriPAPAIN Tablet digunakan bersama ubat *chemotherapeutic* atau fizikal yang lain untuk merawat oedema atau bengkak) keradangan.

Bagaimana NoriPAPAIN Tablet berfungsi

NoriPAPAIN Tablet mengandungi papain yang diperolehi daripada buah betik. Papain berfungsi dengan memecahkan protein tertentu didalam badan.

Sebelum menggunakan NoriPAPAIN Tablet

- *Bila tidak boleh menggunakan* Jangan menggunakan NoriPAPAIN Tablet:
 - Jika anda mempunyai sebarang jangkitan umum atau sistemik.
 - Jika anda menghidap penyakit pembekuan darah.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan menggunakan NoriPAPAIN Tablet jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan menggunakan NoriPAPAIN Tablet jika anda merupakan seorang ibu yang menyusukan bayi. Sila dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda sebelum anda mengambil sebarang ubat-ubatan.

• *Sebelum menggunakan NoriPAPAIN Tablet*

Sila beritahu doktor anda jika anda mempunyai mana-mana masalah kesihatan yang berikut:

- Penyakit buah pinggang.
- Penyakit hati.

• *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan terutama ubat anticoagulant (kelas ubat-ubatan yang berfungsi untuk menghalang pembekuan darah) kerana ubat antikoagulan yang boleh berinteraksi dengan NoriPAPAIN Tablet.

Cara menggunakan NoriPAPAIN Tablet

• *Berapa banyak harus digunakan*

NoriPAPAIN Tablet perlu diambil secara oral.

Bagi orang dewasa: 2 tablet 4 kali sehari sebelum pembedahan diikuti oleh 1 tablet 4 kali sehari selama kira-kira 5 hari.

• *Bila perlu digunakan*

Ambil NoriPAPAIN Tablet apabila anda mengalami edema dan bengkak (bengkak). Biasanya, ia diambil dengan kombinasi ukuran fizikal atau chemotherapeutic lain.

• *Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan mengambil ubat anda selama yang doktor anda memberitahu anda

• *Jika terlupa menggunakan*

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

• *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja yang mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda

mungkin memerlukan perhatian perubatan yang segera.

• *Semasa menggunakan NoriPAPAIN Tablet*

• *Perkara yang perlu dilakukan*

- Ambil ubat anda tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda.

• *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

- Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil apa-apa ubat-ubatan baru tanpa berunding dengan doktor anda.
- Jangan berikan NoriPAPAIN Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

• *Perkara yang perlu diberi perhatian*

- Ia perlu diberi dengan berhati-hati semasa hamil atau jika menghidapi penyakit buah pinggang atau penyakit hati.
- Sila mengelakkan penggunaan NoriPAPAIN Tablet dalam dos tinggi untuk tempoh masa yang panjang.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, NoriPAPAIN Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Jumpa doktor atau pegawai farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini seperti:

- Urtikaria (ruam gatal yang muncul pada kulit).
- pruritus (gatal).
- Pening
- Loya (keresahan perut yang sering datang sebelum muntah).
- Muntah
- Cirit-birit

Jika apa-apa kesan sampingan menjadi semakin serius, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

NoriPAPAIN TABLET

Papain (10,000 Unit, 150,000 Unit)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers →Reporting*).

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
Noripharma Sdn. Bhd.
Lot 5030, Jalan Teratai,
5 ½ Mile off Jalan Meru,
41050 Klang, Selangor.

Cara penyimpanan dan pelupusan Pantor

• Penyimpanan

- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Pastikan bekas yang tertutup dan dilindungi daripada cahaya.

• Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

• Rupa dan warna produk

- NoriPAPAIN 10 000 USP Units Tablet: Kehijauan biru, tablet berbentuk bulat.

NoriPAPAIN 150 000 USP Units Tablet:
Kehijauan biru, tablet berbentuk bulat

• Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

- Papain

Bahan tidak aktif

- Brilliant Blue Lake
- Colloidal Silicone Dioxide
- Corn Starch
- Lactose Monohydrate
- Magnesium Stearate
- Povidone K30
- Purified Water
- Quinoline Yellow Lake
- Sodium Starch Glycollate

• Nombor MAL:

MAL number(s):

NoriPAPAIN 10 000 USP Units Tablet:
MAL*****

NoriPAPAIN 150 000 USP Units Tablet:
MAL*****

Tarikh kemaskini RiMUP

16/01/2018

Nombor Siri

BPFK(Rx/x)xxxxxx/xxxxx