

Acetamol Syrup 120mg/5ml

Paracetamol 120mg/5ml

APAKAH YANG ADA PADA RISALAH INI

1. Apakah Kegunaan Acetamol Syrup 120mg/5ml
2. Bagaimana Acetamol Syrup 120mg/5ml Berfungsi.
3. Sebelum Mengambil Acetamol Syrup 120mg/5ml
4. Cara Menggunakan Acetamol Syrup 120mg/5ml
5. Semasa Menggunakan Acetamol Syrup 120mg/5ml
6. Kesan- Kesan Sampingan.
7. Cara Penyimpanan Dan Pelupusan Acetamol Syrup 120mg/5ml.
8. Maklumat Lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Acetamol Syrup 120mg/5ml

Paracetamol tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai ubat tahan sakit atau analgesic.

- Ia digunakan untuk sakit yang ringan ke sederhana termasuk sakit kepala, migrain, sakit saraf, sakit gigi, sakit tekak, sakit tempoh dan kesakitan dan kepedihan.
- Ia juga digunakan untuk melegakan gejala-gejala selsema
- Ia juga digunakan untuk meredakan demam (suhu tinggi).

Bagaimana Acetamol Syrup 120mg/5ml berfungsi

Paracetamol adalah analgesik yang berkesan dan antipiretik tetapi tidak mempunyai tindakan anti-radang.

Sebelum menggunakan Acetamol Syrup 120mg/5ml

Bila tidak boleh menggunakan

Penyediaan ini mengandungi PARACETAMOL.

Jangan mengambil ubat yang mengandungi paracetamol lain pada masa yang sama.

Jangan mengambil Acetamol:

- Jika anda alergi terhadap Paracetamol. Reaksi alergi adalah seperti ruam, gatal-gatal atau sesak nafas.

- Jika anda mempunyai gangguan fungsi hati Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika mana-mana berikut berkaitan dengan anda

Mengandung dan menyusukan anak

Produk ini adalah untuk digunakan pada kanak-kanak

Jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan bayi, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini.

Sebelum menggunakan Acetamol Syrup 120mg/5ml

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Paracetamol jika anda mempunyai:

- gangguan fungsi buah pinggang
- gangguan fungsi hati, termasuk mereka yang meminum alkohol berlebihan. Anda mungkin lebih berisiko untuk mendapat kesan-kesan sampingan Acetamol. Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika mana-mana berikut berkaitan dengan anda.

Memandu dan mengendalikan mesin:

Ubat ini tidak menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan mesin.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda tidak boleh mengambil sebarang ubat yang mengandungi Paracetamol semasa anda mengambil ubat yang berikut. Beritahu doktor anda jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan ini:

- barbiturates (ubat tidur)
- antidepresan tricyclic (seperti amitriptyline)
- colestyramine (digunakan untuk merawat kolesterol tinggi)
- warfarin (digunakan untuk penipisan darah dan menghalang pembekuan darah)
- zidovudine (digunakan dalam jangkitan HIV dan AIDS)
- domperidone dan metoclopramide (digunakan untuk merawat rasa loya dan muntah-muntah)
- anticonvulsants (ubat yang digunakan untuk merawat epilepsi)
- pil perancang.

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Acetamol Syrup 120mg/5ml

Ambil ubat ini mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda telah memberitahu anda. Lihatlah pada label dan bertanya kepada doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

- Ubat ini mengandungi 120mg Paracetamol dalam satu 5ml sudu.
- Ambil ubat ini melalui mulut sahaja.
- Jangan memberi dos yang lebih daripada yang ditetapkan
- Jangan berikan ubat ini dengan mana-mana produk lain yang mengandungi Paracetamol

Berapa banyak harus digunakan

Untuk dos yang tepat, timbang berat anak anda dan kerjakan dos yang diberikan berdasarkan 15mg Paracetamol untuk setiap kg berat badan diberikan setiap 4 hingga 6 jam
misalnya: Jika anak anda berat 20 kg: 20 x 15 mg = 300 mg = (300mg / 120mg x 5ml) = 12.5 ml

Dos harian maksimum: 60mg / kg dibahagikan dalam dos dibahagikan 10 - 15 mg / kg sepanjang tempoh 24 jam.

Umur Anak	Berat Anak (kg)	Berapa Banyak	Berapa banyak (dalam masa 24 jam)
3 – 6 bulan	4	Satu 2.5 mL sudu (akhir kecil)	4 kali
6 – 24 bulan	8	Satu 5 mL sudu (akhir besar)	4 kali
2 – 4 tahun	12	Satu 5.0 mL sudu (akhir besar) dan satu sudu 2.5 mL	4 kali

Acetamol Syrup 120mg/5ml

Paracetamol 120mg/5ml

		(akhir kecil)	
4 – 8 tahun	16	Dua 5 mL sudu besar (akhir besar)	4 kali
8 – 10 tahun	24	Tiga 5 mL sudu besar (akhir besar)	4 kali
10 - 12 tahun	32	Empat 5 mL sudu (akhir besar)	4 kali

• Di bawah 3 bulan: 5 hingga 10mg/kg (Atas nasihat doktor sahaja)

• Jangan berikan lebih daripada 2 dos. Ini adalah untuk memastikan bahawa demam yang mungkin disebabkan oleh jangkitan yang serius segera didiagnosis. Jika anak anda masih demam selepas dua dos, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

• Jangan berikan lebih daripada 4 dos dalam mana-mana 24 tempoh jam

• Selang sekurang-kurangnya 4 jam antara dos

• Jangan berikan ubat ini kepada anak anda selama lebih dari 3 hari tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda

Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

- Ambil ubat ini seperti yang dicatatkan di dalam risalah ini tanpa melebihi sukatan.
- Ikut saranan dan nasihat dari doktor atau ahli farmasi tentang berapa lama anda perlu mengambil ubat anda..

Jika terlupa menggunakan

- Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik

sahaja anda teringat. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Nasihat perubatan segera perlu dicari sekiranya dos berlebihan, walaupun anak anda berada dalam keadaan baik, kerana risiko kelewatan, mengakibatkan kerosakan fungsi hati yang serius. Menelefon doktor anda atau pergi ke jabatan kecemasan dengan segera.

- Mungkin tiada gejala bagi 24 jam yang pertama walaupun pucat, loya (rasa sakit), muntah (sakit) dan sakit perut boleh terjadi.

Semasa menggunakan Acetamol Syrup 120mg/5ml

Perkara yang perlu dilakukan

- Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda tentang perkara yang mesti dan tidak patut anda lakukan semasa mengambil ubat ini.
- Maklumkan doktor anda jika tanpa diduga anda perlu mengambil ubat lain.
- Ambil Acetamol Syrup 120mg/5ml mengikut dos yang disarankan.

Maklumkan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil Acetamol Syrup 120mg/5ml lebih daripada frekuensi yang dicadangkan dalam satu hari.
- Jangan melebihi dos pada setiap satu masa pengambilan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Hindari penggunaan berterusan dengan dos tinggi.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan paracetamol jarang dan biasanya ringan, walaupun reaksi hematologi (tindak balas sel darah ke pendedahan radiasi) telah dilaporkan. Reaksi hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, angioedema (pembengkakan teruk di bawah kulit), Sindrom Stevens

Johnson / Toksik Epidermal Necrolysis (reaksi kulit yang teruk) telah dilaporkan.

Amaran Alahan: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini mungkin tanda-tanda keadaan yang serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public -> Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI)

Cara penyimpanan dan pelupusan Acetamol Syrup 120mg/5ml

Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan di bawah 30°C.

Pastikan bekas ubat tertutup rapat dan lindungi dari cahaya

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Sirap jernih berwarna jingga dan berperisa oren

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Paracetamol
- Bahan tidak aktif
Refined sugar
Sodium benzoate
Citric acid monohydrate
Propylene glycol
Sodium saccharin
Sorbitol 70% Solution
Sodium chloride
Sunset yellow FCF

Acetamol Syrup 120mg/5ml

Paracetamol 120mg/5ml

Orange flavour
Purified water

- Nombor MAL
MAL18046127XZ

**Pengilang dan Pemegang Pendaftaran
Produk**

Noripharma Sdn. Bhd. Lot 5030, Jalan
Teratai, 51/2 Mile Off Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
September 2022

Nombor siri:
NPRA(R2/1)220901/944