

PARANOR 500mg Tablet

Paracetamol 500mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan PARANOR 500mg
2. Bagaimana PARANOR 500mg berfungsi
3. Sebelum menggunakan PARANOR 500mg
4. Cara menggunakan PARANOR 500mg
5. Semasa menggunakan PARANOR 500mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan PARANOR 500mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan PARANOR 500mg

PARANOR 500mg Tablet digunakan untuk menghilangkan demam. Untuk melegakan dari ringan hingga sederhana termasuk: sakit kepala, migrain, sakit belakang, sakit muskuloskeletal, mialgia dan neuralgia, senggugut, sakit osteoarthritis, sakit gigi, sakit selepas prosedur pergigian / pencabutan gigi, sakit selepas vaksinasi dan ketidakselesaian akibat selesema, selesema dan sakit tekak.

Bagaimana PARANOR 500mg berfungsi

PARANOR 500mg Tablet mempunyai ciri-ciri analgesik (melegakan kesakitan) dan antipiretik (anti-demam).

Sebelum menggunakan PARANOR 500mg

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil PARANOR 500mg Tablet jika anda alah kepada paracetamol atau acetaminopen dan bahan-bahan kandungan yang lain. Jika anda tidak pasti, bincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini.

-Sebelum mula mengambil PARANOR 500mg Tablet

Ubat ini mengandungi Paracetamol.

Jangan mengambil ubat-ubatan lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.

Doktor anda perlu tahu jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati sebelum anda mengambil PARANOR 500mg Tablet.

PARANOR 500mg Tablet perlu diambil dengan berhati-hati jika anda mengambil ubat-ubatan lain yang mengganggu fungsi hati.

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang hamil atau menyusukan bayi. Masalah pada manusia tidak dilaporkan apabila mengambil PARANOR 500mg Tablet semasa hamil atau menyusukan bayi. - Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda ubat-ubatan yang anda ambil termasuk semua ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi dari kedai farmasi, supermarket, atau kedai makanan kesihatan lain.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil PARANOR 500mg Tablet dengan kombinasi alkohol, pendorong enzim hati dan ubat yang diketahui toksik kepada hati. Risiko keracunan hati meningkat dengan pendorong enzim hati dan ubat-ubatan yang diketahui toksik kepada hati

Cara mengambil PARANOR 500mg Tablet

Sentiasa mengambil ubat ini sepertimana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Baca arahan pada label dengan teliti.

-Berapa banyak harus diambil

- Orang dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas: 500mg hingga 1g paracetamol, diambil setiap 4-6 jam seperti yang diperlukan sehingga maksimum 4 g setiap hari.

- Kanak-kanak 6 hingga 11 tahun: 250mg -500mg setiap 4 hingga 6 jam mengikut keperluan.

Dos harian maksimum: 60mg / kg dinyatakan dalam dos terbahagi 10-15mg / kg sepanjang tempoh 24 jam

-Bila perlu diambil

Ikut arahan label dengan berhati-hati dan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diambil

Ikut arahan label dengan berhati-hati dan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan ambil ubat itu pada masa yang dijadualkan seterusnya. Jangan mengambil ubat tambahan untuk menggantikan dos yang tertinggal. Ini boleh meningkatkan peluang anda mendapat kesan-kesan sampingan yang tidak diingini.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Gejala:

Gejala toksik termasuk muntah, sakit perut, hipotensi dan berpeluh. Kesan buruk yang paling serius dari overdosis paracetamol akut adalah bergantung kepada dos, nekrosis hepatik yang berpotensi membawa maut. Bukti klinikal dan makmal mengenai hepatoksiti mungkin ditangguhkan sehingga satu minggu. Manifestasi utama kegagalan hati seperti penyakit kuning, hipoglikemia dan asidosis metabolik mungkin memerlukan masa sekurang-kurangnya 3 hari untuk berkembang.

Rawatan:

Dalam kes overdosis, kaedah mengurangkan penyerapan ubat yang dimakan adalah penting. Lavage gastrik sangat penting walaupun sudah beberapa jam berlalu. Pentadbiran cepat 50g arang aktif dan 500 ml es manitol 20% dari mulut, dapat mengurangkan penyerapan. Sekiranya sejarah menunjukkan bahawa 15g

Paracetamol atau lebih telah dimakan, berikan salah satu penawar berikut: Acetylcysteine 20% iv: Tadbir secara intravena, 20% asetilcysteine dengan segera tanpa menunggu keputusan ujian air kencing positif atau tahap

PARANOR 500mg Tablet

Paracetamol 500mg

plasma: dos awal 150mg / kg selama 15 minit, diikuti dengan infusi berterusan 50mg / kg dalam 500ml glukosa / dekstrosa 5% lebih dari 4 jam dan 100mg / kg dalam 1L glukosa / dekstrosa 5% selama 16 jam; atau

ATAU

Oral Methionine: 2.5g segera diikuti oleh tiga dos 2.5g seterusnya pada selang empat jam. Untuk kanak-kanak berumur 3 tahun, 1g metionin setiap empat jam selama empat dos telah digunakan;

ATAU

Acetylcysteine oral 5%: 140mg / kg sebagai dos pemuatan, kemudian 70mg / kg setiap 4 jam untuk jumlah 17 dos penyelenggaraan. Sekiranya lebih daripada sepuluh jam berlalu sejak overdosis diambil, penawarnya mungkin tidak berkesan

Semasa mengambil PARANOR 500mg Tablet

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat ini mengikut arahan doktor anda.

- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan PARANOR 500mg Tablet.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berkongsi PARANOR 500mg Tablet dengan sesiapa walaupun mereka mempunyai simptom yang sama.

Jangan mengambil ubat ini untuk merawat sebarang masalah lain melainkan atas arahan doktor atau ahli farmasi anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan minum alkohol semasa mengambil ubat ini.

Penyediaan ini mengandungi parasetamol. Jangan mengambil ubat lain yang mengandungi parasetamol pada masa yang sama.

Amaran alergi: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala boleh merangkumi kemerahan

kulit, lepuh atau ruam. Ini mungkin tanda-tanda keadaan serius. Sekiranya reaksi ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan segera bantuan perubatan.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat-ubatan mungkin mempunyai beberapa kesan sampingan yang tidak diinginkan. Kesan-kesan sampingan yang tidak diinginkan tidak selalu berlaku kepada setiap orang. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda tidak berasa sihat semasa anda mengambil PARANOR 500mg Tablet.

- Amaran alergi: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Antara gejala-gejalanya termasuk kemerahan pada kulit, lepuh atau ruam.
- Gejala-gejala seperti di atas mungkin menunjukkan tanda-tanda keadaan yang serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan ubat ini dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Reaksi hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, angioedema, Sindrom Stevens Johnson / Toksik Epidermal Necrolysis telah dilaporkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]”

Cara Penyimpanan dan Pelupusan PARANOR 500mg Tablet

- Simpan dibawah 30°C.
- Lindungi dari cahaya.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

PARANOR 500mg 500mg :

Tablet bersalut filem berwarna putih, bulat, bergaris belah di satu permukaan dan rata di satu permukaan yang lain.

-Bahan-bahan kandungan:

-Bahan aktif

Paracetamol (dalam bentuk Paracetamol DC Granules 90%)

Bahan tidak aktif

- Corn Starch
 - Opadry QX white
- Mengandungi:
- Macrogol (PEG) Polyvinyl Alcohol Graft Copolymer
 - Talc
 - Titanium Dioxide
 - Glycerol Monocaprylocaprate
 - Polyvinyl Alcohol
 - Purified water

- bahan- bahan kandungan

- bahan aktif: Paracetamol (dalam bentuk Paracetamol DC Granules 90%)
- Pregelatinized starch
- Povidone K30
- Stearic Acid
- Sodium Starch Glycolate
- Purified water

Nombor MAL

MAL

7. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Noripharma Sdn. Bhd.
Lot 5030, Jalan Teratai,
5 ½ Miles off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor

Tarikh Revisi- Januari 2021

No serial RiMUP - NPRA(R2)20/077