

BENATUSSIL PAEDIATRIC EXPECTORANT

Diphenhydramine HCl 7mg/5ml & Ammonium Chloride 67.5mg/5ml

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Benatussil Paediatric Expectorant.
2. Bagaimana Benatussil Paediatric Expectorant berfungsi.
3. Sebelum mengambil Benatussil Paediatric Expectorant.
4. Cara menggunakan Benatussil Paediatric Expectorant.
5. Semasa menggunakan Benatussil Paediatric Expectorant.
6. Kesan- kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Benatussil Paediatric Expectorant.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan Benatussil Paediatric Expectorant

Ia digunakan sebagai ekspektoran untuk mengawal batuk akibat kesejukan atau alahan.

Bagaimana Benatussil Paediatric Expectorant berfungsi

Diphenhydramine hydrochloride adalah antihistamin yang mengurangkan keinginan untuk batuk dan mengeringkan rembesan di hidung dan dada. Ammonium chloride mencairkan kahak supaya mudah batuk keluar

Sebelum mengambil Benatussil Paediatric Expectorant

Bila tidak boleh mengambil

- Jangan menggunakan Benatussil Paediatric Expectorant jika anak anda alah terhadap Diphenhydramine Hydrochloride atau Ammonium Chloride atau sebarang bahan kandungan lain yang disenaraikan di akhir risalah ini.
- Jangan menggunakan Benatussil Paediatric jika anak anda sedang mengambil monoamine oxidase inhibitors (MAOI) (rawatan anti kemurungan).

Sebelum mula mengambil

Sebelum mengambil Benatussil Paediatric Expectorant anda mesti beritahu doktor atau ahli farmasi jika anak anda ada atau mengalami

sebarang masalah kesihatan. Jika anda tidak pasti anak anda mempunyai atau ada salah satu keadaan berikut, anda perlu mendapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Jika mengambil ubat- ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Benatussil Paediatric Expectorant. Sebelum menggunakan Benatussil Paediatric Expectorant adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anak anda mengambil apa-apa ubat lain, yang diperoleh dengan atau tanpa preskripsi doktor. Benatussil Paediatric Expectorant boleh meningkatkan kesan alkohol dan ubat-ubatan yang digunakan untuk membantu anak anda berehat, tidur atau melegakan keresahan seperti barbiturat, hipnotik, sedatif dan penenang.

Cara menggunakan Benatussil Paediatric Expectorant

Berapa banyak harus digunakan

Untuk diambil 4-6 jam sekali.

Kanak- kanak 2-5 tahun: 5ml (maksimum 40ml dalam masa 24 jam)

Kanak- kanak 6-12 tahun: 5-10ml (maksimum 60ml dalam masa 24 jam)

Kanak- kanak 12 tahun: 10-20ml (maksimum 120ml dalam masa 24 jam)

Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Jangan melebihi dos yang dinyatakan.

Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat ini seperti yang dicatatkan di dalam risalah ini tanpa melebihi sukatan.

Ikut saranan dan nasihat dari doktor atau ahli farmasi tentang berapa lama anda perlu mengambil ubat anda.

Jika terlupa menggunakan

- Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa.

Jangan menggandakan sukatan kerana Benatussil Paediatric Expectorant mungkin akan memberikan kesan sampingan yang berbahaya.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anak anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anak anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Benatussil Paediatric Expectorant

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anak anda bahawa anak anda sedang mengambil Benatussil Paediatric Expectorant.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mengambil lebih daripada dos yang dicadangkan kecuali jika disyorkan oleh ahli farmasi atau doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan Benatussil Paediatric Expectorant kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anak anda

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Bila diguna untuk merawat batuk dan selsema:
- Tidak boleh digunakan untuk kanak-kanak berumur bawah 2 tahun.
- Gunakan dengan berhati-hati bersama nasihat doktor atau ahli farmasi untuk penggunaan kanak-kanak 2 – 6 tahun.

BENATUSSIL PAEDIATRIC EXPECTORANT

Diphenhydramine HCl 7mg/5ml & Ammonium Chloride 67.5mg/5ml

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Benatussil Paediatric Expectorant boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-kesan sampingan yang berikut telah dilaporkan:

Kesan sampingan paling umum:

- Sedasi dari mengantuk hingga tidur nyenyak termasuk kesukaran untuk menumpukan perhatian.
- Kelesuan.
- Kepeningan.
- Tekanan darah rendah yang tidak normal.
- Kelemahan otot dan ketakselarasan.

Kesan sampingan lain:

Seperti semua ubat, Benatussil Paediatric Expectorant boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Sekiranya kesan sampingan berterusan, jangan ambil ubat dan sila rujuk kepada doktor. Beritahu doktor anda jika anda perasan sebarang kesan sampingan berikut atau perasan apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- Kesan sampingan biasa: kesan ubat penenang.
 - Gangguan perut seperti mual, muntah, cirit-birit atau sembelit dan sakit epigastrik.
- Sakit kepala
- Pandangan kabur
 - Bunyi berdering di telinga
- Kegembiraan yang melampau atau kemurungan
- Mudah marah
- Mimpi buruk
- Hilang selera makan
- Kesukaran kencing
- Mulut kering
- Ketegangan di dada dan berdebar-debar
- Tangan berasa berat dan lemah

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mendapati apa-apa yang membuat anda merasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.moh.gov.my [Consumers—> Reporting—> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Benatussil Paediatric Expectorant

Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.
Simpan di bawah 30°C.
Pastikan bekas ubat tertutup rapat dan lindungi dari cahaya

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Benatussil Paediatric Expectorant ialah sejenis sirap berwarna coklat dengan perisa caramel

Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan Aktif:

Ammonium Chloride
Diphenhydramine Hydrochloride.

Bahan-bahan Tidak Aktif:

Saccharin Sodium,
Caramel flavor,
Citric Acid,
Carboxymethyl Cellulose
Sodium,
Purified Water,
Sodium Citrate,
Liquid Caramel,
Sodium Benzoate,
Refined Sugar
Glycerin.

- Nombor MAL

MAL23066026AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Noripharma Sdn Bhd

200701034604 (792633-A)

Lot 5030, Jalan Teratai. 51/2 Mile
Off Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

11/05/2023

No. Serial:

NPRA (R2) 22/122