VOLNAC-M GEL 1%w/w

Diclofenac sodium 10mg (With added Menthol 0.2% w/w)

Apa yang ada pada risalah ini:

1. Apakah kegunaan VOLNAC-M GEL
2. Bagaimanakah VOLNAC-M GEL berfungsi
3. Sebelum menggunakan VOLNAC-M GEL
4. Cara menggunakan VOLNAC-M GEL
5. Semasa menggunakan VOLNAC-M GEL
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan VOLNAC-M GEL
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan VOLNAC-M GEL

VOLNAC-M GEL digunakan sebagai rawatan topikal keadaan keradangan atau sakit seperti bengkak dan kemerahan yang disebabkan oleh kronik rheumatoid arthritis (penyakit kronik jangka panjang yang membawa kepada keradangan di bahagian sendi dan tisu di sekitarnya, artritis degeneratif (kekurangan rawan sendi) dan tisu sendi lembut (sindrom menghasilkan kesakitan, bengkak, atau radang dalam tisu dan struktur di sekitar bersama)

Bagaimana VOLNAC-M GEL berfungsi

VOLNAC-M GEL *nonsteroidal anti-inflammatory drug, NSAID*. Ia boleh berfungsi dengan menyekat bahan-bahan tertentu di dalam badan yang berkaitan oleh keradangan. NSAID juga merawat gejala-gejala sakit sendi dan keradangan.

Sebelum menggunakan VOLNAC-M GEL

-Bila anda tidak perlu mengambil

- Anda alah pada mana-mana bahan di dalam VOLNAC-M GEL.
- Anda mempunyai reaksi alergi yang teruk (contohnya, ruam teruk, gatal-gatal, sukar untuk bernafas, pertumbuhan di dalam hidung, pening) aspirin atau lain NSAID (contohnya, ibuprofen)
- Baru-baru ini anda telah melakukan pembedahan pintasan jantung.
- Anda mempunyai masalah buah pinggang yang teruk.
- Anda hamil dalam tempoh 3 bulan terakhir.

-Sebelum anda mula mengambil VOLNAC-M GEL

Dalam beberapa keadaan perubatan ia boleh berinteraksi dengan VOLNAC-M GEL. Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai syarat-syarat seperti berikut:

- Jika anda hamil, bercadang untuk hamil atau sedang menyusukan bayi.
- Jika anda mempunyai sejarah masalah buah pinggang atau hati, kencing manis, atau masalah perut atau usus (contohnya, perut mula berdarah (*gastrointestinal bleeding*), perut berlubang (*gastro perforation*) dan perut menjadi ulcer (*gastric ulcer*)
- Jika anda mempunyai sejarah kebengkakan atau pengumpulan cecair, asma, ketumbuhan dalam hidung (polip hidung), atau keradangan mulut
- Jika anda mempunyai tekanan darah tinggi, gejala pendarahan (contohnya, *PORPHYRIA*), masalah pendarahan atau masalah pembekuan darah, masalah jantung (misalnya, kegagalan jantung), atau penyakit berkaitan dengan saluran darah, ataupun anda di peringkat berisiko dalam mana-mana penyakit ini.
- Hypersensitif kepada NSAIDs

-Mengambil ubat-ubatan lain.

Ia tidak mungkin berlaku jika ubat-ubatan lain yang anda ambil secara oral atau menyuntik akan memberi kesan ke atas diclofenac yang diambil secara topikal

Tetapi terdapat banyak ubat yang boleh berinteraksi antara satu sama lain. Sila memberitahu doctor anda mengenai semua ubatan yang anda ambil.

Ini termasuk preskripsi, bukan prskripsi, vitamin, dan produk herba. Jangan memulakan ubat baru tanpa memberitahu doktor anda.

Cara menggunakan VOLNAC-M GEL

-Berapa banyak perlu diambil

Bergantung kepada saiz tempat yang perlukan rawatan, gunakan 2-4g, VOLNAC-M GEL sebanyak 3 - 4 kali sehari di kawasan yang perlu dirawat dan gosokkannya dengan perlahan-lahan.

-Bila untuk mengambil

Gunakan Gel VOLNAC-M GEL seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Ikut arahan pada label preskripsi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaa ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan.

Semasa menggunakan VOLNAC-M GEL

-Perkara yang anda tidak boleh melakukan

VOLNAC-M GEL 1%w/w

Diclofenac sodium 10mg (With added Menthol 0.2% w/w)

Jauhi ubat-ubat ini dari terkena hidung, mata dan mulut. Jika terkena, basuh dan bilas bahagian tersebut dengan segera menggunakan air bersih yang secukupnya.

- Jauhi dari sinaran matahari atau sinaran UV tiruan (sunlamps atau bed tanning) semasa anda menggunakan VOLNAC-M GEL.
- Jangan menggunakan VOLNAC-M GEL pada luka kulit yang terbuka, atau di kawasan ekzema, jangkitan, ruam kulit, atau kecederaan akibat terbakar. Jangan membalut kulit yang telah dirawat dengan pembalut atau mendedahkannya kepada haba dari tab panas, pemanasan pad, sauna, atau katil air panas.
- Haba atau pembalutan boleh meningkatkan jumlah ubat yang di serap melalui kulit anda dan boleh menyebabkan kesan yang berbahaya.
- Jangan lupa untuk mencuci tangan anda selepas menggunakan VOLNAC-M GEL, melainkan jika anda merawat kulit pada tangan anda.
- Jangan memakai sarung tangan sekurang-kurangnya 10 minit selepas anda memakai VOLNAC-M GEL.
- Jangan membalut selama 10 minit selepas menggunakan VOLNAC-M GEL.
- Jangan menggunakan kosmetik, krim perlindung matahari, losyen, penghalau serangga, atau lain-lain produk kulit di tempat yang sama anda meletak VOLNAC-M GEL.
- Jangan mengambil alkohol kerana ia boleh meningkatkan risiko pendarahan perut.

Kesan-kesan sampingan

Dapatkan bantuan perubatan kecemasan jika anda mempunyai sebarang reaksi alahan terhadap VOLNAC-M GEL

Biasanya VOLNAC-M GEL tidak menyebabkan masalah. Walau bagaimanapun, seperti semua ubat-ubatan, ia kadang-kadang boleh menyebabkan kesan sampingan pada sesetengah orang

Kesan yang mungkin berlaku termasuk:

Kadang-kadang: kegatalan, kemerahan atau kepedihan kulit.

Sangat jarang berlaku: peningkatan sensitiviti kulit kepada cahaya matahari.

Jika anda mengalami mana-mana yang berikut, BERHENTI menggunakan VOLNAC-M GEL dan memberitahu doktor anda dengan segera

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*]

Cara penyimpanan dan pelupusan VOLNAC-M GEL

-Simpanan

Simpan di bawah 30ºC

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak perlu dilupuskan melalui air kumbahan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Gel licin yang jelas, tidak berwarna hingga merah jambu-oren terang

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Diclofenac sodium

Bahan tidak aktif

Disodium edetate, Carbomer, Triethanolamine, Menthol, Propylene Glycol, Isopropyl alcohol dan Purified water

-MAL NO:

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Noripharma Sdn. Bhd.
200701034604 (792633-A)
Lot 5030, Jalan Teratai, 5 ½ Mile Off
Jalan Meru, 41050 Klang
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tarikh Kemaskini RIMUP:
28/03/2024

Nombor rujukan
NPRA (R2) 22/187