

CALINOR ORAL POWDER

Calcium Polystyrene Sulphonate 5 g

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CALINOR
2. Bagaimana CALINOR berfungsi
3. Sebelum menggunakan CALINOR
Cara menggunakan CALINOR
4. Semasa menggunakan CALINOR
5. Kesan-kesan sampingan
6. Cara penyimpanan dan pelupusan
CALINOR Maklumat
7. lanjut Pengilang dan
8. Pemegang Pendaftaran
Produk Tarikh kemaskini
9. RiMUP

Apakah kegunaan CALINOR

CALINOR mengandungi ubat yang dipanggil *calcium polystyrene sulfonate*, yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil 'resin pertukaran ion'.

CALINOR digunakan untuk merawat hiperkalemia, keadaan ketika terlalu banyak kalium dalam darah anda disebabkan oleh kegagalan buah pinggang.

Bagaimana CALINOR

CALINOR berfungsi dengan mengeluarkan lebihan kalium ini untuk menstabilkan semula tahap kalium anda.

Sebelum menggunakan CALINOR

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan CALINOR jika anda:

- Alah terhadap *calcium polystyrene sulfonate* atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini.
- Mempunyai tahap kalium yang rendah dalam darah anda
- Mempunyai masalah perubatan yang mengakibatkan kalsium tinggi seperti masalah kelenjar tiroid
- Mempunyai usus yang tersekat sebahagian atau sepenuhnya
- Sedang mengambil pemanis yang dipanggil sorbitol.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil CALINOR jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil CALINOR jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum menggunakan CALINOR

Semak dengan doktor, jururawat atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan CALINOR. Sekiranya ia untuk bayi anda, beritahu mereka jika bayi anda dilahirkan pramatang, mempunyai berat badan yang rendah atau mempunyai gerakan usus yang berkurangan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Khususnya, tidak disyorkan untuk mengambil CALINOR bersama-sama dengan ubat-ubatan yang digunakan sebagai julap, sama ada melalui oral atau rektum kerana ia boleh menyebabkan kecederaan serius pada kolon.

CALINOR harus digunakan dengan berhati-hati jika anda juga mengambil:

- Ubat yang mengandungi garam seperti magnesium, kalium atau kalsium. Tanya doktor anda jika anda tidak pasti
- Sesetengah ubat untuk sembelit (julap) yang mengandungi magnesium
- Sesetengah ubat untuk pencernaan (antacid) yang mengandungi magnesium atau aluminium
- Digoxin atau ubat-ubatan yang serupa dari digitalis - untuk masalah jantung
- Lithium - untuk penyakit mental
- Levothyroxine atau tiroksin - untuk tiroid yang kurang aktif

Cara menggunakan CALINOR

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi. Dos ubat adalah bergantung kepada keputusan ujian darah.

Dos yang disyorkan:

15 - 30g sehari dibahagikan dalam 2 -3 dos. Setiap dos perlu dibancuh dalam 30 - 50ml air dan diberikan secara oral.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan CALINOR yang berlebihan boleh menyebabkan kadar kalium rendah di dalam darah (hipokalaemia) dengan gejala kekejangan otot, ketidakselesaan kaki, rasa marah atau keliru, tidak dapat menumpukan perhatian dan denyutan jantung yang tidak normal. Overdos juga boleh menyebabkan peningkatan kadar kalsium dalam darah (hiperkalsemia), dengan gejala seperti keletihan, kelemahan otot, masalah buah pinggang dan sembelit.

Semasa menggunakan CALINOR

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan berkongsi CALINOR dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Perkara yang perlu diberi perhatian

-Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, CALINOR boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini seperti yang berikut:

- Merasakan penat, keliru, mengalami kelemahan otot, kekejangan atau perubahan pada kadar jantung. Ini mungkin disebabkan oleh tahap potassium yang rendah di dalam badan anda
- Rasa gelisah, sawan atau kekejangan otot. Ini mungkin disebabkan tahap rendah kalsium atau magnesium dalam badan anda
- Meningkatkan rasa dahaga atau perlu pergi ke tandas lebih kerap
- Tekanan darah tinggi, masalah buah pinggang, masalah jantung atau bengkak pada anggota badan anda. Ini mungkin disebabkan tahap tinggi natrium (garam) dalam badan anda
- Sakit perut, kesakitan di usus anda, usus sempit atau sumbat
- Mengurangkan aliran darah ke dinding usus menyebabkan kesakitan perut yang teruk, atau runtu
- Hilang selera makan
- Mual, muntah, sembelit atau cirit-birit
- Merasakan sesak nafas atau batuk. Ini boleh menjadi tanda pertama jangkitan dada yang serius. Ini boleh disebabkan oleh penyedutan ubat ini secara tidak sengaja.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*]

Cara penyimpanan dan pelupusan CALINOR

- Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Rupa Serbuk:

Krim hingga coklat muda, serbuk halus.

Penampilan cecair selepas dibancuh:

Suspensi krim hingga coklat muda dengan serbuk tidak larut

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

- Setiap sachet mengandungi 5 g *Calcium polystyrene sulfonate*

- Nombor REG

MAL

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk:

Noripharma Sdn. Bhd.

Lot 5030, Jalan Teratai, 51/2 Mile off Jalan Meru, 41050 Klang Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

Ogos 2023

Nombor Serial: NPRA (R2) 22/186