

TRADOL TABLET

Tramadol Hydrochloride / Paracetamol (37.5mg/325mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan TRADOL
2. Bagaimana TRADOL berfungsi
3. Sebelum mengambil TRADOL
4. Cara menggunakan TRADOL
5. Kesan-kesan sampingan
6. Cara penyimpanan dan pelupusan TRADOL
7. Maklumat lanjut
8. Pengilang
9. Tarikh kemaskini RiMUP

1. Apakah kegunaan TRADOL

TRADOL digunakan untuk merawat kesakitan sederhana dan yang amat sangat apabila doktor mengesyorkan bahawa gabungan tramadol hidroklorida dan paracetamol diperlukan.

2. Bagaimana TRADOL berfungsi

Tablet TRADOL mempunyai gabungan dua ubat penahan sakit - tramadol hidroklorida (analgesik opioid) yang dan paracetamol. Anda mungkin sudah biasa dengan paracetamol, yang bertindak dengan pantas untuk melegakan kesakitan. Tramadol hidroklorida pelega kesakitan yang berfungsi selama beberapa jam untuk mengekalkan kelegaan kesakitan. Kerana kedua-dua bahan ini bekerjasama, tablet TRADOL melegakan kesakitan anda dengan cepat dan membantu melegakan kesakitan untuk lebih lama.

3. Sebelum mengambil TRADOL

Jangan mengambil TRADOL

- Jika anda adalah hipersensitif atau mempunyai reaksi alahan (ruam kulit Contohnya, bengkak muka, berdehit atau kesukaran bernafas) terhadap tramadol, paracetamol atau mana-mana bahan-bahan lain dalam TRADOL.

- dalam kes-kes keracunan alkohol yang teruk-
- jika anda mengambil pil tidur, ubat penahan sakit, atau ubat yang memberi kesan kepada mood dan emosi.
- jika anda juga mengambil ubat yang dikenali sebagai perencat oxidase monoamine (MAOIs) atau telah diambil MAOIs dalam 14 hari terakhir sebelum rawatan dengan TRADOL. MAOIs digunakan dalam rawatan kemurungan atau penyakit Parkinson.
- jika anda mempunyai penyakit hati yang teruk
- jika anda mempunyai epilepsi yang tidak dapat dikawal oleh ubat semasa anda
- Anda berumur bawah 12 tahun
- Anda sukar untuk bernafas, atau mempunyai masalah pernafasan yang lain.
- Anda hamil.
- Anda menyusui

Sebelum anda mula untuk mengambil TRADOL

Sebelum anda mengambil TRADOL, periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda

- mengambil ubat-ubatan lain

yang mengandungi paracetamol atau tramadol

- mempunyai masalah hati atau penyakit sebagai mata dan kulit anda boleh bertukar menjadi kuning, yang mungkin akan mencadangkan jaundis
- mempunyai masalah buah pinggang
- mempunyai kesukaran bernafas yang teruk, contohnya asma atau masalah paru-paru yang teruk
- mempunyai epilepsi atau telah mengalami sawan
- baru-baru ini telah mengalami masalah kecederaan kepala, kejutan, atau sakit kepala yang teruk yang dikaitkan dengan muntah-muntah (yang sakit)
- bergantung kepada sebarang ubat (untuk morfin contoh)
- mengambil ubat-ubatan lain untuk merawat kesakitan yang mengandungi buprenorphine, nalbuphine atau pentazocine
- akan mempunyai anestetik (beritahu doktor atau doktor gigi bahawa anda mengambil TRADOL).

Mengambil ubat-ubatan lain

Terdapat ubat-ubatan lain yang mungkin menyebabkan tablet TRADOL kurang berkesan, atau boleh menyebabkan anda mempunyai beberapa kesan sampingan atau reaksi ubat. Ubat yang boleh berinteraksi dengan TRADOL termasuk: ketoconazole, erythromycin, lithium atau St. John's Wort, triptans, linezolid fluoxetine, paroxetine, quinidine, amitriptyline, carbamazepine, perencat MAO dan serotonin reuptake inhibitor, digoxin, sebatian seperti warfarin.

Anda mesti memberitahu doktor dan ahli farmasi jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain.

Pengambilan Tradol tablet

TRADOL TABLET

Tramadol Hydrochloride / Paracetamol (37.5mg/325mg)

dengan benzodiazepine (penggunaan ubat sebagai sedatif atau rawatan kecemasan) boleh menekan pusat sistem saraf anda. Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil apaapa benzodiazepine. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera sekiranya anda atau orang yang mengambil ubat-ubatan ini mengalami gejala-gejala seperti pening kepala yang luar biasa dan keterlaluhan, mengantuk melampau, bernafas dengan perlahan dan sukar, atau tidak bertindakbalas. Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

4. Cara menggunakan

TRADOL

Berapa banyak perlu diambil

Ambil TRADOL seperti mana diberitahu doktor. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti. Telan tablet secara keseluruhan dengan cecair yang mencukupi. Jangan pecah atau kunyah tablet. Ambil TRADOL untuk masa yang sesingkat yang boleh dan tidak melebihi tempoh yang diberitahu oleh doktor anda.

Dewasa dan remaja lebih 16 tahun:

Dos yang disyorkan bermula dengan 1-2 tablet setiap 4 hingga 6 jam, melainkan jika dipreskripsikan oleh doktor anda. Jika perlu, dos selanjutnya boleh diambil seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Masa terpendek antara dos mesti sekurang-kurangnya 4 jam.

Jangan mengambil lebih daripada 8 tablet setiap hari. Doktor anda boleh meningkatkan masa antara dos jika:

- anda lebih tua daripada 75 tahun
 - anda mempunyai masalah buah pinggang
 - anda mempunyai masalah hati.
- Kanak-kanak di bawah umur 16 tahun:
- tidak digalakkan.

Bila perlu diambil

TRADOL boleh diambil sebelum atau selepas makan.

Berapa lama perlu diambil

Ambil TRADOL untuk masa yang sesingkat yang boleh dan tidak melebihi tempoh yang diberitahu oleh doktor anda.

Jika anda lupa untuk mengambilnya

Jika anda terlupa terhadap mengambil tablet, sakit mungkin kembali. Jangan mengambil dos berganda untuk dos individu yang lupa, hanya terus mengambil tablet seperti sebelum ini.

Jika anda mengambil terlalu banyak

Nasihat perubatan dengan segera perlu dicari sekiranya terdapat kejadian dos berlebihan, walaupun anda berasa sihat, kerana risiko kelewatan, kerosakan hati yang serius.

5. Semasa menggunakan TRADOL

Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda berfikir bahawa kesan TRADOL terlalu kuat (anda berasa sangat mengantuk atau

sukar bernafas) atau terlalu lemah (anda tidak mempunyai kelegaan kesakitan yang cukup), hubungi doktor anda.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil mana-mana ubat-ubatan lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama

Jangan mengambil TRADOL semasa anda sedang menyusui, sebahagian kecil tramadol boleh meresap masuk ke dalam susu payudara.

Perkara yang perlu diberi perhatian

TRADOL boleh membentuk tabiat dan hanya harus digunakan oleh orang yang telah ditetapkan. Jangan berkongsi ubat ini dengan orang lain, terutama seseorang yang mempunyai sejarah penyalahgunaan dadah atau ketagihan. Simpan ubat di tempat di mana orang lain tidak boleh mendapatkannya.

Tramadol tidak boleh digunakan semasa menyusui. Sejumlah kecil tramadol masuk ke dalam susu ibu. Dos tunggal pada kebiasaannya tidak mengganggu penyusuan susu ibu. Jika anda telah mengambil Tradol tablet semasa anda menyusui, dapatkan rawatan perubatan dengan segera sekiranya anda melihat bayi anda mengalami sebarang perubahan dalam pernafasannya (seperti pernafasan menjadi lemah, sukar atau laju).

Serotonin Sindrom: Tradol tablet boleh menyebabkan keadaan yang mengancam nyawa yang jarang berlaku berpunca daripada gabungan pengambilan ubat serotoninergik. Jika anda mengalami beberapa

TRADOL TABLET

Tramadol Hydrochloride / Paracetamol (37.5mg/325mg)

atau kesemua gejala-gejala ini: rasa keliru, rasa tidak selesa, berpeluh, menggeletar, menggigil, halusinasi, kejang tiba-tiba dalam otot atau denyutan jantung yang cepat, segera dapatkan rawatan perubatan. Kekurangan adrenal: Penggunaan jangka panjang Tradol tablet boleh menyebabkan kekurangan adrenal, suatu keadaan yang berpotensi mengancam nyawa yang mungkin disertai dengan gejala dan tanda-tanda yang tidak spesifik seperti mual, muntah, kurang selera makan, keletihan, lemah, pening dan tekanan darah rendah. Dapatkan rawatan perubatan jika mengalami gejala-gejala ini. Ketidaksuburan: Penggunaan jangka panjang Tradol tablet boleh mengurangkan kesuburan. Ia tidak diketahui jika kesankesan ini pada kesuburan boleh diterbalikkan

6. Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, TRADOL boleh menyebabkan kesan sampingan, namun tidak semua orang mendapat mereka.

Sesetengah kesan sampingan yang boleh dialami adalah serius. Hubungi doktor anda dengan segera jika mana-mana yang berikut berlaku:

- kes ruam kulit, menunjukkan reaksi alahan, boleh berkembang dengan bengkak muka dan leher, kesukaran bernafas atau penurunan tekanan darah dan pengsan secara tiba-tiba. Jika ini berlaku kepada anda, menghentikan rawatan. Jangan

mengambil ubat sekali lagi. Selain itu, jika apa-apa kesan sampingan yang berikut akan mendapat serius, hubungi doktor atau ahli farmasi:

- loya
- pening, mengantuk.
- Muntah-muntah (sedang sakit), masalah penghadaman (sembelit, perut kembung, cirit-birit), sakit perut, mulut kering
- gatal, berpeluh
- sakit kepala, menggeletar
- kekeliruan, gangguan tidur, perubahan mood (kebimbangan, ketakutan, rasa semangat).

Ini bukanlah satu senarai lengkap kesan sampingan. Untuk apa-apa kesan yang tidak diduga semasa mengambil TRADOL hubungi andadoktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers ☐ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

• Cara penyimpanan dan pelupusan TRADOL

Simpanan

Simpan di bawah 30 ° C

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak perlu dilupuskan melalui air sisa atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini akan membantu untuk

melindungi alam sekitar.

7. Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk
Tablet bujur bersalut filem berwarna kuning air

Bahan-bahan kandungan:

Microcrystalline cellulose, Sodium Starch Glycolate, Pregelatinized Starch, Magnesium Stearate, Corn Starch, Hydroxypropylmethycellulose, Polyethylene Glycol, Propylene Glycol, Talc, Titanium dioxide, Yellow Iron Oxide

Nombor MAL.:

MAL12115053AZ

8. Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran:

Noripharma Sdn. Bhd.
200701034604 (792633-A)
Lot 5030, Jalan Teratai,
5 ½ Mile Off Jalan Meru
41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

9. Tarikh kemaskini RiMUP

Mac 2022

Nombor Siri

NPRA(R2/1)220208/835