

Mecort C (Clotrimazole and Hydrocortisone Acetate Cream)

Clotrimazole 1% w/w dan Hydrocortisone Acetate 1% w/w

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mecort C
2. Bagaimana Mecort C berfungsi
3. Sebelum mengambil Mecort C
4. Cara menggunakan Mecort C
5. Semasa menggunakan Mecort C
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Mecort C
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Mecort C

Mecort C digunakan untuk merawat jangkitan kulat dengan gejala radang dan kegatalan. Contoh ialah jangkitan kulat pada kaki (*athlete's foot*), jangkitan kulat diantara lipatan kulit (*candida intertrigo*), jangkitan kulat pada labia dan kawasan sekitar (*candida vulvitis*), keradangan pada hujung zakar dan kulup lelaki (*candida balanitis*) dan juga jangkitan kulat yang lain dimana *Clotrimazole* boleh digunakan.

Bagaimana Mecort C berfungsi

Produk ini mengandungi ubat anti-kulat yang dipanggil *Clotrimazole* dan ia digabung dengan *corticosteroid* dipanggil *Hydrocortisone Acetate* yang mempunyai fungsi anti-radang, anti-gatal dan sifat menyempit saluran darah.

Sebelum mengambil Mecort C

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan Mecort C sekiranya:

- Anda alah kepada mana-mana bahan produk ini, sila rujuk kepada bahab-bahan kandungan dalam risalah ini
- Kulit pada tempat yang dijangkiti luka/ rosak.
- Jangkitan disebabkan punca lain seperti jerawat, *rosacea*

(kemerahan kulit dan pembuluh darah yang kelihatan pada muka), *perioral dermatitis* (jangkitan kulit sekitar mulut), *lues* (sejenis jangkitan sexual), *tuberculosis* (jangkitan disebabkan bacteria *Mycobacterium tuberculosis*)

- Anda mempunyai jangkitan kulit lain yang belum dirawat
- Anda mempunyai jangkitan kulit jenis virus (cth., *herpes simplex*, cacar air, kayak dll.)
- Reaksi kulit disebabkan vaksin

-Sebelum mula mengambil

Berhati-hati semasa menggunakan Mecort C:

- Pada permukaan kulit yang luas (lebih dari 5 hingga 10% permukaan badan)
- Untuk jangka masa yang panjang
- Dibawah pembalut yang tidak membenarkan peredaran udara atau cecair (cth., lampin dan pembalut luka)

Penggunaan Mecort C pada bayi dan kanak-kanak harus dihadkan terutamanya apabila lampin boleh berfungsi sebagai pembalut yang tidak membenarkan peredaran udara dan cecair. Ini boleh menyebabkan peningkatan serapan ubat ke dalam badan. Penyerapan ini boleh mengakibatkan penindasan hormon semulajadi badan.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Tiada interaksi dilihat dengan ubat lain. Walaubagaimanapun, Mecort C berpotensi untuk merosakkan kontraseptif jenis lateks (cth., kondom lelaki dan perempuan), mengurangkan keberkesanya.

Cara menggunakan Mecort C

-Berapa banyak harus digunakan

Sapu satu lapisan nipis Mecort C pada tempat yang dijangkit, sekali atau dua kali sehari (pagi atau pagi dan petang). Gosok krim dengan perlahan untuk menggalakkan penyerapannya.

Sebagai panduan, jika berat badan anda 50 kg, dos maxima sehari ialah 2 cm krim dibahagikan kepada dua sapuan sehari.

Gunakan Mecort C untuk 7 hari maksima.

Sekiranya gejala anda bertambah baik selepas 7 hari, anda boleh tukar kepada krim bebas *corticosteroid* yang hanya mengandungi *Clotrimazole* untuk rawatan seterusnya.

-Bila perlu digunakan

Gunakan krim ini seperti yang diarahkan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Gunakan untuk 7 hari maksima. Jika tiada perubahan pada keadaan anda selepas 7 hari, dapatkan nasihat dari doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa menggunakan

Gunakan sebaik sahaja anda ingat tetapi jangan lebih dari dua kali dalam masa 24 jam.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tiada risiko keracunan jika terlalu banyak Mecort C disapu. Jika anda terlebih guna krim ini atau telah telan ubat ini secara tidak sengaja, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Tanda keracunan dari menelan ubat ini termasuk pening, loya atau muntah-muntah. Sekiranya ini berlaku, dapatkan pertolongan dari hospital terdekat anda.

Mecort C (Clotrimazole and Hydrocortisone Acetate Cream)

Clotrimazole 1% w/w dan Hydrocortisone Acetate 1% w/w

Semasa menggunakan Mecort C

-Perkara yang perlu dilakukan

Jumpa doktor anda dengan segera jika penglihatan anda kabur atau terganggu semasa menggunakan krim ini.

Baca risalah ini dengan teliti sebelum menggunakan Mecort C. Doktor atau ahli farmasi anda mungkin memberi anda cara gunaan yang lain. Kalau begitu, ikutlah arahan mereka dengan teliti.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berikan produk ini kepada sesiapa walaupun mereka mempunyai gejala yang sama seperti anda. Krim ini has diberikan untuk gejala anda sahaja.

Jangan guna krim ini secara berlebihan. Jika tiada perubahan pada gejala anda selepas menggunakan krim ini, dapatkan rawatan perubahan.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Mecort C mengandungi *Cetostearyl Alcohol* yang mungkin menyebabkan reaksi kulit seperti keradangan. Jika anda mengalami apa-apa kesan yang tidak menyenangkan dan berlanjutan selepas memakai krim ini, hentikan penggunaan produk ini dan dapat nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Mengandung dan menyusukan anak: Gunakan produk ini semasa mengandung atau menyusukan anak selepas perbincangan dengan doktor atau ahli farmasi anda sahaja.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, krim Mecort C boleh menyebabkan kesan sampingan tetapi bukan semua orang akan mengalaminya. Kesan-kesan sampingan yang telah diperhatikan adalah seperti:

Alahan (termasuk gejala pengsan, tekanan darah rendah, kesukaran bernafas dan kegatalan)

Lepuh, rasa tidak selesa/ sakit, bengkak, kemerahan, kerengsaan, pengelupasan, kegatalan, ruam, rasa sengat, pedih kulit pada tempat sapu.

Penglihatan anda kabur atau terganggu.

Jika produk ini digunakan terlalu lama (lebih dari 2-4 minggu), pada permukaan kulit yang luas (lebih dari 10% permukaan badan) atau digunakan dibawah pembalut yang tidak membenarkan peredaran udara atau cecair, kesan yang diperhatikan ialah penipisan kulit, pembuluh darah halus kelihatan seperti sarang lelabah, penumbuhan rambut, pembentukan garisan pada kulit, penukaran warna kulit, jangkitan dan gejala seperti jerawat mungkin berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.moh.gov.my [Public→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

-Pelupusan

Jangan gunakan krim ini selepas tamat tarikh luput yang dinyatakan pada hujung tiub krim atau kotak ubat ini. Jangan lupuskan ubat ini melalui buangan sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi cara yang terbaik untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini boleh melindungi alam sekitar dari pencemaran.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Mecort C ialah krim homogen putih, pekat dan konsisten tanpa zarah dibawah mikroskop.

Mecort C boleh didapati dalam tiub aluminium saiz 15 g dan 30 g dengan penutup plastic putih jenis skru.

-Bahan-bahan kandungan

· Bahan aktif

Clotrimazole 1% w/w dan Hydrocortisone Acetate 1% w/w

· Bahan tidak aktif

Cetostearyl alcohol, Liquid paraffin, Propylene glycol, Purified water dan Polyoxyl 20 – Cetostearyl ether

-Nombor MAL

MAL20096015AZ

Pengilang

Mepro Pharmaceuticals Private Limited

Unit II, Q Road, Phase IV, GIDC, Wadhwan, Surendranagar, Gujarat 363035, India

Pemegang Pendaftaran Produk

Synercam (M) Sdn Bhd

A-17-7, BLOCK A, JAYA ONE, NO. 72A, JALAN PROFESOR DIRAJA UNGKU AZIZ, SEKSYEN 13, 46200 PETALING JAYA MALAYSIA Date

Tarikh kemaskini RiMUP

11/1/2023

Nombor Siri

NPRA (R2) 20/054