

PATASYN (Olopatadine Hydrochloride) Ophthalmic Solution USP 0.2% w/v

Olopatadine Hydrochloride bersamaan Olopatadine 2mg/mL

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan PATASYN
2. Bagaimana PATASYN berfungsi
3. Sebelum mengambil PATASYN
4. Cara menggunakan PATASYN
5. Semasa menggunakan PATASYN
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan PATASYN
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan PATASYN

PATASYN digunakan untuk rawatan kegatalan mata yang disebabkan oleh alahan terhadap habuk rumah, debunga, bulu haiwan, atau allergen lain (alergi konjungtivitis)

Bagaimana PATASYN berfungsi

PATASYN berfungsi dengan mengurangkan intensity masalah alahan.

Sebelum mengambil PATASYN

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan PATASYN jika anda alahan kepada *olopatadine* atau mana-mana bahan-bahan lain dalam PATASYN.

Sekiranya ini berkaitan dengan anda, jangan menggunakan PATASYN dan beritahu doktor anda.

Kanak-kanak dan remaja (verumur 18 tahun dan ke bawah)

Keselamatan dan keberkesanan kanak-kanak di bawah umur 3 tahun belum dibuktikan.

Orang tua (berumur 65 tahun ke atas)

Anda boleh menggunakan PATASYN jika anda berumur 65

tahun ke atas dengan dos yang sama seperti orang dewasa lain.

Mengandung atau menyusukan anak

Sekiranya anda mengandung atau menyusukan, anda mungkin mengandung atau merancang untuk mempunyai bayi, minta nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini.

-Sebelum mula mengambil

PATASYN mengandungi *benzalkonium chloride* yang mungkin menyebabkan iritasi pada mata dan juga boleh mengubah warna kanta sentuh. Kanta sentuh harus dikeluarkan sebelum menggunakan PATASYN dan tunggu sekurang-kurangnya 15 minit sebelum memakai kanta sentuh anda kembali.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda, jika anda sedang menggunakan, baru-baru ini menggunakan atau mungkin menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang diambil tanpa preskripsi.


Cara menggunakan PATASYN

Sentiasa gunakan ubat ini sama seperti yang dijelaskan dalam risalah ini atau seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi atau jururawat anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi atau jururawat anda jika anda tidak pasti.

-Berapa banyak harus digunakan

Dos yang disyorkan adalah satu titis pada mata yang terjejas sekali sehari.

Langkah-langkah bagi penggunaan PATASYN yang tepat adalah seperti berikut.



1. Cuci tangan sebekum guna
2. Pusing penutup botol.
3. Guna jari tangan untuk tarik kelopak bawah mata yang terlibat ke arah bawah secara perlahan.
4. Letak hujung botol dekat dengan mata tetapi jangan sentuh dengan mata.
5. Tekan botol dengan perlahan supaya satu titisan dilepaskan ke dalam mata anda, selepas itu dilepaskan kelopak bawah mata.
6. Tekan bahagian mata yang terlibat atas hidung selama 1 minit dengan mata tertutup.
7. Ulangkan di mata sebelah jika diarahkan oleh doktor.
8. Menutup balik botol dengan penutup.

-Bila perlu digunakan

Guna sekali sehari atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa menggunakan PATASYN, teruskan dengan dos seterusnya seperti yang dirancang. Walau bagaimanapun, jika hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan mengikut jadual dos biasa anda. Jangan gunakan dos berganda untuk menggantikan balik dos yang tertinggal.

PATASYN (Olopatadine Hydrochloride) Ophthalmic Solution USP 0.2% w/v

Olopatadine Hydrochloride bersamaan Olopatadine 2mg/mL

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda menggunakan PATASYN lebih daripada yang anda perlukan, bilas dengan air suam. Jangan gunakan PATASYN sehingga tiba masanya untuk dos seterusnya yang ditetapkan.

Semasa menggunakan PATASYN

-Perkara yang perlu dilakukan

- Hanya gunakan PATASYN untuk mata.
- Untuk mengelakkan kontaminasi, hujung penitis tidak boleh menyentuh mana-mana permukaan. Hujung penitis juga tidak boleh bersentuhan dengan mata kerana ini boleh menyebabkan kecederaan pada mata.
- Cuba lagi sekiranya titisan tidak memasuki mata.
- Apabila menutup kelopak mata selama 2 minit (menggunakan oklusi nasolakrimal), penyerapan ubat ke bahagian badan lain (penyerapan sistemik) dikurangkan. Ini boleh menurunkan kesan sampingan umum yang menjejaskan bahagian badan yang lain dan meningkatkan aktiviti tempatan.
- Pastikan botol ditutup dengan ketat apabila tidak digunakan.
- Sekiranya lebih daripada satu ubat mata digunakan, tunggu sekurang-kurangnya 5 minit antara setiap penggunaan ubat. Ubat salap mata perlu digunakan akhir sekali.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan memakai kanta sentuh jika mata anda merah

PATASYN tidak boleh digunakan untuk merawat kerengsaan mata yang disebabkan oleh kanta sentuh.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan mengendalikan mesin:

Seperti mana-mana titisan mata, penglihatan kabur sementara atau gangguan penglihatan lain boleh menjejaskan keupayaan memandu atau menggunakan mesin. Sekiranya penglihatan kabur terjadi selepas penggunaan, pesakit mesti menunggu sehingga penglihatan pulih sebelum memandu atau menggunakan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, pengguna ubat PATASYN mungkin mengalami kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang serious, hentikan ubat ini dan beritahu doktor dengan serta-merta.

Kesan sampingan berikut telah diperhatikan dengan PATASYN:

Umum:

- Sakit kepala, *dysgeusia* (gangguan rasa), sakit mata, iritasi mata, mata kering, rasa tidak normal di mata, hidung kering, keletihan

Tidak umum:

- *Rhinitis* (iritasi pada hidung), pening, *hypoesthesia* (kebas), masalah kornea, keluaran cecair pada mata, fotofobia (sensitif kepada cahaya), penglihatan kabur, *blepharospasm* (renggutan kelopak mata), ketidakselesaan mata, kegatalan mata, masalah konjungtiva, kelebihan air mata, kemerahan kelopak mata, kelopak mata bengkak.

Tidak diketahui:

- Lebih sensitif, muka bengkak, *somnolence* (rasa mengantuk), bengkak mata/

kornea, konjungtivitis, penglihatan terkacau, kerak pada kelopak mata, *mydriasis* (pelebaran pupil mata), kesukaran bernafas, sinusitis, *dermatitis* (keradangan kulit), kemerahan, keletihan, *asthenia* (kelemahan yang tidak normal/ tidak bertenaga)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Simpan bawah 30°C.

Buang dalam 28 hari selepas dibuka.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

PATASYN adalah cecair yang jernih, tidak berwarna hingga kuning pudar.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
2.22 mg Olopatadine hydrochloride dalam 1 mL larutan (0.2% w/w)
- Bahan tidak aktif
Benzalkonium chloride, Edetate sodium, Povidone K30, Dibasic sodium phosphate anhydrous, Sodium chloride,

PATASYN (Olopatadine Hydrochloride Ophthalmic Solution USP 0.2% w/v)

Olopatadine Hydrochloride bersamaan Olopatadine 2mg/mL

*Hydrochloric acid, Sodium
hydroxide, Water for
injection*

-Pembungkusan tersedia

2.5 mL cecair dalam botol plastik
berwarna putih dengan penutup
plastik berwarna putih jenis skru.
Satu botol sekotak dengan satu sisip
bungkusan.

-Nombor MAL

MAL24026039AZ

Pengilang

USV Private Limited
H-13, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, E-
22, O IDC Mahatma Gandhi Udyog
Nagar, Dabhel Daman, 396210, India

Pemegang Pendaftaran Produk

Synercam (M) Sdn. Bhd.
A-17-7, Block A, Jaya One, No.
72A, Jalan Profesor Diraja Ungku
Aziz, Seksyen 13, 46200 Petaling
Jaya, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

-29/11/2023

Nombor Siri

NPRA(R2) 23/128