FENOTASH (Fenofibrate 200mg Capsule)

Fenofibrate (200mg Fenofibrate capsule)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Fenotash*
2. Bagaimana *Fenotash* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Fenotash*
4. Cara menggunakan *Fenotash*
5. Semasa menggunakan *Fenotash*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Fenotash*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan *Fenotash*

Fenotash digunakan sebagai rawatan sampingan bersama diet untuk merendahkan paras kolesterol darah

Bagaimana *Fenotash* berfungsi

Fenofibrate tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai '*fibrates*'. Ia berfungsi merendahkan paras trigliserida and kolesterol buruk dalam badan dan pada masa yang sama meningkatkan paras kolesterol baik.

Sebelum menggunakan *Fenotash*

• <u>*Bila tidak boleh menggunakan*</u>

- Anda mempunyai alahan terhadap bahan aktif fenofibrate atau bahan berkaitan atau bahan lain dalam formulasi ini
- Mempunyai penyakit ginjal
- Mempunyai penyakit hati
- Mempunyai penyakit pundi hempedu
- Pernah mengalami sensitiviti terhadap cahaya semasa rawatan dengan fibrates / ketoprofen

• <u>*Sebelum mula menggunakan*</u>

Maklumkan kepada doktor mengenai semua masalah kesihatan yang anda hadapi sekarang dan pada masa lalu.

Termasuk:

- Mempunyai alahan terhadap ubat-ubat lain, makanan, bahan pengawet atau pewarna
- Masalah hati
- Masalah ginjal
- Pernah mengalami bilangan sel darah merah dan putih menjadi rendah semasa mengambil ubat jenis yang hampir sama
- Pernah menghidapi penyakit batu karang atau radang pada pankreas semasa mengambil ubat jenis yang sama.
- Sakit otot semasa mengambil ubat kolesterol yang lain.

Pesakit tua dinasihatkan agar lebih berhati-hati semasa mengambil ubat ini kerana fungsi ginjal mungkin terjejas. Sentiasa jalani pemeriksaan untuk memastikan keadaan ginjal.

• <u>*Jika mengambil ubat-ubat lain*</u>

Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubatan yang didapatkan tanpa preskripsi. Ubat-ubat ini mungkin dipengaruhi oleh *Fenotash* atau mempengaruhi fungsi ubat *Fenotash*.

Anda mungkin perlu mengubah dos anda atau mengambil ubat lain. Doktor anda akan memberikan cadangan.

Doktor dan ahli farmasi anda mempunyai maklumat lebih lanjut mengenai ubat-ubat yang perlu diberi perhatian atau dielakkan semasa anda mengambil ubat-ubat berikut***:***

- Ubat yang menghalang pembekuan darah seperti *warfarin*
- Ubat untuk mengurangkan kolesterol jenis statin seperti *simvastatin.*
- *Cyclosporin* (ubat imunosupresan)
- Ubat resin yang menghalang asid hempedu daripada diserap seperti *cholestyramine*.

• <u>*Semasa mengandung dan menyusu bayi*</u>

Sila maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda hamil semasa mengambil ubat ini. Doktor anda akan menyarankan ubat yang sesuai untuk digunakan semasa mengandung.

Cara menggunakan *Fenotash*

Ambil ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Penggunaan Fenotash perlulah disertakan dengan diet rendah lemak dan rawatan perubatan atau senaman.

• <u>*Berapa banyak harus digunakan*</u>

Satu kapsul sehari

• <u>*Bila perlu digunakan*</u>

Diambil semasa salah satu waktu makan utama. Telan seluruh kapsul dengan air. Ia adalah penting untuk mengambil kapsul dengan makanan, kerana ia tidak akan berfungsi dengan sebaiknya jika perut anda kosong.

• <u>*Berapa lama perlu digunakan*</u>

Ambil ubat ini selagi diarahkan oleh doktor anda. Ubat ini membantu untuk mengawal keadaan anda tetapi bukan untuk menyembuhkannya. Jangan berhenti mengambil ubat ini dengan tiba-tiba.

• <u>*Jika terlupa menggunakan*</u>

Jika anda lupa satu dos, ambil sejurus anda teringat, tetapi sekiranya hampir masa untuk dos seterusnya, anda bolehlah cuma mengambil dos seterusnya. Jangan sesekali mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa. Sekiranya anda tidak pasti, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

• <u>*Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*</u>

Jika anda, atau sesiapa telah mengambil ubat ini secara berlebihan, anda hendaklah pergi ke Bahagian Rawatan Kecemasan Hospital terdekat atau maklumkan kepada doktor anda dengan segera. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang tanda ketidakselesaan atau keracunan. Bawa bersama bungkusan atau baki ubat biji yang selebihnya dengan anda.

Semasa menggunakan *Fenotash*

• <u>*Perkara yang perlu dilakukan*</u>

- Periksa paras kolesterol anda semasa diarahkan oleh doktor anda untuk memastikan ubat ini berkesan untuk anda.

FENOTASH (Fenofibrate 200mg Capsule)

Fenofibrate (200mg Fenofibrate capsule)

- Doktor anda mungkin akan melakukan ujian darah untuk memastikan bilangan sel darah dan fungsi hati adalah normal.
- Maklumkam kepada doktor anda sekiranya anda mengalami sakit otot, lemah atau kekejangan otot, terutamanya berserta dengan ketidakselesaan badan atau demam.
- Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda mengalami sakit abdomen, loya dan muntah yang mungkin disebabkan oleh keradangan. Keradangan pada pankreas mungkin merupakan tanda pembentukan batu karang.
- Maklumkan kepada doktor, doktor gigi, ahli farmasi yang anda sedang mengambil *Fenotash.*
- Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum anda mengambil ubat baru yang anda sedang mengambil *Fenotash.*
- Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda hamil semasa mengambil *Fenotash.*

• *Perkara yang tidak boleh dilakukan*
- Jangan minum alkohol berlebihan kerana ia mungkin menyebabkan masalah pada hati
- Jangan gunakan *Fenotash* untuk mengubati penyakit lain
- Jangan berhenti mengambil *Fenotash* sebelum berbincang dengan doktor anda.

• *Perkara yang perlu diberi perhatian*
Fenotash tidak mempengaruhi keupayaan untuk memandu, tetapi seperti ubat-ubat lain, sesetengah orang mungkin akan mengalami kepeningan semasa menggunakan ubat ini.

Kesan-kesan sampingan
Seperti ubat-ubatan lain, ubat ini boleh mendatangkan kesan sampingan kepada pengguna walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda perasan sebarang kesan-kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Fenotash boleh menyebab kesan-kesan sampingan yang berikut:

Biasa:
- Gangguan pada sistem gastrousus seperti sakit abdominal, loya, muntah, cirit-birit dan rasa kembung

Bukan kebiasaan:
- Sakit kepala
- Masalah kulit seperti ruam, kemerahan, gatal
- Lemah otot, kejang, sakit sendi, *rhabdomyolysis* (penguraian otot)
- Pembentukan batu karang

Jarang:
- Masalah hati (tahap enzim hati meningkat, hepatitis)
- Nafsu seks berkurang
- Alopecia (keguguran rambut), sensitif terhadap cahaya
- Bilangan sel darah merah dan putih menurun

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (*Public –> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI*)].

Cara penyimpanan dan pelupusan *Fenotash*
• *Penyimpanan*
Simpan di bawah 30°C.
Jangan tinggalkan ubat anda di dalam kereta. Jauhi daripada kanak-kanak.

• *Pelupusan*
Ubat-ubatan tidak sepatutnya dibuang seperti biasa. Tanya doktor atau ahli farmasi untuk mengetahui cara pelupusan.

Maklumat lanjut
• *Rupa dan warna produk*
Kapsul gelatin keras bersaiz “1” mempunyai penutup berwarna kuning dan badan lutsinar jernih diisi dengan pelet berbentuk sfera berwarna putih hingga putih pudar, dibungkus dalam lepuh lutrinar jernih PVC-Aluminium

Bahan-bahan kandungan
- Bahan Aktif
Fenofibrate

- Bahan-bahan tidak aktif
Sugar spheres, Hypromellose, Sodium Lauril sulfate, Dimethicone Emulsion 35%, Simethicone Emulsion 30%, Talc, Capsule

• *Bungkusan*
Pek blister aluminium/PVC 10 x 10’s kapsul sekotak

• *Nombor MAL*
xxxxxx

Pengilang
Athena Drug Delivery Solutions Private Limited,
PLOT A1-A5, MIDC, CHEMICAL ZONE, AMBERNATH (WEST),
MAHARASHTRA, 421 501, India

Pemegang Pendaftaran Produk
Synercam (M) Sdn Bhd,
A-17-7, BLOCK A, JAYA ONE,
NO. 72A, JALAN PROFESOR DIRAJA UNGKU AZIZ, SEKSYEN 13,
46200 PETALING JAYA
MALAYSIA

Tarikh kemaskini RiMUP
18/03/2024

Serial Number:
NPRA (R2)23/143