

FOSTER[®] NEXThaler[®] Inhalation Powder

Beclometasone dipropionate/ Formoterol fumarate dehydrate 200/6 mcg/dose

Apakah yang ada dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan Foster[®] NEXThaler[®]
2. Bagaimana Foster[®] NEXThaler[®] berfungsi
3. Sebelum menggunakan Foster[®] NEXThaler[®]
4. Cara menggunakan Foster[®] NEXThaler[®]
5. Semasa menggunakan Foster[®] NEXThaler[®]
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Foster[®] NEXThaler[®]
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Foster[®] NEXThaler[®]

FOSTER[®] NEXThaler[®] digunakan untuk merawat asma pada orang dewasa.

Bagaimana Foster[®] NEXThaler[®] berfungsi

FOSTER[®] NEXThaler[®] ialah serbuk yang disedut melalui mulut anda dan dihantar jauh ke dalam paru-paru anda. Ia mengandungi dua bahan aktif: *beclometasone dipropionate anhydrous* dan *formoterol fumarate dihydrate*.

- Beclometasone dipropionate tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil kortikosteroid yang mempunyai tindakan anti-radang mengurangkan bengkak dan kerengsaan dalam paru-paru anda.
- Formoterol fumarate dihydrate tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil bronkodilator bertindak panjang. Ini mengendurkan otot-otot di saluran pernafasan anda, melebarkan saluran udara supaya lebih mudah untuk anda menyedut udara masuk dan keluar dari paru-paru anda.

Kedua-dua bahan aktif ini memudahkan pernafasan. Mereka juga membantu mencegah gejala asma, seperti sesak nafas, semput dan batuk.

Jika anda diberi preskripsi FOSTER[®] NEXThaler[®] berkemungkinan sama ada:

- Asma anda tidak dikawal secukupnya dengan menggunakan kortikosteroid yang disedut dan bronkodilator bertindak pendek "seperti yang diperlukan" atau
- Asma anda bertindak balas dengan baik terhadap kedua-dua kortikosteroid dan bronkodilator bertindak panjang.

Sebelum menggunakan Foster[®] NEXThaler[®]

Bila tidak boleh digunakan:

- jika anda alah kepada beclometasone dipropionate anhydrous atau formoterol fumarate dihydrate atau mana-mana bahan lain ubat ini..

Amaran dan langkah berjaga-jaga

Jangan gunakan ubat ini jika anda sedang mengalami asma akut gejala seperti kekurangan nafas, semput dan batuk, asma anda semakin teruk atau anda mengalami akut serangan asma. Untuk melegakan gejala anda, anda harus menggunakan anda penyedut "pelega" bertindak pantas yang perlu anda bawa bersama anda pada setiap masa.

Sebelum menggunakan Foster[®] NEXThaler[®]

Bercakap dengan doktor anda sebelum ini menggunakan FOSTER[®] NEXThaler[®] jika anda mempunyai mana-mana gejala seperti berikut:

- masalah jantung, ini termasuk sebarang gangguan yang diketahui pada jantung dan/atau fungsi jantung anda
- gangguan irama jantung seperti peningkatan atau kadar jantung

tidak teratur, kadar nadi yang cepat atau berdebar-debar, atau jika anda telah diberitahu bahawa kesan jantung anda tidak normal

- tekanan darah tinggi
- penyempitan arteri (juga dikenali sebagai arteriosklerosis), atau jika anda tahu bahawa anda mempunyai aneurisme (pembongolan dinding saluran darah yang tidak normal)
- kelenjar tiroid yang terlalu aktif
- paras darah rendah kalium
- sebarang penyakit hati atau buah pinggang anda
- kencing manis. Jika anda menyedut dos tinggi formoterol glukosa darah anda mungkin meningkat dan oleh itu anda mungkin perlu menjalani beberapa ujian darah tambahan untuk memeriksa gula darah anda apabila anda mula menggunakan ubat ini dan dari semasa ke semasa semasa rawatan.
- tumor kelenjar adrenal (dikenali sebagai pheochromocytoma)
- anda sepatutnya mempunyai anestetik. Bergantung pada jenis anestetik, mungkin perlu berhenti mengambil FOSTER[®] NEXThaler[®] sekurang-kurangnya 12 jam sebelum anestetik.
- anda sedang, atau pernah, dirawat untuk tuberkulosis (TB) atau jika anda mempunyai jangkitan virus atau kulat yang diketahui pada dada anda.

Jika mana-mana perkara di atas terpakai kepada anda, sentiasa maklumkan kepada doktor anda sebelum anda menggunakan FOSTER[®] NEXThaler[®].

Jika anda tidak pasti sama ada anda boleh menggunakan FOSTER[®] NEXThaler[®] berbincang dengan doktor, jururawat asma atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan alat sedut.

Doktor anda mungkin ingin mengukur paras kalium dalam darah anda dari semasa ke semasa terutamanya jika asma anda teruk.

Foster® Nexthaler® Inhalation Powder

Beclometasone dipropionate/ Formoterol fumarate dehydrate 200/6 mcg/dose

Seperti kebanyakan bronkodilator FOSTER® NEXThaler® boleh menyebabkan kejatuhan mendadak dalam paras kalium serum anda (hipokalaemia). Ini kerana kekurangan oksigen dalam darah digabungkan dengan beberapa rawatan lain yang mungkin anda ambil bersama FOSTER® NEXThaler® boleh menyebabkan penurunan paras kalium lebih teruk.

Jika anda menggunakan alat sedut untuk mengambil dos kortikosteroid yang tinggi dalam jangka masa yang panjang, anda mungkin lebih memerlukan kortikosteroid dalam situasi tekanan. Situasi yang tertekan mungkin termasuk dibawa ke hospital selepas kemalangan, mengalami kecederaan serius, atau sebelum pembedahan. Dalam kes ini, doktor yang merawat anda akan memutuskan sama ada anda mungkin perlu meningkatkan dos kortikosteroid anda dan mungkin menetapkan beberapa tablet steroid atau suntikan steroid.

Sekiranya anda perlu pergi ke hospital, ingatlah untuk membawa semua ubat dan penyedut anda bersama anda, termasuk FOSTER® NEXThaler® dan sebarang ubat atau tablet yang dibeli tanpa preskripsi, dalam pakej asalnya, jika boleh.

Hubungi doktor anda jika anda mengalami penglihatan kabur atau gangguan penglihatan lain.

Kanak-kanak dan remaja

Jangan berikan ubat ini kepada kanak-kanak dan remaja yang berumur kurang daripada 18 tahun.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil, baru-baru ini mengambil atau mungkin mengambil sebarang ubat lain. Ini kerana FOSTER® NEXThaler® boleh menjejaskan cara sesetengah ubat lain berfungsi. Juga, sesetengah ubat boleh menjejaskan cara FOSTER® NEXThaler® berfungsi.

Khususnya, beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda menggunakan mana-mana ubat berikut:

Sesetengah ubat boleh meningkatkan kesan FOSTER® NEXThaler® dan doktor anda mungkin ingin memantau anda dengan teliti jika anda mengambil ubat ini (termasuk beberapa ubat untuk HIV: ritonavir, cobicistat).

- Ubat penyekat beta. Penyekat beta adalah ubat yang digunakan untuk merawat banyak keadaan termasuk masalah jantung, tekanan darah tinggi atau glaukoma (peningkatan tekanan pada mata). Jika anda perlu menggunakan penyekat beta (termasuk ubat titis mata), kesan formoterol mungkin berkurangan atau formoterol mungkin tidak berfungsi sama sekali.
- Ubat adrenergik beta (ubat yang berfungsi dengan cara yang sama seperti formoterol) boleh meningkatkan kesan formoterol.
- Ubat untuk merawat irama jantung yang tidak normal (quinidine, disopyramide, procaina-mide)
- Ubat untuk merawat tindak balas alahan (antihistamin seperti terfenadine)
- Ubat untuk merawat gejala kemurungan atau gangguan mental seperti perencat monoam-inoxidase (contohnya phenelzine dan isocarboxazid) atau antidepresan trisiklik (contohnya amitryptiline dan imipramine) atau phenothiazines
- Ubat untuk merawat Penyakit Parkinson (L-dopa)
- Ubat untuk merawat kelenjar tiroid yang tidak aktif (L-thyroxine)
- Ubat yang mengandungi oksitosin (yang menyebabkan pengecutan rahim)
- Ubat untuk merawat gangguan mental seperti perencat monoaminoksidase (MAOI), termasuk ubat-ubatan dengan sifat yang serupa seperti furazolidone dan procarbazine

- Ubat untuk merawat penyakit jantung (digoxin)
- Ubat lain yang digunakan untuk merawat asma (teofilin, aminofilin atau steroid)
- Diuretik (tablet air)

Juga beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda akan mendapatkan anestetik am untuk pembedahan atau untuk kerja pergigian.

Cara menggunakan Foster® NexThaler®

FOSTER® NEXThaler® adalah untuk kegunaan penyedutan

Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan ubat ini sama seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda. Semak dengan doktor, jururawat atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

FOSTER® NEXThaler® memberikan aerosol yang lebih halus yang menyebabkan lebih banyak setiap dos dihantar ke paru-paru anda. Oleh itu, doktor anda mungkin menetapkan dos yang lebih rendah bagi penyedut ini daripada penyedut anda sebelum ini. Doktor anda akan memberi anda pemeriksaan biasa untuk memastikan anda mengambil dos FOSTER® NEXThaler® yang betul. Sebaik sahaja asma anda dikawal dengan baik, doktor anda mungkin menganggap wajar untuk mengurangkan dos FOSTER® NEXThaler® secara beransur-ansur. Dalam apa jua keadaan, anda tidak boleh menukar dos tanpa terlebih dahulu bercakap dengan doktor anda.

Orang dewasa dan orang tua:

Dos yang disyorkan ubat ini ialah 2 penyedutan dua kali sehari. Dos harian maksimum ialah 4 penyedutan.

Jangan tambah dos.

Jika anda merasakan ubat itu tidak berkesan, sentiasa berbincang dengan doktor anda sebelum meningkatkan dos.

Foster® Nexthaler® Inhalation Powder

Beclometasone dipropionate/ Formoterol fumarate dehydrate 200/6 mcg/dose

Peringatan: anda harus sentiasa membawa penyedut "pelega" bertindak pantas anda pada setiap masa untuk merawat gejala asma yang semakin teruk atau serangan asma secara tiba-tiba.

Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan menggunakan FOSTER® NEXThaler® selama yang disyorkan oleh doktor anda.

Jika terlupa menggunakan

Ambilnya sebaik sahaja anda ingat. Jika hampir tiba masanya untuk dos seterusnya, jangan ambil dos yang anda terlepas, cuma ambil dos seterusnya pada masa yang betul. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.

Jika anda berhenti menggunakan FOSTER® NEXThaler®:

Walaupun anda berasa lebih baik, jangan berhenti menggunakan Foster atau kurangkan dos. Jika anda ingin melakukan ini, berbincang dengan doktor anda. Adalah sangat penting untuk anda menggunakan Foster setiap hari seperti yang ditetapkan oleh doktor anda walaupun anda mungkin tidak mempunyai simptom.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

1. hubungi doktor anda atau jabatan mangsa hospital terdekat dengan segera untuk mendapatkan nasihat. Bawa ubat anda bersama anda supaya orang ramai dapat melihat apa yang anda telah ambil;
2. kesan sampingan mungkin berlaku. Beritahu doktor anda jika anda mempunyai sebarang gejala luar biasa kerana dia mungkin ingin menjalankan ujian lanjut atau memutuskan sebarang langkah yang mungkin perlu.


Semasa menggunakan Foster® NEXThaler®

Perkara yang perlu dilakukan

Amaran Am & Langkah Berjaga-jaga

- Jangan keluarkan penyedut dari kantung jika anda tidak berniat untuk menggunakannya dengan segera.
- Hanya gunakan penyedut anda seperti yang ditunjukkan.
- Pastikan penutup tertutup sehingga anda perlu mengambil satu dos daripada penyedut anda.
- Apabila anda tidak menggunakan penyedut anda, simpan di tempat yang bersih dan kering.
- Jangan cuba mengasingkan penyedut FOSTER® NEXThaler® anda atas sebarang sebab.

Ciri-ciri utama penyedut FOSTER® NEXThaler® anda




Mengambil dos daripada penyedut FOSTER® NEXThaler® anda hanya memerlukan tiga langkah mudah: Buka, Tarik, Tutup.

Sebelum menggunakan penyedut FOSTER® NEXThaler® baharu

1. Buka kantung dan keluarkan alat sedut anda.
 - Jangan gunakan penyedut anda jika kantung tidak tertutup atau rosak – pulangkan kepada orang yang membekalkannya dan dapatkan yang baharu.
 - Gunakan label pada kotak untuk menulis tarikh anda membuka kantung.
2. Periksa alat sedut anda.
 - Jika penyedut anda kelihatan rosak atau rosak, kembalikan kepada orang yang membekalkannya dan dapatkan yang baharu.

3. Semak Tetingkap Kaunter Dos. Jika penyedut anda adalah baru, anda akan melihat "120" dalam Tetingkap Kaunter Dos.

- Jangan gunakan penyedut baru jika nombor yang ditunjukkan kurang daripada "120" – pulangkan kepada orang yang membekalkannya dan dapatkan yang baharu.




Cara menggunakan penyedut FOSTER® NEXThaler® anda

- Jika anda tidak pasti anda menerima dos anda dengan betul, hubungi ahli farmasi atau doktor anda.
- Jika anda tidak pasti kaunter dos telah turun sebanyak satu selepas penyedutan, tunggu sehingga dos dijadualkan anda yang seterusnya dan ambil ini seperti biasa. Jangan ambil dos tambahan.

E.1 Buka

1. Pegang inhaler anda dengan kuat dalam kedudukan tegak.
2. Semak bilangan dos yang tinggal: sebarang nombor antara "1" dan "120" menunjukkan bahawa terdapat baki dos.
 3. Jika Tetingkap Kaunter Dos menunjukkan "0" tiada dos yang tinggal - buang penyedut anda dan dapatkan yang baharu.

3. Buka penutup sepenuhnya.



4. Sebelum menarik nafas hembus sejauh yang selesa.
 - Jangan bernafas melalui alat sedut anda.


E.2 Tarik nafas

Bila boleh, berdiri atau duduk dalam keadaan tegak semasa menarik nafas.

Foster® Nexthaler® Inhalation Powder

Beclometasone dipropionate/ Formoterol fumarate dehydrate 200/6 mcg/dose


1. Angkat penyedut anda ke atas, bawa ke mulut anda dan letakkan bibir anda di sekeliling corong.
 4. Jangan tutup lubang udara semasa memegang alat sedut anda.
 5. Jangan sedut melalui lubang
2. Tarik nafas dengan kuat dan dalam melalui mulut anda.
 6. Anda mungkin perasan rasa apabila anda mengambil dos anda.
 7. Anda mungkin mendengar atau merasakan bunyi klik apabila anda mengambil dos anda.
 8. Jangan sedut melalui hidung anda.
 9. Jangan keluarkan penyedut anda dari bibir anda semasa menyedut.



3. Keluarkan alat sedut dari mulut anda.
4. Tahan nafas anda selama 5 hingga 10 saat atau selagi anda selesa.
5. Hembus nafas perlahan-lahan.
 - Jangan bernafas melalui alat sedut anda.

E.3 Tutup

- Gerakkan penyedut anda kembali ke kedudukan tegak dan tutup penutup sepenuhnya.
- Periksa sama ada kaunter dos telah turun sebanyak satu



- Jika anda perlu mengambil dos lain, ulangi langkah E.1 hingga E.3.

Pembersihan

- Biasanya, alat sedut tidak perlu dibersihkan.

- Jika perlu anda boleh membersihkan alat sedut anda selepas digunakan dengan kain kering atau tisu.
 - Jangan bersihkan alat sedut anda dengan air atau cecair lain. Pastikan ia kering.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan tambah dos.

Jika anda merasakan bahawa ubat itu tidak begitu berkesan, sentiasa berbincang dengan doktor anda sebelum meningkatkan dos. Jangan berhenti menggunakan FOSTER® NEXThaler® secara tiba-tiba.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika pernafasan anda tidak berubah:

Jika simptom anda tidak bertambah baik selepas menyedut FOSTER® NEXThaler®, anda mungkin menggunakannya secara tidak betul. Oleh itu semak arahan untuk penggunaan yang betul dan/atau hubungi doktor, jururawat atau ahli farmasi anda untuk dilatih semula dengan betul.

Jika asma anda semakin teruk:

Jika simptom anda menjadi lebih teruk atau sukar dikawal (cth. jika anda menggunakan penyedut "pelega" anda dengan lebih kerap) atau jika penyedut "pelepasan" anda tidak memperbaiki gejala anda, anda harus terus menggunakan FOSTER® NEXThaler® tetapi pergi untuk melihat doktor anda secepat mungkin. Doktor anda mungkin perlu menukar dos FOSTER® NEXThaler® anda atau menetapkan rawatan tambahan atau alternatif.

Kehamilan, penyusuan susu ibu dan kesuburan

Tiada data klinikal mengenai penggunaan FOSTER® NEXThaler® semasa kehamilan.

Jika anda fikir anda hamil atau merancang untuk melahirkan bayi, minta nasihat doktor anda sebelum mengambil ubat ini. Anda hanya perlu menggunakan FOSTER® NEXThaler® semasa kehamilan jika anda dinasihatkan untuk berbuat

demikian oleh doktor anda. Doktor anda akan memutuskan sama ada anda mesti berhenti mengambil FOSTER® NEXThaler® semasa penyusuan atau anda perlu mengambil FOSTER® NEXThaler® tetapi mengelak daripada menyusu. Sentiasa ikut nasihat doktor anda dengan ketat.

Memandu dan menggunakan mesin

FOSTER® NEXThaler® tidak mungkin menjejaskan keupayaan anda untuk memandu dan menggunakan mesin.

Walau bagaimanapun, jika anda mengalami kesan sampingan seperti pening dan/atau menggeletar, keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera mungkin terjejas.

FOSTER® NEXThaler® mengandungi laktosa.

Laktosa mengandungi sejumlah kecil protein susu, yang boleh menyebabkan reaksi pada pesakit alahan. Jika anda telah diberitahu oleh doktor anda bahawa anda mempunyai sikap tidak bertoleransi terhadap beberapa gula, hubungi doktor anda sebelum mengambil produk perubatan ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Foster® NEXThaler® boleh menyebabkan kesan sampingan.

Seperti rawatan penyedut lain, terdapat risiko sesak nafas, batuk dan berdehit yang semakin teruk selepas menggunakan FOSTER® NEXThaler® dan ini dikenali sebagai bronkospasme paradoks. Jika ini berlaku, anda harus BERHENTI menggunakan FOSTER® NEXThaler® serta-merta dan gunakan penyedut "pelega" bertindak pantas anda dengan segera untuk merawat gejala. Anda harus segera menghubungi doktor anda.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami tindak balas alahan yang termasuk alahan kulit, kegatalan kulit, ruam kulit, kemerahan kulit, bengkak pada kulit atau

Foster® Nexthaler® Inhalation Powder

Beclometasone dipropionate/ Formoterol fumarate dehydrate 200/6 mcg/dose

membran mukus terutamanya mata, muka, bibir dan tekak.

Kesan sampingan lain yang mungkin dari FOSTER® NEXThaler® disenaraikan di bawah mengikut kekerapannya.

Biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang):

- menggeletar.

Tidak biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang):

- simptom seperti selsema, sakit tekak
- jangkitan kulat (mulut dan tekak). Membilas mulut atau berkumur dengan air dan memberus gigi serta-merta selepas terhidu boleh membantu mengelakkan kesan sampingan ini.
- simptom asma anda semakin teruk, kesukaran bernafas
- suara serak
- batuk
- degupan jantung yang luar biasa laju
- degupan jantung yang luar biasa perlahan
- sakit dada meremukkan
- sakit kepala
- berasa sakit
- berasa letih atau gementar
- perubahan dalam elektrokardiogram (ECG)
- tahap kortisol yang rendah dalam air kencing atau dalam darah anda
- paras kalium yang tinggi dalam darah anda.
- paras glukosa yang tinggi dalam darah anda
- tahap lemak yang tinggi dalam darah anda

Tidak diketahui (kekerapan tidak boleh dianggarkan daripada data yang tersedia):

- penglihatan kabur

Kesan sampingan yang telah diperhatikan dengan ubat serupa untuk penyedutan yang mengandungi beclometasone dipropionate dan/atau formoterol adalah:

- berdebar-debar
- degupan jantung tidak sekata

- deria rasa yang tidak normal atau terjejas
- sakit otot dan kekejangan otot
- kegelisahan, pening
- berasa cemas
- gangguan tidur
- penurunan paras kalium dalam darah
- peningkatan/penurunan tekanan darah.

Menggunakan kortikosteroid yang disedut dos tinggi dalam jangka masa yang lama boleh menyebabkan kesan sistemik; ini termasuk:

- masalah dengan cara kelenjar adrenal anda berfungsi (adrenosuppression)
- penipisan tulang
- terencat pertumbuhan pada kanak-kanak dan remaja
- peningkatan tekanan dalam mata anda (dipanggil glaukoma), katarak
- pertambahan berat badan yang cepat, terutamanya bahagian muka dan badan
- masalah tidur, kemurungan atau rasa bimbang, resah, gementar, terlalu teruja atau mudah marah. Kesan ini lebih berkemungkinan berlaku pada kanak-kanak.
- tingkah laku yang tidak normal.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Report an Adverse Event).

Cara penyimpanan dan Pelupusan Foster® NEXThaler®

Penyimpanan

Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada karton, sachet dan label selepas Exp. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Simpan dalam bungkusan asal untuk melindungi daripada kelembapan. Hanya keluarkan inhaler dari sachetnya sejurus sebelum penggunaan pertama.

Sebelum mula membuka sachet:

Produk perubatan ini tidak memerlukan sebarang syarat penyimpanan suhu khas.

Selepas pertama kali membuka sachet: Jangan simpan melebihi 30°C.

Selepas pertama kali membuka sachet, produk ubat harus digunakan dalam masa 2 bulan.

Gunakan label pada kotak untuk menulis tarikh anda membuka sachet.

Pelupusan

Jangan buang sebarang ubat melalui air buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang anda tidak gunakan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

FOSTER® NEXThaler® dipersembahkan sebagai serbuk penyedutan putih hingga hampir putih yang terkandung dalam penyedut plastik yang dipanggil Nexthaler. Setiap pek mengandungi satu penyedut yang menyediakan 120 penyedutan setiap satu. Alat sedut datang dalam uncang pelindung bertutup.

Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif:

Beclometasone dipropionate, formoterol dihydrate/fumarate.

Setiap dos bermeter mengandungi 200 mikrogram *beclometasone dipropionate anhydrous* dan 6 mikrogram *formoterol fumarate dihydrate*. Ini sepadan dengan dos yang dihantar dari corong 158.8 mikrogram *beclometasone dipropionate anhydrous* dan 4.9 mikrogram *formoterol fumarate dihydrate*.

Bahan-bahan tidak aktif:

Lactose monohydrate, magnesium stearate

FOSTER[®] NEXThaler[®] Inhalation Powder

Beclometasone dipropionate/ Formoterol fumarate dehydrate 200/6 mcg/dose

Nombor MAL

MALXXXXXXx

Pengilang

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via San Leonardo 96,
43122 Parma, Italy.

Pemegang pendaftaran produk:

Orient Europharma (M) Sdn Bhd.
E-08, Garden Shoppe, One City,
Jalan USJ 25/1C,
47650 Subang Jaya,
selangor Malaysia.

Tarikh Kemaskini

29/02/2023

Serial Nombor

NPRA (R1) 23/032