

CP PHARMA FUSIDIC ACID CREAM 2% w/w

Fusidic Acid (2.0% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CP Pharma Fusidic Acid Cream
2. Bagaimana CP Pharma Fusidic Acid Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream
4. Cara menggunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream
5. Semasa menggunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan CP Pharma Fusidic Acid Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan CP Pharma Fusidic Acid Cream

CP Pharma Fusidic Acid Cream digunakan untuk merawat penyakit kulit yang disebabkan oleh jangkitan bakteria, seperti:

- *Impetigo* (mengelupas, tompokan berkerak dan bengkak pada kulit)
- Bisul (bengkak pada kawasan kulit yang disebabkan oleh nanah dan tisu mati)
- *Carbuncles* (beberapa kelompok bisul)
- *Paronychia* (jangkitan kulit berhampiran kuku)
- Luka yang telah dijangkiti
- *Folliculitis* (jangkitan, keradangan di bahagian folikel rambut)
- *Sycosis barbae* (jangkitan di folikel janggut)
- Hidradenitis (jangkitan kulit yang menyebabkan abses dan parut pada kulit, biasanya sekitar pangkal paha, punggung, dada dan ketiak)
- *Erythrasma* (tompokan kulit bersisik berwarna coklat)

Bagaimana CP Pharma Fusidic Acid Cream berfungsi

Ubat ini mengandungi *fusidic acid* sebagai bahan aktif. Ia adalah sejenis antibiotik yang berkesan disebabkan oleh keupayaannya untuk menebusi kulit. Dalam kuantiti yang tertentu, *fusidic acid* boleh menghalang hampir

kesemua jenis *Staphylococcus aureus*. Penggunaan topikal juga berkesan melawan *streptococci*, *corynebacteria*, *Neisseria* dan sesetengah *clostridia*.

Sebelum menggunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream

- *Bila tidak boleh menggunakan*
Jangan mengambil ubat ini jika:
 - anda alah kepada *fusidic acid* atau mana-mana bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mengambil ubat ini, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- *Sebelum menggunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream*

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum menggunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream jika:

- anda hamil, berfikir anda hamil
- anda sedang menyusukan

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*
Interaksi dengan ubat lain yang diambil adalah minimum. Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain dalam apa jua bentuk termasuk apa-apa yang anda membeli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Cara menggunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream

- *Kuantiti yang harus digunakan*
Ubat ini hanya untuk digunakan pada kulit sahaja. Jangan menelannya. Untuk kegunaan luaran sahaja.

Doktor akan menasihati anda tentang kuantiti yang perlu digunakan. Ikut semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi. Arahan yang diberikan mungkin berbeza daripada maklumat dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan yang ditulis

pada label, rujuk dengan doktor atau ahli farmasi sebagai bantuan.

CP Pharma Fusidic Acid Cream 2% w/w perlu disapu pada bahagian yang terjejas sebanyak 2-3 kali sehari bagi tempoh selama 7 hari, kecuali bagi rawatan jerawat dimana rawatannya perlu dilanjutkan mengikut keadaan penyakit tersebut.

- *Bila perlu digunakan*
Gunakan ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Selalunya, ia disapu di bahagian yang terjejas sebanyak dua hingga tiga kali sehari.

- *Berapa lama perlu digunakan*
Anda dinasihatkan untuk menggunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream selagi doktor anda memberitahu anda. Secara umumnya, ia digunakan untuk tempoh 7 hari, kecuali bagi rawatan jerawat dimana rawatannya perlu dilanjutkan mengikut keadaan penyakit tersebut.

- *Jika terlupa menggunakan*
Jika anda terlupa untuk menggunakan ubat ini, gunakan ia sebaik sahaja anda ingat. Kemudian seterusnya menggunakan ubat ini pada masa yang biasa.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Jika anda secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak krim atau tertelan kuantiti kecil krim secara tidak sengaja, ia tidak akan menyebabkan apa-apa kemudaratan. Jika kuantiti yang lebih besar daripada krim ditelan secara tidak sengaja atau anda berasa bimbang, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital yang terdekat untuk mendapatkan nasihat.

Semasa menggunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream

- *Perkara yang perlu dilakukan*
Beritahu doktor anda:
 - Jika anda mengalami reaksi alahan atau apa-apa kesan

sampingan yang tidak diingini semasa menggunakan ubat ini.

- Jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream.

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berikan CP Pharma Fusidic Acid Cream kepada orang lain walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan gunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream selepas tarikh tamat tempoh.
- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Berhati-hati apabila menggunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream pada kawasan berhampiran mata kerana penyediaan ini boleh menyebabkan kerengsaan jika ia masuk ke dalam mata.
- Jika anda menggunakan CP Pharma Fusidic Acid Cream untuk tempoh masa yang panjang dan kuantiti yang banyak, peluang untuk mendapat apa-apa kesan sampingan mungkin lebih tinggi. Kulit anda juga boleh menjadi lebih sensitif kepada ubat ini dan daya tahan terhadap antibiotik (kurang berkesan) boleh terjadi.

Memandu dan menggunakan jentera
CP Pharma Fusidic Acid Cream tidak menjejaskan keupayaan untuk memandu atau mengendalikan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Fusidic Acid 2% Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mendapat kesan tersebut. Kesan-kesan ini boleh menjadi serius tetapi kebanyakan masa, kesan tersebut adalah ringan dan sementara.

Beritahu doktor anda dengan segera dan dapatkan bantuan perubatan segera jika anda mengalami kesan tindak balas hipersensitiviti kepada bahan aktif seperti:

- *Pruritus* (kegatalan kulit)
- Ruam kulit

Kesan sampingan lain yang jarang dilaporkan:

- Sistem imun terjejas (jarang): alahan
- Sakit mata (jarang): Konjunktivitis
- Penyakit kulit (tidak biasa): dermatitis (kulit gatal, ruam), ruam, *pruritus* (gatal kulit), *erythema* (kulit merah)
- Penyakit kulit (jarang): *angioedema* (bengkak), *urticarial* (kulit berbintat), kulit melepuh
- Sakit yang biasa di kawasan sapuan (tidak biasa): kawasan sapuan terasa sakit (termasuk rasa panas atau terbakar), keradangan.

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor secepat mungkin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan laman web npra.moh.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccine (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan CP Pharma Fusidic Acid Cream

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada capaian kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Putih, krim legap

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Fusidic Acid 2.0% w/w

- Bahan tidak aktif
Carbomer
Aminomethyl Propanol
Liquid paraffin
Polysorbate
Sorbitan monooleate
Methyl Hydroxybenzoate
Propyl Hydroxybenzoate
Butylated Hydroxytoluene
Propylene Glycol
Purified Water

- Nombor MAL :
MALXXXXXXXXXA

Pengilang

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID PHARMACY Sdn. Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

14/04/2020

Nombor Siri

NPRA (R2) 20/007