

ENCAVID TABLETS 0.5MG

Entecavir Tablets (0.5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Encavid Tablets 0.5mg
2. Bagaimana Encavid Tablets 0.5mg berfungsi
3. Sebelum menggunakan Encavid Tablets 0.5mg
4. Cara menggunakan Encavid Tablets 0.5mg
5. Semasa menggunakan Encavid Tablets 0.5mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Encavid Tablets 0.5mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Encavid Tablets 0.5mg

Encavid Tablets 0.5mg digunakan untuk rawatan jangkitan kronik virus hepatitis B di kalangan orang dewasa yang mempunyai replikasi virus aktif.

Bagaimana Encavid Tablets 0.5mg berfungsi

Jangkitan hepatitis B virus boleh menyebabkan kerosakan hati. Encavid Tablets 0.5mg mengurangkan bilangan virus dalam badan anda, dan menjaga keadaan hati.

Sebelum menggunakan Encavid Tablets 0.5mg

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika:

- Anda mempunyai hipersensitiviti pada Entecavir atau mana-mana bahan lain dalam Encavid Tablets 0.5mg.
- Anda ialah pesakit HIV/HBV tetapi tidak menerima terapi antiretroviral yang sangat aktif (HAART).

Jangan ambil Encavid Tablets 0.5mg jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung, selain dikira penting oleh doktor. Encavid Tablets 0.5mg belum dibuktikan bahawa selamat untuk digunakan masa mengandung.

Jangan ambil Encavid Tablets 0.5mg sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

Encavid Tablets 0.5mg tidak digalakkan untuk kanak-kanak di bawah umur 16 tahun.

- Sebelum mula mengambil

Memaklumkan dan berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika:

- Anda pernah ada masalah dengan buah pinggang anda
- Anda mempunyai hati yang dipindah
- Hati anda tidak berfungsi dengan betul (*decompensated liver disease*)
- Anda ada alahan lain atau masalah kesihatan

Doktor anda akan membuat keputusan sama ada Encavid Tablets 0.5mg sesuai untuk anda atau tidak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan. Doktor atau ahli farmasi anda akan memberi nasihat sama ada anda boleh mengambil Encavid Tablets 0.5mg bersama-sama dengan ubat yang lain.

Cara menggunakan Encavid Tablets 0.5mg

- Berapa banyak harus digunakan

Patuhi semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan pegawai farmasi anda dengan berhati-hati. Mereka mungkin berbeza dari maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, bertanya kepada doktor atau pegawai farmasi untuk membantu.

Dewasa

Dos yang disyorkan ialah antara 0.5mg atau 1 mg tablet sekali sehari. Dos ini berdasarkan:

- Samada anda pernah dirawat untuk jangkitan HBV dan ubat yang pernah digunakan
- Samada anda mengalami masalah buah pinggang. Doktor anda boleh memberikan dos yang rendah untuk anda atau mengarahkan anda untuk mengambil kurang daripada sekali sehari
- Keadaan hati anda

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Encavid Tablets 0.5mg perlu diambil semasa perut kosong melainkan jika dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa.

ENCAVID TABLETS 0.5MG

Entecavir Tablets (0.5mg)

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Encavid Tablets 0.5mg

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor:

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor
- Jika anda mengalami apa-apa reaksi alahan / kesan sampingan yang tidak diingini semasa mengambil ubat.
- Jika anda hamil semasa mengambil ubat ini

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mengambil Encavid Tablets 0.5mg dengan makanan kecuali diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi.
- Jangan memberikan Encavid Tablets 0.5mg kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda.
- Jangan mengambil ubat ini untuk merawat masalah lain kecuali telah diberitahu oleh doktor atau pegawai farmasi anda.
- Jangan berhenti mengambil ubat ini sebelum bertanya pada doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Terapi dengan Encavid Tablets 0.5mg tidak terbukti untuk mengurangkan risiko jangkitan virus hepatitis B. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan jangkitan yang sesuai masih perlu diambil.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat lain, Encavid Tablets 0.5mg boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini, walaupun tidak semua orang akan mendapat kesan tersebut. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya ia adalah ringan dan untuk tempoh sementara sahaja

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang tidak diingini semasa mengambil ubat ini seperti;

- masalah susah tidur
- sakit kepala
- pening
- rasa mengantuk yang terlampau
- loya
- cirit-birit
- senak
- muntah
- keletihan
- keradangan hati semakin teruk
- hati tidak berfungsi dengan baik
- keguguran rambut
- ruam

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor anda dengan cepat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side

Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Encavid Tablets 0.5mg

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak. Simpan dibawah 30°C. Lindungi dari cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat berwarna putih dan bersalut dengan filem.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Setiap Encavid Tablets 0.5mg mengandungi:

Entecavir monohydrate 0.54mg eq to Entecavir 0.5 mg

- Bahan Tidak Aktif

Lactose monohydrate
Maize starch
Pregelatinised starch
Croscarmellose sodium
Colloidal anhydrous silica
Sodium starch glycolate
Magnesium stearate
Instacoat sol white IC-S-6578

- Nombor MAL

MAL23046008ACZ

Pengilang

RV Lifesciences Limited
Plot No. H-19, MIDC Waluj,
Aurangabad (MS) 431133, India.

ENCAVID TABLETS 0.5MG

Entecavir Tablets (0.5mg)

Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Pharmacy Sdn.Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

23/06/2023

Nombor Siri

NPRA (R2) 21/039