

TRAVO EYE DROPS 0.004% w/v

Travoprost (0.004% w/v) Eye drops, solution

Apakah kandungan risalah ini?

1. Apakah kegunaan Travo Eye Drops 0.004% w/v
2. Bagaimana Travo berfungsi
3. Sebelum anda menggunakan Travo
4. Cara menggunakan Travo
5. Semasa anda menggunakannya
6. Kesan-kesan sampingan
7. Penyimpanan dan Pembuangan Travo
8. Penerangan Produk
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh semakan

Apakah kegunaan Travo Eye Drops 0.004% w/v

Travo Eye Drops 0.004% w/v digunakan untuk mengurangkan tekanan tinggi dalam mata orang dewasa. Tekanan ini boleh membawa kepada suatu penyakit yang dipanggil glaukoma.

Bagaimana Travo berfungsi

Travo mengandungi travoprost, salah satu daripada kumpulan ubat yang dipanggil analog prostaglandin.

Ia berfungsi dengan mengurangkan tekanan dalam mata. Ia mungkin digunakan sendiri atau bersama ubat titis mata yang lain, contohnya penyekat beta, yang turut mengurangkan tekanan.

Sebelum and menggunakan Travo

- Bila anda tidak boleh menggunakannya

- Jika anda alah terhadap Travo atau apa-apa bahan lain dalam ubat ini. Minta nasihat doktor anda jika anda mempunyai alahan ini.

Kehamilan dan pengeluaran susu

Jangan ambil Travo sekiranya anda hamil, cuba untuk hamil atau anda menyangka yang anda hamil.

Jangan ambil Travo sekiranya anda memberi susu badan. Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil apa-apa ubat.

- Sebelum menggunakannya Travo

Sebelum anda mengambil ubat ini, beritahu doktor anda:

- Anda akan mengambil apa-apa ubat lain yang diperoleh tanpa preskripsi.
- Anda memakai kanta lekap.

- Mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda akan mengambil atau baru-baru ini telah mengambil atau menggunakan apa-apa ubat lain.

Cara menggunakan Travo

Sentiasa gunakan ubat ini sama seperti doktor anda atau doktor yang merawat anak anda telah memberitahu anda. Anda patut memeriksa dengan doktor anda, doktor yang merawat anak anda atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

- Berapa banyak harus digunakan

Satu titisan ke dalam mata yang terjejas atau kedua-dua mata, sekali sehari pada waktu petang.

Jika titisan tidak mengenai mata, cuba lagi.

- Bila perlu digunakan

Travo patut digunakan sekali sehari, pada waktu petang.

- Berapa lama untuk menggunakannya

Hanya gunakan *Travoprost* di kedua-dua belah mata jika doktor anda beritahu untuk berbuat begitu. Gunakannya selama mana doktor anda atau doktor yang merawat anak anda memberitahu anda.

- Jika terlupa untuk menggunakannya

Teruskan dengan dos seterusnya seperti yang dirancang. Jangan gunakan dos sebanyak dua kali ganda untuk menggantikan dos yang anda terlupa itu. Jangan gunakan lebih daripada satu titisan dalam mata yang terjejas pada satu hari yang sama.

- Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)

Basuh semua ubat dengan air suam. Jangan letakkan lebih banyak titisan sehingga tiba masanya untuk dos biasa yang seterusnya.

Semasa menggunakannya Travo

- Perkara yang perlu lakukan

Perkara-perkara yang anda perlu lakukan. Sentiasa basuh tangan anda sebelum meletakkan ubat titis mata.

Apabila anda menggunakan ubat baru, ikuti arahan di bawah:

Serta-merta sebelum menggunakan sebiji botol yang baru untuk kali pertama, buka pek pembungkus, keluarkan botol (gambar 1) dan tulis tarikh pembukaan karton di ruang yang diberikan

- Basuh tangan anda
- Putar penutup

Pegang botol tersebut, menghala ke bawah, di antara ibu jari dan jari lain

- Dongakkan kepala anda atau kepala anak anda dengan perlahan ke belakang. Tarik kelopak mata dengan jari yang bersih, sehingga 'poket' terbentuk antara kelopak mata dan mata. Titisan tersebut akan dimasukkan di sini (gambar 2)

- Bawa hujung botol rapat dengan mata. Gunakan cermin jika ia membantu.
- Jangan sentuh mata atau kelopak mata, kawasan sekeliling atau permukaan lain dengan penitis. Ia boleh memberi jangkitan kepada titisan
- Picit botol dengan perlahan untuk mengeluarkan satu titisan *Travo* pada satu masa. (gambar 3)
- Selepas menggunakan *Travo*, pastikan kelopak mata ditutup, tekan dengan perlahan menggunakan jari ke dalam sudut mata, berhampiran hidung (gambar 4) selama sekurang-kurangnya 1 minit. Ini akan membantunya untuk berhenti

Travo masuk ke dalam seluruh badan

- Jika anda menggunakan titisan dalam kedua-dua belah mata, ulangi langkah-langkah tersebut untuk mata sebelah lagi
- Pasang penutup botol dengan ketat dengan serta-merta selepas menggunakannya
- Hanya gunakan sebiji botol pada suatu masa. Jangan buka pek sehingga anda perlu menggunakan botol itu.





- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Menggunakan Travo dengan ubat titis mata lain secara serta-merta. (Tunggu 5-1 minit sebelum menggunakan ubat titis mata kedua.)
- Menyentuh hujung penitis pada mata atau benda-benda lain.

- Perkara yang diberi perhatian

Travo mungkin meningkatkan kepanjangan, ketebalan, warna dan / atau bulu mata anda. Perubahan dalam kelopak mata termasuk pertumbuhan bulu yang tidak biasa atau dalam tisu di sekitar mata juga telah diperhatikan.

- Travo mungkin mengubah warna iris anda (bahagian berwarna dalam mata anda.) Perubahan ini mungkin berkekalan. Perubahan pada warna kulit di sekitar mata juga mungkin berlaku.

- Jika anda mempunyai pembedahan katarak, berbincang dengan doktor anda sebelum anda menggunakan Travo.

- Jika anda sedang atau pernah mempunyai keradangan mata, berbincang dengan doktor anda sebelum anda menggunakan Travo.

- Travo mungkin jarang menyebabkan sesak nafas atau bunyi nafas yang berdehit atau peningkatan simptom asma. Jika anda bimbang tentang perubahan dalam corak pernafasan anda ketika menggunakan Travo, minta nasihat doktor anda secepat mungkin.

- Travo mungkin diserap melalui kulit. Jika apa-apa produk ubat-ubatan terkena kulit, ia sepatutnya boleh terus dibasuh. Ini terutamanya penting bagi wanita hamil atau cuba untuk hamil.

- Jika anda memakai kanta lekap, jangan gunakan titisan tersebut dengan kanta lekap masih ada pada mata. Selepas menggunakan titisan, tunggu selama 15 minit sebelum memakai kanta lekap semula.

Kesan ke atas kemampuan untuk memandu dan menggunakan mesin:

Travo tidak mempunyai pengaruh, atau sedikit sahaja pengaruh ke atas kemampuan untuk memandu dan menggunakan mesin, namun begitu

seperti apa-apa ubat titis mata, kabur sementara atau gangguan penglihatan lain mungkin memberi kesan untuk memandu dan menggunakan mesin. Jika anda merasa kabur semasa memakai ubat, pesakit perlu menunggu hingga pandangan menjadi baik semula sebelum memandu atau menggunakan mesin.

Kehamilan, memberi susu badan dan kesuburan

Jangan gunakan Travo jika anda hamil. Jika anda menyangka yang anda mungkin hamil, terus beritahu doktor anda. Jika anda mampu hamil, anda perlu menggunakan alat pencegahan kehamilan yang mencukupi semasa anda menggunakan Travo.

Jangan gunakan Travo jika anda memberi susu badan. Travo mungkin memasuki susu badan anda. Minta nasihat doktor anda sebelum mengambil sebarang ubat.

Memandu dan menggunakan mesin

Anda mungkin mendapati penglihatan anda menjadi kabur untuk seketika selepas menggunakan Travo. Jangan memandu atau menggunakan mesin sehingga ia tiada. Travo mengandungi minyak kastor terhidrogen dan propilena glikol yang mungkin menyebabkan reaksi kulit dan kerengsaan.

Kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan memperolehnya. Selalunya anda boleh terus menggunakan titisan tersebut, melainkan kesan sampingannya serius. Jika anda bimbang, beritahu doktor atau ahli farmasi anda. Jangan berhenti mengambil Travo tanpa bercakap dengan doktor anda.

Kesan-kesan sampingan di bawah telah dilihat dengan pengambilan Travo.

Kesan sampingan yang sangat biasa: mungkin memberi kesan pada mata: kemerahan mata.

Kesan sampingan biasa: mungkin memberi kesan pada mata: perubahan warna iris (bahagian berwarna pada mata), sakit mata, ketidakselesaan pada mata, mata yang kering, kegalatan pada mata, kerengsaan mata.

Kesan sampingan yang tidak biasa: mungkin memberi kesan pada mata: gangguan kornea, keradangan mata,

keradangan iris, keradangan dalam mata, keradangan permukaan mata dengan / atau kerosakan pada permukaan, sensitiviti terhadap cahaya, cecair keluar daripada mata, keradangan kelopak mata, kemerahan kelopak mata, bengkak di sekitar mata, kegalatan pada kelopak mata, penglihatan yang berkurangan, peningkatan penghasilan air mata, jangkitan atau keradangan konjunktiva (konjunktivitis), kelopak mata bawah yang terkeluar secara tidak normal, pandangan yang kelam, kelopak mata berkerak, pertumbuhan bulu mata, kepudaran warna bulu mata, mata yang letih.

Kesan sampingan biasa: peningkatan simptom alahan, sakit kepala, pening kepala, degupan jantung yang tidak biasa, nafas yang singkat, asma, hidung tersumbat, kerengsaan tekak, penggelapan kulit di sekitar mata, penggelapan kulit, tekstur bulu yang tidak normal, pertumbuhan bulu yang berlebihan.

Jarang: mungkin memberi kesan pada mata: persepsi cahaya yang memantul, ekzema pada kelopak mata, bengkak mata, pandangan halo, pengurangan deria mata, keradangan kelenjar pada kelopak mata, pigmentasi dalam mata, peningkatan saiz anak mata, perubahan dalam tekstur bulu mata.

Kesan sampingan biasa: jangkitan virus mata, rasa yang teruk, degupan jantung yang tidak biasa atau berkurang, tekanan darah meningkat atau berkurang, batuk, perubahan suara, ketidakselesaan gastrousus atau ulser, sembelit, mulut yang kering, kemerahan atau kegalatan pada kulit, ruam, perubahan warna rambut, kehilangan bulu mata, kelemahan biasa.

Tidak diketahui: frekuensi tidak dapat dijangka daripada data tersedia

Kesan pada mata: keradangan kebanyakan belakang mata, mata kelihatan lebih tersisip.

Kesan sampingan biasa: tekanan, keresahan, deria pergerakan yang salah, bunyi berdesing dalam telinga, sakit dada, asma yang semakin teruk, cirit-birit, sakit abdomen, mual, kegalatan, pertumbuhan rambut yang tidak normal, sakit sendi, pembuangan air kecil yang sakit atau tak terkawal, peningkatan penanda kanser prostat.

Dalam kanak-kanak dan remaja, kesan sampingan yang paling biasa dilihat

dengan Travo adalah kemerahan mata dan pertumbuhan bulu mata. Kedua-dua kesan sampingan ini telah diperhatikan dengan lebih banyak insiden dalam kanak-kanak dan

- Remaja berbanding dewasa.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Penyimpanan dan pelupusan Travo

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Jauhkan daripada kanak-kanak.

Buang 28 hari selepas hari pertama membukanya.

Jangan gunakan Travo selepas tarikh akhir yang dinyatakan di atas botol dan kotak selepas 'Exp'.

Tarikh akhir merujuk kepada hari terakhir pada bulan tersebut.

Ubat ini tidak memerlukan sebarang keadaan penyimpanan yang tertentu.

- Pelupusan

- Anda perlu membuang botol 4 minggu selepas kali pertama membukanya, untuk mengelakkan jangkitan, dan menggunakan botol baru. Tulis tarikh ketika anda membukanya dalam ruang di atas kotak karton.

- Jangan buang ubat ini melalui air buangan atau buangan di rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat yang anda tidak gunakan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu untuk memelihara persekitaran.

Penerangan Produk

- Rupa dan warna produk

- Larutan yang jernih, tidak berwarna hingga kuning cair yang boleh dikatakan bebas daripada partikel.
- Setiap botol mengandungi 2.5 ml ubat ini.
- Ubat Titis Mata Travo tersedia dalam pek 1 botol.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Travoprost USP 0.004%w/v

-Bahan-bahan tidak aktif

Polyoxyethylene hydrogenated castor oil
40, Trometamol, Disodium edentate,
Boric acid, Mannitol, Sodium hydroxide,
Hydrochloric acid, Benzalkonium
chloride, Water for injection

- Nombor MAL):

MAL17035029AZ

Pengilang

MICRO LABS LIMITED

No.113-116, 4th Phase

K.I.A.D.B,

Bommasandra Industrial Area,

Bangalore -560 099. INDIA

Pemegang Pendaftaran Produk

GOPHARMA SDN. BHD

No. 13, Jalan Rajawali 2,

Bandar Puchong Jaya,

47100 Puchong, Selangor

Tarikh kemaskini RiMUP:

01.04.2022

Nombor Siri

NPRA(R2/1)220328/860.