

CARVIDON -MR

Trimetazidine Dihydrochloride Modified Release Tablets (35mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Carvidon-MR*
2. Bagaimana *Carvidon-MR* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Carvidon-MR*
4. Cara menggunakan *Carvidon-MR*
5. Semasa menggunakan *Carvidon-MR*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Carvidon-MR*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Carvidon-MR*

Ubat ini bertujuan untuk digunakan berkombinasi dengan ubat lain untuk merawat angina pectoris (sakit dada yang disebabkan oleh penyakit jantung).

Bagaimana *Carvidon-MR* berfungsi

Trimetazidine bertindak dengan menghalang pemecahan asid lemak demi meningkatkan pengoksidaan glukosa. Tenaga yang diperoleh semasa pengoksidaan glukosa menggunakan oksigen yang lebih kurang, dengan ini dapat mengoptimumkan fungsi penghasilan tenaga jantung dan seterusnya melindungi tisu otot jantung yang rentan daripada kerosakan selanjutnya yang diakibatkan kekurangan oksigen.

Sebelum menggunakan *Carvidon-MR*

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil *Carvidon-MR*

- Sekiranya anda alah kepada Trimetazidine atau sebarang ramuan ubat lain.
- Jika anda mempunyai penyakit Parkinson: penyakit otak yang mempengaruhi pergerakan (mengeletar, postur tegar, pergerakan perlahan, berjalan mengheret kaki, dan berjalan tidak seimbang.
- Jika anda mempunyai masalah buah pinggang yang teruk.

-*Kehamilan dan penyusuan*

Keselamatan penggunaan *Carvidon-MR* pada ibu hamil dan penyusuan belum dibuktikan.

Sebagai langkah berjaga-jaga, *Carvidon-MR* tidak boleh diambil semasa mengandung atau menyusu.

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, fikir anda mengandung atau merancang untuk hamil

- Sebelum menggunakan *Carvidon-MR*

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil *Carvidon-MR*

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda mesti memaklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil, atau baru-baru mengambil sebarang ubat lain, walaupun ia adalah ubat yang boleh dibeli tanpa preskripsi.

Cara menggunakan *Carvidon-MR*

- Berapa banyak harus digunakan

- Sentiasa ambil ubat ini seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.
- Dos *Carvidon-MR* yang disyorkan adalah satu tablet diambil dua kali sehari semasa makanan waktu pagi dan petang.
- Sekiranya anda mengalami masalah buah pinggang atau jika anda berusia lebih dari 75 tahun, doktor anda boleh menyesuaikan dos yang disyorkan.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Satu tablet yang akan diambil dua kali sehari semasa makan pada waktu pagi dan petang.
- Tablet perlu diambil dengan segelas air semasa makan

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil *Carvidon-MR* selama doktor mengesyorkan.

- Jika terlupa menggunakan

Teruskan rawatan semula. Jangan menggandakan dos pada hari selepas anda terlepas dos

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda

Semasa menggunakan *Carvidon-MR*

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda tepat seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda. Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi merawat anda bahawa anda mengambil *Carvidon-MR*.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali jika dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan *Carvidon-MR* kepada sesiapa sahaja, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin
Ubat ini mungkin membuatkan anda berasa pening dan mengantuk yang boleh menjejaskan keupayaan anda memandu atau menggunakan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, *Carvidon-MR* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Biasa: Pening, sakit kepala, sakit perut, cirit-birit, senak, rasa sakit, muntah, ruam, gatal-gatal, kegatalan yang amat (hives) dan rasa kelemahan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI*)”

Cara penyimpanan dan pelupusan

Carvidon-MR

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak..

Simpan di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat-ubatan tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Berwarna merah jambu bulat, biconvex, tablet bersalut filem, tidak bertanda pada kedua-dua muka

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Trimetazidine Dihydrochloride

- Bahan tidak aktif
Microcrystalline Cellulose,
Polyethylene Oxide, Hypromellose,
ethyl cellulose 20 cps, titanium
dioxide, ferric oxide red, isopropyl
alcohol and methylene chloride,
Purified water.

- Nombor MAL

MAL *****

Pengilang:

MICRO LABS LIMITED
92, SIPCOT, Hosur
Tamil Nadu - 635 126, INDIA

Pemegang Pendaftaran Produk:

Go Pharma Sdn Bhd
No 13 Jalan Rajawali 2
Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong Selangor

Tarikh Kemaskini RiMUP:

28th June, 2017