

JANIPRO GUTRIL-S POWDER

Glucosamine Sulphate Sodium Chloride 1884mg (Equivalent to Glucosamine Sulphate 1500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Gutril-S
2. Bagaimana Gutril-S berfungsi
3. Sebelum menggunakan Gutril-S
4. Cara menggunakan Gutril-S
5. Semasa menggunakan Gutril-S
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Gutril-S
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Gutril-S

Ia digunakan sebagai adjuvan terapi untuk osteoarthritis.

Bagaimana Gutril-S berfungsi

Ia mengandungi glucosamine yang boleh merangsang pengeluaran sebatian bangunan rawan, memulihkan sel-sel yang rosak pada tisu tulang rawan dan keupayaan anti-radang.

Sebelum menggunakan Gutril-S

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan ambil jika anda alah terhadap *glucosamine sulphate* atau makanan laut.
- Jika anda mengambil Warfarin (atau antikoagulan kumarin lain).
- Jika anda mengambil tetrasiklin oral, jangan ambil Glucosamine pada masa yang sama.
- Jika anda mengandungi atau menyusu.
- Jika anda mempunyai masalah buah pinggan atau hati.

- Sebelum menggunakan

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda menghidap atau pernah menghidap asma, diabetes, kolesterol tinggi, tekana darah tinggi, strok, masalah jantung atau diet natrium terkawal kerana doktor/ ahli farmasi anda mungkin perlu memantau anda dengan lebih kerap.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil.

Cara menggunakan Gutril-S

- Berapa banyak harus digunakan

1 sachet setiap hari. Larutkan serbuk dalam segelas air (250ml) dan minum.

Glucosamine tidak digunakan untuk rawatan gejala akut yang menyakitkan. Kelegaian simptom (terutamanya melegakan kesakitan) mungkin tidak dapat dialami sehingga menerima rawatan sepanjang beberapa minggu atau kadangkala lebih

lama. Jika symptom anda tidak bertambah baik selepas 2- 3 bulan, anda haru berbincang dengan doctor atau ahli farmasi anda kerana anda mungkin perlu mempertimbangkan rawatan lain.

- Bila perlu digunakan

Sila ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat dan teruskan mengambilnya seperti biasa. Jika hampir tiba masa untuk dos yang seterusnya, langkau dos yang terlepas dan ambil dos seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tanda dan gejala terlebih dos yang tidak sengaja mungkin termasuk sakit kepala, pening, kekeliruan, arthralgia, loya, muntah, cirit- birit atau sembelit. Sekiranya berlebihan, rawatan dengan *glucosamine* harus dihentikan.

Semasa menggunakan Gutril-S

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang semua ubat yang anda sedang ambil.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Tanya pengamal perubatan kesihatan anda apa- apa soalan yang anda mungkin ada tentang bagaimana untuk menggunakan Gutril-S.

Kesan- kesan sampingan

Kardiovaskular: *Peripheral oedema, tachycardia* telah dilaporkan pada beberapa pesakit osteoarthritis yang berikut kajian klinikal yang lebih besar melalui pengambilan secara oral. Hubungan antara sebab dan akibat belum ditubuhkan.
Central Sistem Saraf: Rasa mengantuk, sakit kepala, insomnia telah diperhatikan jarang berlaku semasa terapi (kurang daripada 1%).

Gastrosusus: Loya, muntah, cirit-birit, dispepsia atau sakit epigastrik, sembelit, pedih hulu hati dan anoreksia telah

diterangkan jarang semasa terapi oral dengan glucosamine.

Kulit: Tindak balas kulit seperti eritema dan pruritus telah dilaporkan dengan pemberian terapeutik glucosamine.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Gutril-S

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Jauhkan daripada capaian kanak- kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Serbuk kristal putih atau hampir putih diisi dalam sachet aluminium. Larutannya jernih dan tidak berwarna dengan rasa masin selepas serbuk dilarutkan dalam air.

- Bahan- bahan Kandungan

- Bahan Aktif
Glucosamine Sulphate Sodium Chloride

- Bahan Tidak Aktif
Tiada

- MAL number:

MAL23076020XC

Pengilang

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor, 81200
Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Janipro (M) Sdn Bhd
No. 42, Jalan Seksyen 1/21, Taman Kajang
Utama, 43000 Hulu Langat, Selangor.

Tarikh kemaskini RiMUP

20.11.2024

Nombor Siri

NPRA(R2) 22/192