

JANIPRO DOUBAXIL POWDER

Glucosamine Sulphate 1500mg, Chondroitin Sulphate Sodium 1200mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Janipro Doubaxil Powder
2. Bagaimana Janipro Doubaxil Powder berfungsi
3. Sebelum menggunakan Janipro Doubaxil Powder
4. Cara menggunakan Janipro Doubaxil Powder
5. Semasa menggunakan Janipro Doubaxil Powder
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Janipro Doubaxil Powder
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Janipro Doubaxil Powder

Ia digunakan sebagai adjuvan terapi untuk osteoarthritis.

Bagaimana Janipro Doubaxil Powder berfungsi

Ia mengandungi *glucosamine* yang boleh merangsang pengeluaran sebatian bangunan cartilage, memulihkan sel-sel yang rosak pada tisu tulang rawan dan beberapa kebolehan anti-radang. Ia juga mengandungi *chondroitin* yang diperlukan bagi pembuatan sebatian bangunan cartilage dan membantu untuk menjaga tulang rawan yang sihat dengan menyerap dan mengekalkan air di dalam sendi.

Sebelum menggunakan Janipro Doubaxil Powder

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda mempunyai alahan terhadap *glucosamine sulphate* atau *chondroitin* atau makanan laut.
- Jika anda mengambil Warfarin (atau *coumarin anticoagulants* lain)
- Jika anda mengambil *tetracycline* secara oral, jangan ambil *glucosamine* pada masa yang sama.
- Jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati.

- Sebelum menggunakan

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda menghidap atau pernah menghidap asma, diabetes, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, strok, masalah jantung atau diet natrium

terkawal kerana doktor/ahli farmasi anda mungkin perlu memantau anda dengan lebih kerap.

Elakkan kombinasi dengan chitosan kerana ia boleh membentuk kompleks dengan *chondroitin sulfate*, dengan itu mengurangkan penyerapan.

Mengandung dan menyusukan anak

Bukti yang sedia ada adalah tidak konklusif atau tidak mencukupi untuk kegunaan oleh ibu mengandung atau menyusui. Produk ini hanya boleh digunakan di bawah pengawasan perubatan untuk wanita mengandung dan ibu yang menyusukan anak sehingga lebih banyak maklumat disediakan jika faedah kepada ibu melebihi risikonya kepada fetus dapat dijelaskan.

Pengambilan dalam tempoh 3 bulan pertama kehamilan mesti dielakkan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil, termasuk mana-mana yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Janipro Doubaxil Powder

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Satu sachet untuk diambil sekali sehari. Keseluruhan kandungan satu sachet hendaklah dilarutkan sepenuhnya dalam sekurang-kurangnya 250 ml air (satu gelas) dan diminum dengan segera. Sebaiknya diambil sebelum makan sekurang-kurangnya 8-12 minggu atau lebih, mengikut preskripsi perubatan.

- Bila perlu digunakan

Sila ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan

ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika dos berlebihan telah digunakan.

Semasa menggunakan Janipro Doubaxil Powder

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Janipro Doubaxil Powder.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil Janipro Doubaxil Powder.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Tanya pengamal perubatan kesihatan anda apa-apa soalan yang anda mungkin ada tentang bagaimana untuk menggunakan Janipro Doubaxil Powder.

Kesan- kesan sampingan

Kardiovaskular: *Peripheral oedema*, *tachycardia* telah dilaporkan pada beberapa pesakit osteoarthritis selepas kajian klinikal yang lebih besar yang menyiasat pengambilan secara oral dalam osteoarthritis. Hubungan sebab-akibat belum dapat ditentukan.

Sistem Saraf Utama: Rasa mengantuk, sakit kepala, insomnia telah diperhatikan jarang berlaku semasa terapi (kurang daripada 1%).

Gastrosus: Loya, muntah, cirit-birit, dispepsia atau sakit epigastrik, sembelit, pedih hulu hati dan anoreksia jarang berlaku semasa terapi oral dengan *glucosamine*.

Kulit: Tindak balas kulit seperti eritema dan pruritus telah dilaporkan dengan pemberian terapeutik *glucosamine*.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers

JANIPRO DOUBAXIL POWDER

Glucosamine Sulphate 1500mg, Chondroitin Sulphate Sodium 1200mg

Ubat Kebangsaan melalui laman web
npra.gov.my [Consumers → Reporting
Side Effects to Medicines (ConSERF) or
Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Doubaxil Powder

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi
daripada cahaya dan kelembapan.
Jauhkan daripada capaian kanak-
kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan
melalui air buangan atau sisa isi
rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi
anda mengenai cara yang betul untuk
melupuskan ubat yang tidak
diperlukan lagi. Langkah-langkah ini
dapat membantu melindungi alam
sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Serbuk kristal putih atau hampir putih
diisi dalam sachet aluminium.
Larutannya jernih dan tidak berwarna
dengan rasa masin selepas serbuk
dilarutkan dalam air.

- Bahan- bahan Kandungan

- Bahan Aktif
*Glucosamine Sulphate, Chondroitin
Sulphate Sodium*

- MAL number:

MALXXXXX

Pengilang

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru,
Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Janipro (M) Sdn Bhd
No. 42, Jalan Seksyen 1/21,
Taman Kajang Utama,
43000 Kajang, Selangor.

Tarikh kemaskini RiMUP

04.02.2025

Nombor Siri

NPRA(R2)24/180