

AVEXA AVENEZ SYRUP 0.5MG/ML

Desloratadine (0.5mg/ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan AVENEZ SYRUP
2. Bagaimana AVENEZ SYRUP berfungsi
3. Sebelum mengambil AVENEZ SYRUP
4. Cara mengambil AVENEZ SYRUP
5. Semasa mengambil AVENEZ SYRUP
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan AVENEZ SYRUP
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan AVENEZ SYRUP

AVENEZ SYRUP melegakan simptom rinitis alergi (radang salur hidung yang disebabkan oleh alergi [alahan], misalnya, demam alergi atau alergi terhadap tungau habuk). Antara simptom ini ialah bersin, hidung berhingus atau terasa gatal, lelangit mulut terasa gatal, dan mata yang gatal, merah-merah atau berair.

AVENEZ SYRUP juga digunakan untuk melegakan simptom urtikaria (masalah kulit yang disebabkan oleh alergi). Antara simptomnya ialah gatal-gatal dan gegata.

Bagaimana AVENEZ SYRUP berfungsi

AVENEZ SYRUP ialah sejenis ubat anti-alergi yang tidak membuatkan anda mengantuk. Ubat ini dapat mengawal tindak balas alergi dan simptomnya.

Sebelum mengambil AVENEZ SYRUP

- *Bila tidak boleh mengambil*
Jangan mengambil AVENEZ SYRUP jika anda (hipersensitif) terhadap *desloratadine*, *loratadine*, atau mana-mana bahan lain di dalam AVENEZ SYRUP.

AVENEZ SYRUP boleh digunakan oleh kanak-kanak yang berusia antara 1 hingga 11 tahun, remaja (12 tahun ke atas), dan orang dewasa, termasuklah warga emas.

- *Sebelum mula mengambil AVENEZ SYRUP*

Bincanglah dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil AVENEZ SYRUP jika anda atau keluarga pernah mengalami sawan.

Kehamilan dan menyusukan anak dengan susu badan

Mintalah nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil apa-apa ubat semasa anda hamil dan semasa anda sedang menyusukan anak dengan susu badan.

Jika anda hamil atau sedang menyusukan anak dengan susu badan, AVENEZ SYRUP tidak disyorkan.

Maklumat penting tentang beberapa bahan kandungan di dalam AVENEZ SYRUP

AVENEZ SYRUP mengandungi sorbitol. Jika doktor memberitahu anda bahawa anda tidak dapat menahan sesetengah jenis gula, hubungilah doktor sebelum anda mula menggunakan produk perubatan ini.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Tidak ada saling tindak balas yang diketahui berlaku antara AVENEZ SYRUP dengan ubat-ubat lain.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang, baru-baru ini telah mengambil ubat lain atau akan mengambil ubat lain.

Cara mengambil AVENEZ SYRUP

- *Berapa banyak harus diambil*

Kanak-kanak antara usia 1 hingga 5 tahun:

2.5 ml ($\frac{1}{2}$ sudu 5 ml) sekali sehari.

Kanak-kanak antara usia 6 hingga 11 tahun:

5 ml (satu sudu 5 ml) sekali sehari.

Orang dewasa dan remaja (12 tahun ke atas):

10 ml (dua sudu 5 ml) sekali sehari.

- *Bila perlu diambil*

Anda boleh mengambil ubat ini sebelum ataupun selepas makan.

- *Berapa lama perlu diambil*

Doktor anda akan menentukan jenis rinitis alergi yang anda hidapi dan

kemudiannya menentukan tempoh anda harus mengambil AVENEZ SYRUP.

Jika rinitis alergi anda itu jenis bermusim (mengalami simptom kurang daripada 4 hari seminggu ataupun kurang daripada 4 minggu keseluruhannya), doktor anda akan mengesyorkan jadual rawatan yang bergantung pada penilaian sejarah penyakit anda.

Jika rinitis alergi anda itu jenis berlarutan (mengalami simptom melebihi 4 hari seminggu dan melebihi 4 minggu keseluruhannya), doktor anda mungkin mengesyorkan tempoh rawatan yang lebih panjang.

Bagi urtikaria, tempoh rawatan mungkin berbeza bagi setiap pesakit dan oleh itu, anda harus ikuti arahan doktor anda.

- *Jika terlupa mengambil*

Jika anda terlupa mengambil ubat pada waktu yang sepatutnya, ambil secepat mungkin, kemudian teruskan dengan jadual waktu dos anda yang biasa.

Jangan gandakan dos untuk menggantikan dos yang terlupa diambil itu.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Ambil AVENEZ SYRUP mengikut dos yang tepat seperti yang diarahkan. Masalah serius tidak dijangka akan berlaku jika dos yang terlebih telah diambil. Walau bagaimanapun, jika anda terambil lebih banyak AVENEZ SYRUP daripada yang diarahkan, hubungilah doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa mengambil AVENEZ SYRUP

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor anda.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa mengambil ubat ini.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

AVEXA AVENEZ SYRUP 0.5MG/ML

Desloratadine (0.5mg/ml)

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi AVENEZ SYRUP dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Memandu dan menggunakan jentera
Pada dos yang disyorkan, AVENEZ SYRUP tidak dijangka akan membuatkan anda mengantuk atau kurang berwaspada. Walau bagaimanapun, sesetengah orang berasa mengantuk dan ini boleh menjejaskan kemampuan mereka memandu atau mengendalikan jentera. Namun begitu, ini jarang-jarang sekali berlaku.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, AVENEZ SYRUP boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya.

Kesan sampingan yang lazim berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang belum mencapai usia 2 tahun ialah cirit-birit, demam dan insomnia. Bagi orang dewasa, rasa lesu, mulut kering dan sakit kepala lebih kerap dilaporkan berlaku.

Kes berlakunya tindak balas AVENEZ alergi yang teruk (sesak nafas, nafas berdehit, gatal-gatal, gegata dan bengkak) dan ruam, palpitasi (debaran jantung yang cepat dan tidak teratur), degupan jantung yang kencang, sawan, keresahan berserta pergerakan badan yang bertambah banyak, mengantuk, radang hati, hasil ujian fungsi hati yang abnormal dan selera makan bertambah pernah tetapi sangat jarang-jarang dilaporkan.

Sekiranya ada kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda melihat kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan AVENEZ SYRUP

- Penyimpanan

Simpan di dalam bungkusannya yang asal bawah suhu 30°C.

Sebaik sahaja botol dibuka, produk boleh digunakan selama 90 hari.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

AVENEZ SYRUP ialah cecair jernih, likat yang berwarna oren.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Desloratadine 0.5mg/ml.

- Bahan tidak aktif:

Sorbitol (E420), Sucrose, Disodium Phosphate Dodecahydrate, Sodium Benzoate (E211), Disodium Edetate, Propylene Glycol, Citric Acid Monohydrate, Sunset Yellow FCF (E110) dan Purified Water.

- Nombor MAL:

MAL*****

Pengilang

Farmak Joint Stock Company
Kyrylivska Street 74,
Kyiv, 04080 Ukraine.

Pemegang Pendaftaran Produk

Abio Marketing Sdn Bhd
No. 2, Jalan SS 13/5,
47500 Subang Jaya, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

13/05/2024

Nombor Siri

NPRA (R2) 23/161