

REMECO PEPTICON LIQUID ORAL SUSPENSION

Sodium Alginate, Sodium Bicarbonate, Calcium Carbonate (500mg/10ml, 267mg/10ml, 160mg/10ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pepticon Liquid Oral Suspension
2. Bagaimana Pepticon Liquid Oral Suspension berfungsi
3. Sebelum mengambil Pepticon Liquid Oral Suspension
4. Cara mengambil Pepticon Liquid Oral Suspension
5. Semasa mengambil Pepticon Liquid Oral Suspension
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Pepticon Liquid Oral Suspension
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Pepticon Liquid Oral Suspension

Rawatan untuk gejala refluks gastroesophageal seperti muntah asid, pedih ulu hati dan senak.

Bagaimana Pepticon Liquid Oral Suspension berfungsi

Pepticon Liquid Oral Suspension melegakan kesakitan dan ketidakselesaan pedih ulu hati dan senak acid dengan membentuk satu halangan pelindung atas kandungan peruk untuk mengelakkan asid perut meresap ke dalam saluran makanan di mana ia menyakitkan.

Sebelum mengambil Pepticon Liquid Oral Suspension

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil ubat ini jika anda mempunyai alahan terhadap mana-mana bahan termasuk bahan tidak aktif (parabens).

Mengandung dan menyusukan anak: Tidak terdapat penanda kesan buruk daripada produk ini semasa kehamilan atau kepada kesihatan fetus / kanak-kanak yang baru lahir.

- Sebelum mula mengambil Pepticon Liquid Oral Suspension

Beritahu doktor jika anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat-ubatan atau jika anda mempunyai sebarang masalah kesihatan lain.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara mengambil Pepticon Liquid Oral Suspension

- Berapa banyak harus diambil

Untuk kegunaan oral. Goncang dengan baik sebelum digunakan.

Dewasa & kanak-kanak lebih daripada 12 tahun: Ambil 10–20ml (Dua hingga empat sudu 5ml) selepas makan dan sebelum tidur, sehingga empat kali sehari.

Kanak-kanak kurang daripada 12 tahun: Tidak boleh diberikan melainkan disyorkan oleh doctor anda.

- Bila perlu diambil

Selepas makan dan sebelum tidur.

- Berapa lama perlu diambil

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa mengambil Pepticon Liquid Oral Suspension

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doctor atau ahli farmasi.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doctor atau ahli farmasi.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Setiap 10ml dos mengandungi 125.5mg sodium dan 78mg potassium. Ini perlu diambil kira apabila diet garam disyorkan.

Setiap 10ml mengandungi 200 mg (2.0 mmol) kalsium karbonat. Penjagaan perlu diambil dalam merawat pesakit dengan hiperkalsemia, nefrocalcinosis dan calculi ginjal yang mengandungi kalsium secara berulang.

Produk ini mengandungi Methyl hydroxybenzoate dan Propyl hydroxybenzoate, yang boleh menyebabkan reaksi alergi (mungkin ditanggihkan).

Kesan-kesan Sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Pepticon Liquid Oral Suspension boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jika anda mengalami salah satu daripada yang berikut, hentikan penggunaan produk ini dan maklumkan kepada doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat:

- Ruam kulit, gatal-gatal
- Kesukaran bernafas
- Pening
- Bengkak muka, bibir, lidah atau tekak

Semua kesan sampingan yang sangat serius ini sangat jarang berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

REMECO PEPTICON LIQUID ORAL SUSPENSION

Sodium Alginate, Sodium Bicarbonate, Calcium Carbonate (500mg/10ml, 267mg/10ml, 160mg/10ml)

Cara Penyimpanan dan Pelupusan

Dutavor

- Penyimpanan

Simpan bawah 30°C. Jangan simpan di dalam peti sejuk atau jangan bekukan. Periksa sama ada penutup penutup tidak pecah sebelum mengambil produk ini.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Pepticon Liquid Oral Suspension adalah suspensi legap, likat dan berwarna putih krim dengan bau pudina.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Sodium alginate, sodium bicarbonate, calcium bicarbonate

- Bahan tidak aktif:

Carbomer 974P, sodium hydroxide, sodium saccharin, peppermint oil, methyl paraben, propyl paraben, purified water

- Nombor MAL:

MAL25036032XC

Pengilang

Vefa İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Beylikdüzü OSB Mah. 2. Cadde No: 3/2
Beylikdüzü/ISTANBUL/TURKEY.

Pemegang Pendaftaran Produk

Abio Marketing Sdn Bhd
No. 2, Jalan SS 13/5,
47500 Subang Jaya, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

15 May 2025

Nombor Siri

NPRA (R2) 24/149