

AVOTYNE 10MG TABLET

Loratadine 10mg



Sila baca isi kandungan risalah maklumat ini sebelum mengambil ubat.

'Avotyne 10mg Tablet' dirujuk sebagai hanya 'Avotyne' di dalam risalah ini.

Apa yang ada pada risalah ini:

- Apa kegunaan Avotyne
- Bagaimana Avotyne berfungsi
- Sebelum mengambil Avotyne
- Cara mengguna Avotyne
- Semasa mengguna Avotyne
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan & pelupusan Avotyne
- Maklumat lanjut
- Pengilang
- Pemegang pendaftaran produk
- Tarikh kemaskini RiMUP
- Nombor Siri

Apakah kegunaan Avotyne:

Nama ubat anda ialah Avotyne 10 mg Tablet (dipanggil „Avotyne“ dalam risalah ini). Avotyne mengandungi ubat yang dikenali sebagai loratadine.

Avotyne digunakan untuk rawatan simptomatik bagi *radangan alergik ke atas saluran pernafasan, kegatalan kulit yang berpanjangan* dan lain-lain masalah alahan kulit.

Bagaimana Avotyne berfungsi:

AVOTYNE ialah ubat yang tergolong di dalam kumpulan ubat yang dipanggil *tricyclic anti-histamine* dengan aktiviti penghalang yang spesifik ke atas *peripheral H1-receptor*. Ia merupakan anti-histamine dengan kesan jangka panjang, tetapi tiada kesan sedatif atau ciri-ciri *anti-cholinergic*.

Sebelum mengambil Avotyne:**Bila tidak boleh mengambil.**

Jangan ambil ubat ini dan maklum kepada doktor anda jika:

- Anda alah kepada loratadine atau kandungannya (seperti tersenarai di seksyen 6 di bawah)
- Anda mengandung atau menyusukan anak.
- Anda di bawah umur 6 tahun
- Anda mengalami masalah hati
- Anda ada alahan kepada laktos, kerana produk ini mengandungi laktosa
- Anda mengendalikan mesin berat dan akan memandu

Sebelum mula mengambil.

Periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini:

- Jika anda mengandung atau merancang untuk mengandung.
- Anda menyusukan anak. Anda patut memilih untuk tidak mengambil AVOTYNE atau menyusu anak dengan botol.
- Anda mengambil alkohol dengan banyak.
- Anda ada masalah hati

Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklum kepada doktor anda semua ubat yang anda sedang ambil, termasuk ubat preskripsi dan bukan preskripsi, vitamin dan ubat herba.

Peningkatan kepada tindakan produk ini boleh terjadi dengan produk „*inhibitors*“ seperti CYP3A4 atau CYP2D6 yang menyebabkan

peningkatan kepada tahap loratadine. Ini memberi kepada peningkatan kesan-kesan sampingan.

Cara menggunakan Avotyne:**Berapa banyak harus digunakan:**

Dewasa dan kanak-kanak di atas 12 tahun: 10mg sekali dalam sehari (satu tablet sekali dalam sehari).

Kanak-kanak antara 2 hingga 12 tahun diberi dos mengikut berat badan:

Berat badan lebih 30kg: 10mg sekali sehari (satu biji tablet sekali dalam sehari).

Berat badan kurang 30kg: 5mg sekali sehari (setengah biji tablet sekali dalam sehari).

Dos di atas boleh dikurangkan atau ditingkatkan oleh doktor anda, jika perlu.

Oleh itu, sentiasa ambil AVOTYNE seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Bila perlu digunakan:

AVOTYNE boleh diambil bersama atau tanpa makanan.

Berapa lama perlu digunakan:

Jangka masa pengambilan AVOTYNE bergantung kepada doktor anda untuk menentukan.

Jika terlupa menggunakan.

Jika anda tertinggal satu dos, ambil dos tersebut sebaik sahaja anda ingat. Jika dos seterusnya adalah dekat, jangan ambil dos yang tertinggal. Anda hanya perlu teruskan ambil dos seperti biasa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos).

Jika anda ambil terlalu banyak AVOTYNE, hubungi doktor atau Pusat Kawalan Racun, atau pergi ke hospital (unit kecemasan) yang terdekat, dengan segera.

Semasa menggunakan Avotyne:**Perkara yang perlu dilakukan.**

- Telan tablet sepenuhnya dengan satu gelas air.
- Ambil dos anda pada masa yang sama setiap hari.
- Jangan ambil 2 dos dalam sehari kecuali atas arahan doktor anda.
- Teruskan mengambil Avotyne sehingga rawatan anda tamat, walaupun anda merasa seperti sudah sembuh.

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda jika anda ada soalan lanjut berkaitan perkara ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan.

Jangan berhenti mengambil ubat anda tanpa rundingan dengan doktor anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian.

- Dos mungkin dikurangkan sekiranya anda mengalami masalah hati. Anda mungkin perlu menjalani ujian darah yang lebih kerap untuk memantau keadaan hati anda sekiranya anda mengalami masalah hati.
- Bagi ibu mengandung atau sedang menyusu: dapatkan nasihat dari doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mengandung, menyusukan anak, atau akan mengandung dan akan menyusukan anak semasa mengambil ubat ini.
- Maklum kepada doktor anda jika anda mengalami alahan kepada laktos kerana produk

ini mengandungi laktosa.

- Walaupun tiada laporan atas gangguan kepada kebolehan memandu, elakkan memandu semasa mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan:

Kesan sampingan yang kerap dilaporkan adalah mengantuk, pening kepala, pertambahan selera, gementar, keletihan dan sukar tidur. Lain-lain kesan sampingan yang jarang dilaporkan adalah:

- Tindakbalas alahan yang serius (anafilaksis)
- Mabuk
- Peningkatan kepada denyutan jantung dan denyutan yang tidak normal
- Loya
- Mulut kering
- Radangan selaput dalam perut (gastritis)
- Fungi hati yang tidak normal
- Ruam kulit
- Keguguran rambut
- Keletihan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara Penyimpanan & Pelupusan Avotyne:**Penyimpanan:**

- Jauhi dari kanak-kanak dan penglihatan mereka.
- Jangan guna Avotyne selepas tamat tarikh luputnya. Tarikh luput merujuk kepada tarikh akhir untuk bulan tersebut.
- Simpan di dalam pek asal, di tempat yang kering dan bawah 30°C.
- Jangan guna Avotyne yang sumpik atau pecah atau ada tanda-tanda kerosakan.

Pelupusan:

Ubat-ubatan tidak boleh dibuang dalam tong sampah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat yang sudah tidak diperlukan lagi. Tindakan ini juga boleh menjaga persekitaran dari tercemar.

Maklumat lanjut:**Rupa dan warna produk:**

Tablet dengan selaput berwarna putih, bentuk lonjong, dengan tanda "CCP" di satu bahagian dan satu garisan di sebelah yang lain.

Bahan-bahan kandungan AVOTYNE

Bahan aktif: loratadine

Bahan eksipien: Laktosa, *base granule* dan magnesium stearate.

Nombor MAL: MAL13115129ACZ

Pengilang:

China Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd., No. 182-1, Keng Tze Kou, Hsinfong Shiang, Hsinchu County 304, Taiwan R.O.C.

Pemegang Pendaftaran Produk

Abio Marketing Sdn Bhd, No. 2, Jalan SS 13/5, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP: 08/11/2022

Nombor Siri: NPRA(R2/1)221107/970