

AVOGRA 100MG TABLET

Sildenafil citrate 140.5mg, bersamaan dengan Sildenafil 100mg



Apa yang ada pada risalah ini:

- Apa kegunaan Avogra
- Bagaimana Avogra berfungsi
- Sebelum mengambil Avogra
- Cara mengguna Avogra
- Semasa mengguna Avogra
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan & pelupusan Avogra
- Maklumat lanjut
- Pengilang
- Pemegang pendaftaran produk
- Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Avogra:

Nama ubat anda ialah Avogra 100 mg Tablet (dipanggil 'Avogra' dalam risalah ini).

Avogra adalah rawatan untuk lelaki yang mengalami disfungsi erektile, kadang kala dikenali sebagai mati pucuk. Ini adalah apabila seorang lelaki tidak boleh mengalami, atau mengekalkan zakar keras dan tegang yang sesuai untuk aktiviti seksual.

Anda tidak boleh mengambil Avogra sekiranya anda tidak mengalami disfungsi erektile. Anda tidak boleh mengambil Avogra sekiranya anda seorang wanita.

Bagaimana Avogra berfungsi:

Avogra mengandungi ubat yang dikenali sebagai *Sildenafil citrate* yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil *phosphor-diesterase type 5 inhibitors (PDE5)*.

Ia berfungsi dengan membantu mengendurkan pembuluh darah pada zakar anda, membolehkan darah untuk mengalir ke dalam zakar anda apabila anda mengalami rangsangan seksual. Avogra hanya akan membantu anda untuk mengalami ereksi sekiranya anda dirangsang secara seksual.

Sebelum mengambil Avogra

Bila tidak boleh mengambil:

Jangan ambil ubat ini dan maklum kepada doktor anda jika:

- anda mengambil ubat mengandungi nitrat, atau penderma nitric oksida seperti *amyl nitrite*. Ubat-ubat ini

selalunya diberikan untuk kelegaan daripada sakit dada (*angina pectoris*). Avogra boleh menyebabkan peningkatan serius dalam kesan ubat-ubat ini. Sila beritahu doktor anda sekiranya anda ada mengambil ubat-ubat seperti ini. Jika anda tidak pasti, sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Sekiranya anda alah (hipersensitif) kepada *sildenafil* atau mana-mana daripada bahan-bahan kandungan lain dalam Avogra.
- Sekiranya anda menghadapi penyakit jantung atau hati yang teruk.
- Sekiranya anda baru-baru ini telah mengalami serangan angin ahmar atau jantung, atau sekiranya anda menghadapi tekanan darah rendah.
- Sekiranya anda menghadapi penyakit mata (seperti sensitif kepada cahaya dan kabur penglihatan).
- Sekiranya anda pernah mengalami hilang penglihatan disebabkan oleh penyakit.

Sebelum mula mengambil:

Periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini:

- jika anda menghadapi masalah sel darah merah, leukemia (kanser sel darah), kanser sumsum tulang atau sebarang penyakit atau kecacatan pada zakar anda. Penyakit-penyakit ini mungkin memerlukan penjagaan khas apabila mengambil ubat untuk penyakit kegagalan ereksi.
- jika anda mempunyai masalah dengan jantung anda. Doktor anda sepatutnya menjalankan pemeriksaan teliti sama ada jantung anda boleh menghadapi tekanan tambahan semasa melakukan hubungan seksual.
- jika anda baru-baru ini menghadapi ulser perut, atau masalah pendarahan (seperti hemofilia).
- jika anda mengalami pengurangan atau kehilangan penglihatan secara tiba-tiba, berhenti mengambil Avogra dan hubungi doktor anda dengan segera.

Jangan sesekali guna Avogra dengan sebarang rawatan lain untuk kegagalan ereksi anda.

Pertimbangan khas untuk kanak-kanak: Avogra tidak boleh diberikan

kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun.

Pertimbangan khas untuk pesakit menghadapi penyakit ginjal atau hati

Anda harus memberitahu doktor anda sekiranya anda menghadapi penyakit ginjal atau hati. Doktor anda mungkin memutuskan dos yang lebih rendah untuk anda.

Jika mengambil ubat-ubat lain:

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda sedang mengambil atau baru-baru ini telah mengambil ubat-ubat lain, termasuk ubat-ubat yang diperolehi tanpa preskripsi.

Avogra mungkin mengganggu se-setengah ubat, terutamanya ubat-ubat yang digunakan untuk merawat sakit dada. Dalam kejadian kecemasan, anda harus memberitahu sesiapa yang merawat penyakit anda bahawa anda mengambil Avogra. Jangan mengambil Avogra dengan ubat-ubat lain melainkan doktor anda memberitahu anda bahawa anda boleh mengambilnya.

Avogra mungkin menyebabkan peningkatan serius dalam kesan ubat-ubat dipanggil nitrat, dan penderma nitrik oksida seperti *amyl nitrite*. Ubat-ubat ini selalunya digunakan untuk kelegaan daripada sakit dada (*angina pectoris*). Anda TIDAK sepatutnya mengambil Avogra sekiranya anda sedang mengambil ubat-ubat ini.

Sekiranya anda sedang mengambil *protease inhibitors*, seperti untuk rawatan HIV, doktor anda mungkin memulakan anda pada dos Avogra yang paling rendah (25 mg).

Sesetengah pesakit yang mengambil terapi *alpha-blocker* untuk rawatan tekanan darah tinggi atau masalah prostat mungkin mengalami rasa berat kepala atau pening-pening lalat semasa berdiri. Kesan-kesan ini adalah tanda-tanda hipotensi *postural* yang mana merupakan tekanan darah rendah apabila anda duduk atau berdiri dengan cepat. Ada pesakit yang telah mengalami tanda-tanda ini apabila mengambil Avogra bersama *alpha-blocker*. Ini paling kemungkinan berlaku dalam masa 4 jam selepas mengambil Avogra. Bagi mengurangkan kemungkinan berlaku tanda-tanda ini, anda harus mengambil

AVOGRA 100MG TABLET

Sildenafil citrate 140.5mg, bersamaan dengan Sildenafil 100mg



dos ubat *alpha-blocker* anda setiap hari sebelum mula mengambil Avogra. Doktor anda mungkin memulakan anda pada dos Avogra 25 mg.

Cara menggunakan Avogra

Berapa banyak harus digunakan: Sentiasa patuh kepada dos yang dipreskrib oleh doctor anda. Dalam apa hal, anda tidak boleh menggunakan Avogra lebih daripada sekali sehari.

Bila perlu digunakan:

Anda perlu mengambil Avogra kira-kira satu jam sebelum aktiviti seksual. Sila telan tablet bulat-bulat dengan air.

Sekiranya anda mempunyai tanggapan bahawa kesan Avogra adalah terlalu kuat atau terlalu lemah, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Avogra hanya akan membantu anda untuk memperoleh ereksi sekiranya anda dirangsang secara seksual.

Berapa lama perlu diambil:

Jangka masa pengambilan Avogra bergantung kepada doktor anda untuk menentukan. Patuhilah arahan doktor anda.

Jika terlupa digunakan:

Lupakan saja dos pada hari tersebut.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos):

Anda tidak boleh mengambil tablet lebih daripada yang doktor anda telah arahkan. Jika anda telah makan terlalu banyak Avogra, hubungi doktor atau Pusat Kawalan Racun, atau pergi ke hospital (unit kecemasan) yang terdekat, dengan segera.

Semasa menggunakan Avogra

Perkara yang perlu dilakukan:

- Anda perlu mengambil Avogra dalam satu jam sebelum aktiviti seksual.
- Telan tablet sepenuhnya dengan satu gelas air.
- Jangan ambil dos lebih satu biji dalam sehari.
- Avogra boleh menyebabkan pening kepala dan boleh menjejaskan penglihatan. Anda harus peka bagaimana untuk bertindakbalas kepada Avogra sebelum anda memandu atau menggunakan mesin.

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda jika anda ada soalan lanjut berkaitan perkara ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan:

Jangan mengambil ubat lebih dari yang diarahkan oleh doktor anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian:

- Jumlah masa diambil Avogra untuk memberikan kesan berbeza-beza daripada seseorang ke seseorang, tetapi ia biasanya mengambil masa di antara setengah hingga satu jam. Anda mungkin mendapati bahawa Avogra mengambil masa lebih lama untuk berkesan sekiranya anda mengambilnya selepas makan hidangan berat.
- Meminum alkohol boleh secara sementara melemahkan keupayaan untuk mendapat ereksi. Bagi mendapat faedah maksimum daripada ubat anda, anda dinasihatkan untuk tidak meminum jumlah besar alkohol sebelum mengambil Avogra.
- Sekiranya Avogra tidak membantu anda untuk mendapat ereksi, atau jika ereksi anda tidak berterusan secukupnya untuk anda menyempurnakan hubungan seksual anda, sila maklum kepada doktor anda.

Kesan-kesan sampingan:

Seperti ubat lain, Avogra boleh menyebabkan kesan sampingan berikut, walaupun tidak semua akan mengalaminya. Kesan-kesan ini biasanya adalah ringan hingga sederhana.

Kesan-kesan sampingan lazim terjadi adalah pening, kesan terhadap penglihatan (termasuk gangguan warna kepada penglihatan, peningkatan sensitif kepada cahaya atau kabur penglihatan, hidung tersumbat, denyutan jantung yang kencang atau muka panas kemerahan.

Kesan-kesan sampingan yang kurang lazim terjadi adalah:

Selsema, tindak balas alergi, rasa mengantuk, rasa kebas, mata kemerahan, sakit mata, muntah, ruam kulit, atau denyutan jantung kencang.

Kesan-kesan sampingan yang kurang lazim seperti berikut juga dilaporkan:

denyutan jantung tidak tetap, sakit dada, keletihan, rasa mabuk, bunyi dalam telinga, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, sakit perut, mulut kering, ruam pada kulit dan sakit otot.

Ereksi berpanjangan dan kadang kala menyakitkan juga telah dilaporkan selepas mengambil Avogra. Sekiranya anda mengalami ereksi seperti itu yang berterusan untuk lebih daripada 4 jam, anda harus menghubungi doktor dengan segera. Kebanyakan, tetapi tidak semua, daripada lelaki-lelaki ini menghadapi penyakit jantung sebelum mengambil ubat ini. Oleh itu, ianya sukar untuk mengesahkan sama ada kejadian-kejadian ini ada kaitan secara langsung dengan Avogra atau tidak.

Sekiranya anda mengalami sakit dada semasa atau selepas hubungan seksual, anda tidak sepatutnya menggunakan nitrat tetapi anda harus menghubungi doktor anda dengan segera.

Sekiranya sebarang daripada kesan sampingan ini menjadi serius, atau jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, sila beritahu doktor anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan & Pelupusan Avogra

Penyimpanan:

- Jauhi dari pencapaian kanak-kanak dan penglihatan mereka.
- Jangan guna Avogra selepas tamat tarikh luputnya. Tarikh luput merujuk kepada tarikh akhir untuk bulan tersebut.
- Simpan di dalam pek asal, di tempat yang kering, dan suhu bawah 30°C.
- Jangan guna Avogra yang sumpik atau pecah atau ada tanda-tanda kerosakan.

AVOGRA 100MG TABLET

Sildenafil citrate 140.5mg, bersamaan dengan Sildenafil 100mg



Pelupusan:

Ubat-ubatan tidak boleh dibuang dalam tong sampah. Hubungi ahli farmasi anda untuk mengetahui bagaimana untuk membuang ubat yang sudah tidak diperlukan lagi. Tindakan ini juga boleh menjaga persekitaran dari tercemar.

Maklumat lanjut:

Rupa dan warna produk:

Tablet dengan salut berwarna putih, bentuk lonjong, dengan dua tanda "507" di satu bahagian dan tanda "NK" di sebelah yang lain.

Bahan-bahan kandungan AVOGRA

Bahan aktif: *Sildenafil citrate*

Bahan eksipien:

Microcrystalline cellulose, Dibasic Calcium Phosphate Anhydrous, Croscarmellose Sodium, Magnesium stearate, Hydroxypropyl methyl cellulose, lactose monohydrate, Glycerol Triacetate dan Titanium Dioxide.

Alkohol dan air diguna sebagai pelarut.

Nombor Pendaftaran Produk:

MAL18016048ACZ

Pengilang

Nang Kuang Pharmaceutical Co., Ltd
No. 1001, Zhongshan Rd., Xinhua
Dist., Tainan City 71243, Taiwan
(R.O.C.)

Pemegang Pendaftaran Produk

Abio Marketing Sdn Bhd, No. 2, Jalan
SS 13/5, 47500 Subang Jaya, Selangor,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP:

20/06/2024

Nombor Siri

NPRA (Rx/x)xxxxxx/xxxxxx