

Lion Ball Corn Remover Solution 20% w/v

Salicylic Acid 20 %w/v

What is in this leaflet

1. What Corn Remover Solution 20% w/v is used for
2. How it works
3. Before you use it
4. How to use it
5. While you are using it
6. Side effects
7. Storage and Disposal
8. Product Description
9. Manufacturer
10. Product Registration Holder
11. Date of Revision

What Corn Remover Solution 20% w/v is used for

Corn Remover Solution 20% w/v is topical application used for the treatment of corns, warts and callouses.

How it works

Salicylic Acid is a keratolytic agent. It works by softening the outer layer of your skin allowing it to loosen and shed.

Before you use it

This product is contraindicated in patients with known hypersensitivity to Salicylic Acid or to any of the excipients.

Do not use on open wounds, irritated or reddened skin, or any area that is infected.

Do not use on the face, anogenital regions, moles, birthmarks, mucous membranes, warts with hair growth. Do not be used by diabetics or patients with impaired blood circulation.

Topical Salicylic Acid may increase the absorption of other topically applied medicines.

Concomitant use of Corn Remover Solution and other topical medicines on the treated area should be avoided.

How to use it

Soak the affected area in warm water for 5 minutes. Dry thoroughly with a clean towel. The surface of the affected area should be rubbed with a brush, with care taken not to cause bleeding. Apply the solution to the affected area using cotton bud, twice daily. Care should be taken to avoid the surrounding healthy skin. The affected area should cover with a plaster (dressing) to help the penetration of ingredients.

Clinically visible improvement should occur in 1-2 weeks, but the maximum effect may be expected after 4-8 weeks. If wart persists beyond 12 weeks of treatment, the patient should be advised to consult their pharmacist or doctor.

Not recommended for use in infants under the age of 2 years. Children under 12 years should be treated under supervision.

Symptoms of salicylate poisoning or salicylism may increase if Corn Remover Solution is used excessively or if it is used for prolonged periods of time.

While you are using it

Avoid contact with eyes and other mucous membranes. If contact occurs, flush with water for 15 minutes.

Avoid contact with normal skin around affected areas. Avoid using on areas of broken or damaged skin. Discontinue treatment if excessive irritation occurs. Excessive prolonged use of topical salicylic acid may result in symptoms of salicylism and must therefore be avoided

The safe use of Corn Remover Solution during pregnancy and breastfeeding has not been established. Therefore this product should be used with caution or following the advice of your doctor.

For external use only.
Keep away from fire or flame.

Side effects

Skin irritation and salicylism may occur.

You may report any side effects or adverse drug reactions directly to the National Centre for Adverse Drug Reaction Monitoring by calling Tel: 03-78835550, or visiting the website portal.bpfk.gov.my (Consumers → Reporting).

Storage and Disposal

Store below 30°C.
Protect from light and moisture.
Keep out of reach of children

Dispose empty container after finish use

Product Description

Clear colourless liquid with characteristic odor.

Active ingredient:
Salicylic Acid
Excipient:
Methylated Spirit and Propylene Glycol

MALxxxxxxx

Manufacturer

Syarikat Wen ken Drug Sdn Bhd
No.24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor.

Product Registration Holder

GAB Sdn. Bhd. (Co. No. 863197A)
No. 24, Jalan BPU 4, Bandar Puchong
Utama, 47100 Puchong, Selangor.

Date of Revision

10/6/2015

Lion Ball Corn Remover Solution 20% w/v

Salicylic Acid 20 %w/v

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Corn Remover Solution 20% w/v
2. Bagaimanakah Corn Remover Solution 20% w/v berfungsi
3. Sebelum mengambil Corn Remover Solution 20% w/v
4. Cara menggunakan Corn Remover Solution 20% w/v
5. Semasa menggunakan Corn Remover Solution 20% w/v
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Corn Remover Solution 20% w/v

Corn Remover Solution 20% w/v digunakan secara topikal untuk rawatan kutil, ketuat dan callus.

Bagaimanakah Corn Remover Solution 20% w/v berfungsi

Asid salisilik ialah sejenis agen keratolitik. Ia berfungsi dengan melembutkan lapisan luar kulit supaya longgar dan senang dibuang.

Sebelum mengambil Corn Remover Solution 20% w/v

Ubat ini tidak sesuai untuk pesakit yang hipersensitif kepada Asid Salisilik atau bahan yang lain.

Elakkan daripada terkena kulit yang terbuka, gatal, merah, atau mana-mana kawasan yang dijangkiti.

Produk ini tidak sesuai digunakan di muka, kawasan anogenital, tahi lalat, tanda lahir, membran mukus dan ketuat dengan pertumbuhan rambut.

Produk ini tidak sesuai digunakan oleh pesakit kencing manis atau pesakit dengan peredaran darah terjejas.

Penggunaan asid salisilik boleh meningkatkan penyerapan ubat-ubatan lain. Produk ini tidak boleh digunakan bersama dengan ubat-ubatan lain pada bahagian yang dijangkiti.

Cara menggunakan Corn Remover Solution 20% w/v

Rendamkan kawasan yang dijangkiti dalam air suam selama 5 minit. Keringkan dengan menggunakan tuala yang bersih. Permukaan kawasan yang dijangkiti perlu disapu dengan berus, berhati-hati untuk mengelakkan pendarahan. Sapu di kawasan yang dijangkiti dengan menggunakan putik kapas, 2 kali sehari. Jangan sapu di kulit sekitar yang sihat. Kawasan yang dijangkiti perlu ditutup dengan plaster untuk membantu penembusan bahan-bahan.

Klinikal pembaikan dapat dilihat dalam 1-2 minggu, tetapi kesan maksimum boleh dijangkakan selepas 4-8 minggu. Jika kawasan yang dijangkiti berterusan melebihi 12 minggu, pesakit adalah dinasihatkan merujuk kepada ahli farmasi atau doktor.

Tidak sesuai digunakan oleh bayi di bawah umur 2 tahun. Perhatian haruslah diberikan kepada kanak-kanak bawah 12 tahun semasa penggunaan.

Simptom keracunan salisilat atau salicylism mungkin meningkat jika produk ini digunakan secara berlebihan atau jika ia digunakan untuk tempoh yang lama.

Semasa menggunakan Corn Remover Solution 20% w/v

Elakkan daripada terkena dengan mata dan membran mukus yang lain. Jika terkena, cucikan dengan air selama 15 minit.

Elakkan daripada terkena kulit biasa yang di sekitar kawasan yang dijangkiti atau kulit yang rosak. Sila berhenti guna jika iritasi kulit berlaku. Harulah dielakkan penggunaan salicylic acid yang berlebihan supaya simptom salicylism tidak berlaku.

Keselamatan penggunaan oleh wanita hamil dan ibu yang menyusukan anak tidak dapat dipastikan. Oleh itu produk ini harus digunakan dengan berhati-hati atau atas nasihat doktor anda.

Untuk kegunaan luar sahaja. Jauhkan daripada api atau nyalaan.

Kesan-kesan Sampingan

Iritasi kulit dan salicylism mungkin berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers → Reporting).

Cara penyimpanan dan pelupusan

Simpan bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan
Jauhkan daripada kanak-kanak

Melupuskan bekas kosong selepas habis digunakan

Maklumat lanjut

Cecair yang jelas, tidak berwarna dan mempunyai bau tersendiri.

Bahan aktif:
Salicylic Acid

Bahan tidak aktif:
Methylated Spirit dan Propylene Glycol

MALxxxxxxxx

Pengilang

Syarikat Wen ken Drug Sdn Bhd
No.24, Jalan Lambak, Taman
Johor, 81200 Johor Bahru, Johor.

Pemegang Pendaftaran Produk

GAB Sdn. Bhd. (Co. No.
863197A) No. 24, Jalan BPU 4,
Bandar Puchong Utama, 47100
Puchong, Selangor.

Tarikh kemaskini RiMUP

10/6/2015

