

XYCIDE C (CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.5% W/V AND ISOPROPYL ALCOHOL 77% W/V HAND SANITIZER)

Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v, Isopropyl Alcohol 77% w/v

Apakah Yang Ada Pada Risalah Ini

1. Apakah kegunaan Xycide C.
2. Bagaimana Xycide C berfungsi.
3. Sebelum mengambil Xycide C.
4. Cara penggunaan Xycide C.
5. Semasa menggunakan Xycide C.
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Xycide C.
8. Maklumat Produk.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah Kegunaan Xycide C

Xycide C digunakan sebagai pensanitasi tangan untuk kebersihan tangan apabila sabun dan air tidak tersedia.

Bagaimana Xycide C berfungsi

Gabungan Chlorhexidine Gluconate dan Isopropyl Alcohol membolehkan kesan pantas dan aktiviti antimikrobial terhadap pelbagai mikroorganisma

Sebelum Mengambil Xycide C

Bila tidak boleh mengambil

Jika anda alah kepada bahan-bahan lain yang terkandung dalam larutan ini

Sebelum mula mengambil

- Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sekiranya anda mengambil atau menggunakan sebarang ubat-ubatan lain.
- Periksa penutup samada pecah atau tidak. Jika pecah, jangan gunakan larutan ini.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sekiranya anda mengambil atau menggunakan sebarang ubat-ubatan lain.

Cara Menggunakan Xycide C

Berapa banyak harus digunakan

Ratakan 3ml – 5ml (1 pam) pada tangan, gosok sehingga kering. Selepas 10 kali digunakan, adalah dinasihatkan untuk membasuh tangan dengan air dan sabun.

Bila perlu digunakan

Digunakan sebagai tambahan selepas membasuh tangan dan tangan tidak kelihatan kotor atau ketika tiada sabun dan air.

Berapa lama perlu digunakan

Anda perlu menggunakan Xycide C seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

Jika terlupa menggunakan

Gunakan semula seperti yang diperlukan.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda secara tidak sengaja tertelan larutan ini, hubungi ahli farmasi atau doktor anda.

Semasa Menggunakan Xycide C

Perkara yang perlu dilakukan

Elakkan larutan ini daripada terkena mata atau lapisan nipis kulit kerana ia boleh menyebabkan kerengsaan.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menggunakan larutan ini pada bahagian luka terbuka.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika terdapat tanda-tanda atau simptom tindak balas hipersensitiviti yang disyaki seperti kegatalan, ruam, kulit kemerahan, bengkak, kesukaran untuk bernafas, sakit kepala yang ringan dan berlaku kadar degupan jantung yang pantas, hentikan penggunaan produk ini dengan segera.

Kesan-Kesan Sampingan

Gangguan sistem imun

Kekerapan tidak diketahui:

Hipersensitiviti termasuk kejutan anafilaksis.

Xycide C mengandungi chlorhexidine. Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda alergic pada chlorhexidine.

Berhenti menggunakan produk ini dan dapatkan bantuan perubatan segera jika anda mengalami ruam, gatal-gatal, bengkak, kesukaran bernafas, pening atau degupan jantung laju.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan Dan Pelupusan Xycide C

Penyimpanan

- Tutup bekas dengan kemas.
- Simpan di bawah 30 ° C.
- Lindungi dari haba, api dan cahaya.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.
- Jangan simpan larutan yang telah tamat tempoh.

Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi anda tentang bagaimana untuk melupuskan larutan yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat Produk

Rupa dan warna produk

Larutan merah jambu muda, berbau alcohol dan lavender.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif: Chlorhexidine Gluconate, Isopropyl Alcohol.

Bahan tidak aktif: Glycerin, Carmoisine, Lavender, Fragrance dan Purified Water.

Nombor MAL

MALXXXXXXXXX

Pengilang Dan Pemegang

Pendaftaran Produk

XORIX SDN BHD,
Lot 1, 2, 3 & 4,
Kawasan Industri Batu 7,
23000 Dungun,
Terengganu, MALAYSIA.

Tarikh Kemaskini

10/11/2022

Nombor siri

NPRA(RA)22/020