

## **XORLYX 2 Salicylic Acid 2% w/w Ointment**

### **Description**

XORLYX 2 Salicylic Acid 2% w/w is a white or almost white and translucent ointment. The ointment is used as a keratolytic agent.

XORLYX 2 Salicylic Acid 2% w/w ointment is packaged in a printed aluminium tube with standard white cap.

### **Indications**

XORLYX 2 Salicylic Acid 2% w/w Ointment is indicated to alleviate hyperkeratotic and scaling skin conditions such as seborrhoeic dermatitis, ichthyosis, psoriasis and acne.

### **Dosage & Administration**

Apply sparingly to the affected skin areas twice daily, in the morning and at night until improvement occurs. Subsequently, it may then be possible to maintain improvement by less frequent application.

### **Contraindications**

- Unknown.

### **Warnings and Precautions**

- Avoid broken skin.
- For external use only.
- Avoid contact with mouth, eyes and mucous membranes.
- If irritation or sensitization develops, discontinue treatment.
- If large areas of skin are treated, the systemic absorption of topical Salicylic Acid will be enhanced and may lead to Salicylate toxicity.
- When using salicylic acid preparations do not use any of the following preparations on the affected area, unless directed to do so by your doctor;
  - \* Any other medicated topical agents, e.g. benzoyl peroxide, topical retinoids.
  - \* Abrasive soaps and cleansers.
  - \* Cosmetics or soaps that dry the skin or are designed to peel/exfoliate.
- Salicylic acid may cause dermatitis. Extensive prolonged use of topical Salicylic Acid may enhance the systemic absorption and may lead to Salicylate toxicity.  
Pregnancy and breastfeeding: The safety has not been established. Therefore, it should be used with caution or following professional advice.

### **Side Effects / Adverse Reactions**

- Contact dermatitis or skin irritation; flushing; unusually warm skin.
- Excessive drying and peeling of skin.

### **Interaction with other Medicaments**

Other topical preparation, mainly isotretinoin, alitretinon and tazarotene.

### **Overdose and Treatment**

Excessive prolonged use of topical preparations containing Salicylic Acid may result in symptoms of Salicylism. If this occurs, symptomatic treatment should be initiated.

### **Storage Conditions**

Keep the tube tightly closed.  
Store below 30 °C.

Protect from heat, moisture and light.  
Keep medicine out of reach of children.

### **Shelf Life**

36 months.

### **Dosage Form**

Ointment.

### **Packaging**

Tube 15 gram, 30 gram and 50 gram.  
1 (one) tube per uncarton.

This insert contains basic prescribing information only. For further information, please consult your physician or pharmacist.

### **Registration Holder & Manufacturer**

Xorix Sdn. Bhd,  
Lot 1, 2, 3 & 4,  
Kawasan Industri Batu 7,  
23000 Dungun,  
Terengganu, MALAYSIA.

## XORLYX 2 Salicylic Acid 2% w/w Ointment

### Keterangan

XORLYX 2 Asid Salisilik 2% w/w merupakan salap berwarna putih atau hampir putih dan lutsinar. Salap ini bertindak sebagai agen keratolitik (keadaan kulit berkeruping).

XORLYX 2 Asid Salisilik 2% w/w dipk dalam tiub aluminium bercetak berserta penutup berwarna putih yang standard.

### Kegunaan

XORLYX 2 Asid Salisilik 2% w/w Ointment digunakan untuk meringankan keadaan kulit hyper keratotic (keadaan kulit berkeruping yang melampau dan bersisik yang disebabkan oleh kerengsaan kelenjar sebor (kelenjar peluh bulu roma), kulit bersisik, psoriasis (keadaan kulit seakan berkurap) dan jerawat.

### Dos dan Cara Guna

Sapu sedikit pada bahagian kulit yang terjejas. Dua kali sehari, pagi dan malam sehingga ada perubahan. Penggunaan boleh dikurangkan untuk mengekalkan tahap peningkatan penyembuhan.

### Kontraindikasi (Keadaan Tidak Boleh Guna)

- Tidak diketahui

### Amaran dan Langkah Berjaga-jaga

- Hindari dari kulit yang pecah.
  - Untuk kegunaan luaran sahaja.
  - Elakkan dari bersentuh dengan mulut, mata dan membran mukus (kulit kawasan bermukus seperti kulit tekak, kulit dalaman hidung dan seumpamanya).
  - Jika berlaku kerengsaan atau pemekaan (sensitif), sila hentikan rawatan ini.
  - Jika kawasan kulit yang dirawat itu terlalu besar, penyerapan salap luaran Asid Salisilik ke dalam badan berkemungkinan meningkat, yang boleh menyebabkan keracunan Salisilik.
  - Bila Asid Salisilik digunakan, elakkan penggunaan ubatan berikut dikawasan kulit yang terjejas, melainkan diarahkan oleh doktor anda. Ubatan tersebut adalah:
    - \*Ubat-ubatan salap luaran lain seperti benzoil peroksida, salap luaran retinoid.
    - \* Sabun dan pembersih yang kasar.
    - \* Kosmetik atau sabun yang dirumus untuk kulit kering atau untuk mengelupaskan kulit.
  - Asid Salisilik mungkin boleh menyebabkan kerengsaan kulit. Penggunaan yang berlebihan salap luaran Asid Salisilik boleh meningkatkan penyerapannya ke dalam badan dan boleh menyebabkan keracunan Salisilik.
- Kehamilan dan menyusui badan : keselamatan penggunaan tidak dapat dipastikan. Walaubagaimanapun, ia perlu digunakan dengan berhati-hati atau mengikut nasihat daripada ahli profesional.

### Pengaruh Ubat-ubatan Lain

Penyediaan topikal lain seperti isotretinoin, alitretinon dan tazarotene.

### Kesan Sampingan / Kesan Yang Tidak Diingini

- Kerengsaan akibat sentuhan atau keradangan kulit; kemerah-merahan; kepanasan kulit yang luar biasa.
- Kekerangan dan penggelupasan kulit yang keterlaluan.

### Dos Berlebihan dan Rawatan

Penggunaan salap luaran yang mengandungi Asid Salisilik boleh menyebabkan simptom Salisilism. Jika ini berlaku, rawatan simptom ini perlu diambil.

### Cara Menyimpan

Tutup tiub dengan kemas.

Simpan bawah suhu 30°C.

Lindungi dari haba, lembapan dan cahaya.

Jauhi dari kanak-kanak.

### Hayat Simpanan

36 bulan.

### Bentuk Dos

Salap.

### Pembungkusan

Tiub 15 gram, 30 gram dan 50 gram.

1 (one) tube per uncarton.

Sisipan ini hanya mengandungi maklumat tataraca asas sahaja. Untuk maklumat lanjut sila berbincang dengan doktor atau pegawai farmasi bertauliah anda.

### Pemegang Pendaftaran & Pengilang

Xorix Sdn. Bhd,

Lot 1, 2, 3 & 4,

Kawasan Industri Batu 7,

23000 Dungun,

Terengganu, MALAYSIA.