

XORLYX 5 Salicylic Acid 5% w/w Ointment.

Description

XORLYX 5 contains Salicylic Acid (5% w/w).

Topical Salicylic Acid acts as keratolytic agent.

XORLYX 5 Salicylic Acid 5% w/w ointment is a white or almost white and translucent ointment and packaged in a printed aluminium tube with standard white cap.

Indications

Xorlyx 5 Salicylic Acid 5% w/w Ointment is indicated for the treatment of hyperkeratotic and scaling skin conditions such as acne and psoriasis.

Dosage & Administration

Apply sparingly to the affected skin areas twice daily, in the morning and at night until improvement occurs. Subsequently, it may then be possible to maintain improvement by less frequent application.

Contraindications

- Hypersensitivity to the preparations.
- Diabetes or if peripheral blood circulation is impaired.

Warnings and Precautions

- Avoid broken skin.
- For external use only.
- Avoid contact with mouth, eyes and mucous membranes.
- If irritation or sensitization develops, discontinue treatment.
- If large areas of skin are treated, the systemic absorption of topical Salicylic Acid will be enhanced and may lead to Salicylate toxicity.
- When using salicylic acid preparations do not use any of the following preparations on the affected area, unless directed to do so by your doctor;
 - * Any other medicated topical agents, e.g. benzoyl peroxide, topical retinoids.
 - * Abrasive soaps and cleansers.
 - * Cosmetics or soaps that dry the skin or are designed to peel/exfoliate.
- Salicylic acid may cause dermatitis. Extensive prolonged use of topical Salicylic Acid may enhance the systemic absorption and may lead to Salicylate toxicity.

Drug Interaction

Other topical preparations, mainly isotretinoin, tretinoin, tazarotene.

Pregnancy

Topical Salicylic Acid should be used only if potential benefit outweighs the potential risk to the fetus. Topical Salicylic Acid should not be used extensively in large amount or for prolonged period in pregnant women.

Breast feeding

Topical salicylic acid should be used cautiously in nursing mothers.

Side Effects / Adverse Reactions

- Contact dermatitis or skin irritation; flushing; unusually warm skin.
- Excessive drying and peeling of skin.

Overdose

Excessive prolonged use of topical preparations containing Salicylic Acid may result in symptoms of Salicylism. If this occurs, symptomatic treatment should be initiated.

Storage Conditions

Keep the tube tightly closed.

Store below 30°C.

Protect from heat, moisture and light.

Keep medicine out of reach of children.

Shelf Life

36 months.

Dosage Form

Ointment.

Packaging

Tube 15 gram.

1 (one) tube per uncarton.

This insert contains basic prescribing information only. For further information, please consult your physician or pharmacist.

Product Registration Holder & Manufacturer

Xorix Sdn. Bhd,
Lot 1, 2, 3 & 4,
Kawasan Industri Batu 7,
23000 Dungun,
Terengganu, MALAYSIA.

XORLYX 5 Salap Asid Salisilik 5% b/b

Keterangan

XORLYX 5 mengandungi Asid Salisilik (5% berat/berat).

Salap luaran Asid Salisilik bertindak sebagai agen keratolitik (keadaan kulit berkerupung).

Salap XORLYX 5 Asid salisilik 5% b/b adalah salap putih atau hampir putih dan lut cahaya dan dipek di dalam tiub aluminium bercetak berserta penutup putih yang standard.

Kegunaan

Xorlyx 5 Salap Asid Salisilik 5% b/b digunakan untuk meringankan keadaan kulit hiper keratotik (keadaan kulit berkerupung yang melampau dan bersisik yang disebabkan oleh kerengsaan kelenjar sebor (kelenjar peluh bulu roma), kulit bersisik, psoriasis (keadaan kulit seakan berkrup) dan jerawat.

Dos dan Cara Guna

Sapu sedikit pada bahagian kulit yang terjejas. Dua kali sehari, pagi dan malam sehingga ada perubahan. Penggunaan boleh dikurangkan untuk mengekalkan tahap peningkatan penyembuhan.

Kontraindikasi (Keadaan Tidak Boleh Guna)

- Alahan kepada penyediaan ubat ini.
- Kencing manis ataupun jika peredaran darah periferi (di bahagian hujung badan seperti hujung jari dan yang seumpamanya) tidak baik.

Amaran dan Langkah Berjaga-jaga

- Hindari dari kulit yang pecah.
- Untuk kegunaan luaran sahaja.
- Elakkan dari bersentuh dengan mulut, mata dan membran mukus (kulit kawasan bermukus seperti kulit tekak, kulit dalaman hidung dan seumpamanya).
- Jika berlaku kerengsaan atau pemekaan (sensitif), sila hentikan rawatan ini.
- Jika kawasan kulit yang dirawat itu terlalu besar, penyerapan salap luaran Asid Salisilik ke dalam badan berkemungkinan meningkat, yang boleh menyebabkan keracunan Salisilik.
- Bila Asid Salisilik digunakan, elakkan penggunaan ubatan berikut dikawasan kulit yang terjejas, melainkan diarahkan oleh doktor anda. Ubatan tersebut adalah;

*Ubat-ubatan salap luaran lain seperti benzoil peroksida, salap luaran retinoid.

* Sabun dan pembersih yang kasar.

- * Kosmetik atau sabun yang dirumus untuk kulit kering atau untuk mengelupaskan kulit.
- Asid Salisilik mungkin boleh menyebabkan kerengsaan kulit. Penggunaan yang berlebihan salap luaran Asid Salisilik boleh meningkatkan penyerapannya ke dalam badan dan boleh menyebabkan keracunan Salisilik.

Tindak Balas Ubat

Persediaan ubat topikal yang lain terutama isotretinoin, tretinoin, tazarotene.

Kehamilan

Salap luaran Asid Salisilik boleh digunakan bagi ibu hamil jika potensi kesembuhan mengatasi risiko kepada janin. Elakkan daripada mengguna salap luaran Asid Salisilik yang berlebihan dan berjangjang pada wanita hamil.

Menyusu Badan

Salap luaran Asid Salisilik seharusnya digunakan dengan berhati-hati oleh para ibu yang menyusu badan.

Kesan Sampingan / Kesan Yang Tidak Diingini

- Kerengsaan akibat sentuhan atau keradangan kulit; kemerah-merahan; kepanasan kulit yang luar biasa.
- Keringan dan pengelupasan kulit yang keterlaluan.

Dos Berlebihan

Penggunaan salap luaran yang mengandungi Asid Salisilik boleh menyebabkan simptom Salisilism. Jika ini berlaku, rawatan simptom ini perlu diambil.

Cara Menyimpan

Tutup tiub dengan kemas.

Simpan bawah suhu 30°C.

Lindungi dari haba, lembapan dan cahaya.

Jauhi ubat dari kanak-kanak.

Hayat Simpanan

36 bulan.

Bentuk Dos

Salap.

Pembungkusan

Tiub 15 gram.

1 (satu) tiub di dalam uncarton.

Sisipan ini hanya mengandungi maklumat tatacara asas sahaja. Untuk maklumat lanjut sila berunding dengan doktor atau pegawai farmasi bertauliah anda.

Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang

Xorix Sdn. Bhd,
Lot 1, 2, 3 & 4,
Kawasan Industri Batu 7,
23000 Dungun,
Terengganu, MALAYSIA.