

# AVOSIL Lozenge 2mg

Cetylpyridinium Chloride 2mg

## Apa yang ada pada risalah ini:

- Apa kegunaan Avosil
- Bagaimana Avosil berfungsi
- Sebelum mengambil Avosil
- Cara mengguna Avosil
- Semasa mengguna Avosil
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan & pelupusan Avosil
- Maklumat lanjut
- Pengilang
- Pemegang pendaftaran produk
- Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Avogro:

Nama ubat anda ialah Avosil Lozenge 2mg (dipanggil 'Avosil' dalam risalah ini).

Avosil digunakan untuk melegakan gejala sakit tekak dan gejala-gejala lain yang berkaitan dengan jangkitan mulut dan tekak.

## Bagaimana Avosil berfungsi:

Avosil mengandungi ubat yang dikenali sebagai *Cetylpyridinium Chloride* yang bersifat antiseptik.

Menghisap lozeng membolehkan bahan aktif untuk berfungsi dalam zon ketidakselesaan dan juga membantu melincirkan dan melegakan bahagian yang sakit. Hal ini dapat membantu melegakan kesakitan dan ketidakselesaan akibat jangkitan mulut dan tekak.

## Sebelum mengambil Avosil

### Bila tidak boleh mengambil

Jangan guna ubat ini jika anda:

- di bawah umur 6 tahun
- alah kepada *Cetylpyridinium Chloride* atau mana-mana kandungannya.
- tiada toleransi terhadap sukrosa (gula)

## Sebelum mula mengambil:

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini:

- Jika anda mempunyai alahan kepada ubat atau produk makanan.
- Jika anda menderita sakit kencing manis atau tiada toleransi terhadap

sukrosa (gula).

- Jika anda mengambil atau menggunakan ubat-ubatan lain.
- Jika anda sedang mengandung atau menyusukan bayi.

## Jika mengambil ubat-ubatan lain

Tiada sebarang interaksi ubat dengan Avosil dilaporkan. Walaupun begitu, ambil langkah berjaga-jaga dan beritahu doktor anda mengenai ubat-ubatan yang anda ambil termasuk ubat-ubatan preskripsi dan bukan preskripsi, vitamin, dan suplemen kesihatan herba.

## Cara menggunakan Avosil

### Berapa banyak harus digunakan:

Dewasa: Ambil 1 tablet, 3 hingga 4 kali sehari.

Kanak-kanak (6 tahun keatas): ½ tablet, 3 hingga 4 kali sehari

Jangan kunyah atau telan ubat ini.

### Bila perlu digunakan:

Avosil boleh digunakan pada bila-bila masa.

Ambil Avosil sebelum tidur, bahan aktif boleh kekal di dalam air liur dan memberikan keberkesanan yang lebih baik.

### Berapa lama perlu digunakan:

Dapatkan nasihat doktor jika anda telah menggunakan Avosil lebih daripada 3 hari sekiranya gejala masih berterusan.

### Jika terlupa menggunakan:

Jika anda terlupa menggunakan ubat ini, guna secepat mungkin selepas anda teringat. Jangan guna ubat ni dua kali ganda dos dalam satu masa. Pastikan anda tidak melebihi 4 tablet sehari.

### Jika mengambil berlebihan (terlebih dos):

Jika anda ambil lebih lozeng daripada yang sepatutnya, beritahu doktor anda atau ahli farmasi.

Hubungi doktor anda atau Pusat

Kawalan Racun, atau segera ke bilik rawatan kecemasan hospital berdekatan.

Jika sesiapa termakan ubat ini (termasuk kanak-kanak), segera bawa mereka ke hospital.

## Semasa menggunakan Avosil

### Perkara yang perlu dilakukan.

Jangan kunyah atau telan ubat ini. Letak Avosil di dalam mulut and biarkan ia larut perlahan-lahan.

Jika anda mempunyai soalan lanjut mengenai penggunaan produk ini, anda boleh merujuk pada doktor anda atau ahli farmasi.

### Perkara yang tidak boleh dilakukan:

Kunyah atau telan ubat ini.

### Perkara yang perlu diberi perhatian:

- Jika anda mengalami sebarang rasa panas di dalam mulut apabila mengambil Avosil, atau kulit anda menjadi gatal dan ruam, berhenti menggunakan ubat ini dan beritahu doktor anda.
- Jika Avosil digunakan seperti yang dicadangkan, kesan-kesan ini tidak akan berlaku.
- Oleh itu amat penting jika anda menggunakan ubat ini seperti yang dicadangkan dan mengikut arahan dengan berhati-hati.

## Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan yang lain, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak semua akan mengalami.

*Jika anda mengalami kesan-kesan sampingan seperti berikut, berhenti dari menggunakan ubat ini dan dapatkan bantuan perubatan serta-merta:*

- Alahan termasuk merah pada kulit atau gatal-gatal.
- Rasa panas dalam mulut, lidah atau tekak yang boleh menyebabkan kesukaran untuk menelan.
- Sebarang kemungkinan kesan

# AVOSIL Lozenge 2mg

Cetylpyridinium Chloride 2mg

sampingan yang tidak tersenarai dalam risalah ini.

- Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel. 03-78835550, atau laman web [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) (Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI).

## Cara Penyimpanan & Pelupusan Avosil

### Penyimpanan:

- Jauhi dari kanak-kanak dan penglihatan mereka.
- Jangan guna Avosil selepas tamat tarikh luput. Tarikh luput boleh dirujuk pada hari terakhir pada bulan tersebut.
- Simpan di dalam pek asal, di tempat kering atau suhu di bawah 30°C.
- Jangan guna Avosil jika warna bertukar gelap atau terdapat tanda-tanda kerosakan.

### Pelupusan:

Ubat-ubatan tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. Rujuk ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat yang sudah tidak diperlukan lagi. Tindakan ini membantu menjaga persekitaran dari tercemar.

## Deskripsi Produk

### Rupa dan warna produk:

Avosil Lozenge 2mg adalah tablet bulat kekuningan, diukir dengan "SP104" di sebelah sisi. Ia dibungkus dalam lepuh PVC / aluminium 10 tablet, dimeteraikan dalam uncang aluminium dan dibungkus ke dalam 2 kotak atau 10 beg.

## Bahan-bahan kandungan Avosil

### Bahan aktif:

Cetylpyridinium Chloride

### Bahan tidak aktif:

Sukrosa, asid sitrik, akasia, selulosa mikrokristal, mentol, talkum, magnesium sterat, D&C Kuning #10 dan alkohol.

### Pengilang

Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd.  
84, Chung Shan Road, Chung Shan Village, Tung-Shan Shine, I-Lan, Taiwan R.O.C.,

### Pemegang Pendaftaran Produk:

Nano Medic Care Sdn. Bhd  
No. 1-6 & 1-12, 1<sup>st</sup> Floor, Jalan Indah 2, Taman Indah, 84000 Muar Johor Malaysia.

Nombor MAL: MAL ..

### Tarikh kemaskini RiMUP:

20/12/2017