

ETHOMID TABLETS 250MG

Ethionamide (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Ethomid
2. Bagaimana Ethomid berfungsi
3. Sebelum menggunakan Ethomid
4. Cara menggunakan Ethomid
5. Semasa menggunakan Ethomid
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ethomid
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Ethomid

Ethomid digunakan bersama ubat-ubatan lain untuk merawat tuberkulosis (TB), terutamanya apabila bakteria TB menunjukkan rintangan terhadap ubat-ubatan TB barisan pertama yang lain seperti *isoniazid* atau *rifampin*, atau jika pesakit tidak boleh bertoleransi dengan ubat-ubatan tersebut.

Bagaimana Ethomid berfungsi

Ethomid mengandungi bahan aktif *ethionamide*. Ia adalah antibiotik yang berfungsi dengan menghentikan pertumbuhan bakteria yang menyebabkan tuberkulosis.

Sebelum menggunakan Ethomid

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap *ethionamide* atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- anda mempunyai penyakit hati yang teruk.

- Sebelum menggunakannya

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Ethomid jika anda:

- mempunyai masalah hati.
- menghidap diabetes.
- mempunyai masalah tiroid.
- mempunyai sejarah masalah kesihatan mental.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Ethionamide boleh memudaratkan bayi dalam kandungan anda. Doktor anda akan memutuskan sama ada faedah mengambil ubat ini melebihi risiko.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil:

- Ubat TB lain: Penggunaan Ethomid bersama *cycloserine* mungkin meningkatkan risiko sawan. Penggunaannya bersama *isoniazid* mungkin meningkatkan risiko kesan sampingan yang menjejaskan sistem saraf atau hati.
- Ubat diabetes: Ethomid boleh menyukarkan pengurusan paras gula dalam darah. Dos ubat diabetes anda mungkin perlu diselaraskan.
- Alkohol: Pengambilan alkohol yang berlebihan harus dielakkan kerana ia boleh meningkatkan risiko masalah hati dan mungkin memburukkan lagi kesan sampingan seperti pening.

Sentiasa semak dengan doktor atau ahli farmasi sebelum memulakan sebarang ubat baru semasa mengambil Ethomid.

Cara menggunakan Ethomid

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa:

- Dos biasa ialah 15 hingga 20 miligram (mg) per kilogram (kg) berat badan anda setiap hari.
- Jumlah dos harian maksimum ialah 1000 mg (1 gram).
- Rawatan biasanya dimulakan pada dos yang lebih rendah (cth., 250 mg sekali sehari) dan secara berperingkat ditingkatkan mengikut toleransi badan anda.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Ambil ubat ini pada waktu yang sama setiap hari, bersama atau selepas makan untuk membantu mengurangkan rasa tidak selesa pada perut.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Anda mesti mengambil ubat ini untuk tempoh penuh yang disarankan oleh doktor. Jangan berhenti walaupun anda berasa lebih baik, kerana jangkitan mungkin belum dirawat sepenuhnya. Rawatan TB boleh berlanjutan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan:

- Loya dan muntah yang teruk.
- Sakit perut yang teruk.

- Pening, mengantuk, dan kekeliruan.
- Penglihatan kabur atau gangguan penglihatan lain.
- Sawan.
- Tanda-tanda masalah hati (seperti kulit atau mata menguning).

Semasa menggunakan Ethomid

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Ethomid.

Anda mesti melakukan ujian darah secara kerap untuk memeriksa fungsi hati, paras gula dalam darah, dan fungsi tiroid.

Ambil vitamin B6 (*pyridoxine*) jika doktor menyarakannya, untuk membantu mencegah masalah saraf.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Ethomid kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini boleh menyebabkan pening, mengantuk, atau penglihatan kabur. Jangan memandu atau menggunakan mesin jika anda mengalami kesan ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Ethomid boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami:

- Kulit atau mata menjadi kuning, air kencing gelap (tanda-tanda masalah hati).

- Kebas, rasa terbakar, atau rasa mencucuk di tangan atau kaki.
- Penglihatan kabur, sakit mata, atau sebarang kehilangan penglihatan.
- Pening yang teruk, kekeliruan, sawan, atau perubahan emosi (cth., kemurungan).
- Lebam atau pendarahan yang luar biasa.

Kesan sampingan biasa (mungkin mempengaruhi sehingga 1 dalam 10 orang):

- Loya, muntah, cirit-birit, sakit perut, hilang selera makan, rasa logam di dalam mulut.
- Pening, sakit kepala, mengantuk.
- Pertambahan air liur.

Kesan sampingan biasa yang lain

- Ruam kulit, jerawat.
- Masalah tiroid.
- Kesukaran mengawal paras gula dalam darah (pada pesakit kencing manis).

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Ethomid

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan pada suhu di bawah 30°C di tempat yang kering.

Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda

mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet kuning, bulat, dwicembung, bersalut filem dengan permukaan biasa di kedua-dua sisi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- *Ethionamide*

- Bahan tidak aktif

- *Maize Starch,*
- *Gelatine, Sodium Starch Glycolate,*
- *Colloidal Anhydrous Silica,*
- *Acacia,*
- *Purified Talc,*
- *Magnesium Stearate,*
- *Povidone,*
- *Hypromellose,*
- *Titanium dioxide,*
- *Quinoline yellow,*
- *Diethyl phthalate.*

- Nombor MAL

MALXXXXXXXXXX

Pengilang

Macleods Pharmaceuticals Ltd.
Plot No. 25-27,
Survey No. 366, Premier Ind. Estate,
Kachigam, Daman 396 210 (U.T.) India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Zulat Pharmacy Sdn Bhd
No. 23a (1st Floor), Jalan Bandar 3
Taman Melawati
53100
Kuala Lumpur
Malaysia

Tarikh kemas kini RiMUP

17/09/2025

Nombor Siri

NPRA(R2/1)260723/00102