

COXERIN CAPSULES

Cycloserine (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Coxerin capsules
2. Bagaimana Coxerin capsules berfungsi
3. Sebelum menggunakan Coxerin Capsules
4. Cara menggunakan Coxerin Capsules
5. Semasa menggunakan Coxerin Capsules
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Coxerin Capsules
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Coxerin Capsules

Coxerin Capsules digunakan dalam kombinasi dengan ubat lain untuk merawatjangkitan tibi yang tidak dapat dirawat dengan ubat anti-tibi lain.

Bagaimana Coxerin Capsules berfungsi

Coxerin mengandungi bahan aktif cycloserine, iaitu antibiotik. Ia berfungsi dengan mengganggu penghasilan dinding sel bakteria dan akhirnya membunuh bakteria yang menyebabkanjangkitan.

Sebelum menggunakan Coxerin Capsules

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika anda mempunyai:

- Alahan terhadap Cycloserine atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- Sawan (Epilepsi)
- Gangguan psikiatri (Contoh: kemurungan atau keresahan)
- Kerap minum alkohol.
- Masalah buah pinggang yang teruk

- Sebelum menggunakan Coxerin Capsules

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat..

Cycloserine hanya boleh digunakan semasa hamil jika faedahnya lebih daripada risiko kepada janin.

Tidak diketahui sama ada cycloserine dirembeskan ke dalam susu ibu atau tidak, tetapi, disebabkan kesan sampingan kepada bayi, doktor anda akan membincangkan risiko dan faedah penyusuan susu ibu semasa anda mengambil Cycloserine.

Keputusan harus dibuat sama ada untuk menghentikan penyusuan atau menghentikan ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil:

- Ethionamide, isoniazide (ubat untuk merawat tibi)

Coxerin mesti sentiasa diambil bersama dengan ubat anti-tibi yang lain.

Cara menggunakan Coxerin Capsules

- Berapa banyak harus diambil

Dos permulaan ialah 1 kapsul untuk diambil setiap 12 jam. Doktor akan melaraskan dos berdasarkan fungsi buah pinggang dan paras darah.

Coxerin mesti sentiasa diambil bersama dengan ubat antituberkulosis yang lain.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ambil dua kali sehari.

- Berapa lama perlu diambil

Ambil Coxerin Capsules mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Teruskan terapi selama yang mencukupi untuk mencegahjangkitan berulang.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan lebih daripada 2 kapsul sehari boleh menyebabkan ketoksikan pada sistem saraf. Tanda-tandanya adalah: sakit kepala, sawan, kekeliruan, mengantuk, refleks badan yang terlalu aktif atau responsif, menggeletar, perubahan personaliti (psikosis), kemurungan, rasa berputar dan kelemahan otot.

Semasa menggunakan Coxerin Capsules

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Coxerin Capsules.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Gunakan Coxerin Capsules hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Coxerin Capsules kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian**Memandu dan menggunakan jentera**

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa pening, mengantuk, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Jangan mengambil cycloserine bersama dengan alkohol.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Sesetengah kesan ini mungkin serius dan memerlukan rawatan perubatan.

Kesan sampingan yang paling biasa dilaporkan ialah:

- Kekeliruan
- Kemurungan
- Keletihan
- Rasa berputar
- Sawan (Pengambilan alkohol yang kerap meningkatkan risiko sawan)
- Hilang kesedaran
- Menggeletar
- Mengantuk
- Pening
- Kesukaran bercakap
- Rasa kegelisahan atau keresahan
- Sakit kepala

Kesan sampingan yang jarang dilaporkan adalah :

- Ruam
- Kulit menjadi lebih sensitif kepada cahaya
- Degupan jantung tidak teratur
- Kegagalan jantung

Kesan sampingan yang dilaporkan tidak diketahui frekuensinya adalah:

- Halusinasi

Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan, atau jika anda mendapati sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli professional kesihatan anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Coxerin Capsules**- Penyimpanan**

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dalam bekas yang ditutup rapat dan di bawah suhu 30 °C.

Jangan gunakan kapsul cycloserine selepas tarikh luput yang dinyatakan pada strip ubat. Jangan gunakan jika didapati perubahan pada kapsul.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut**- Rupa dan warna produk**

Kapsul gelatin keras saiz '1' berwarna marun/marun yang diisi dengan serbuk berwarna putih hingga kuning pucat."

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
- Cycloserine
- Bahan tidak aktif
- Purified Talc; Colloidal Anhydrous Silica.

- Nombor MAL

MAL06091379AZ

Pengilang

Macleods Pharmaceuticals Ltd
Phase II, Plot No. 25-27, Survey No. 366,
Premier Industrial estate, Kachigam, Daman-396 210, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Zulat Pharmacy Sdn. Bhd.,
No. 23A (1st floor), Jalan Bandar 3,
Taman Melawati, 53100, Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

23/01/2026

No Siri

NPRA(R2/2)260123/00008