

OFLOMAC 200

Ofloxacin tablets USP 200mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Oflomac 200
2. Bagaimana Oflomac 200 berfungsi
3. Sebelum menggunakan Oflomac 200
4. Cara menggunakan Oflomac 200
5. Semasa menggunakan Oflomac 200
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Oflomac 200
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Oflomac 200

Oflomac 200 adalah antibiotik yang digunakan untuk merawat pelbagai jenis jangkitan. Ia diindikasikan untuk rawatan jangkitan berikut apabila disebabkan oleh organisma sensitif:

- Jangkitan saluran kencing di bahagian atas & bawah.
- Jangkitan saluran pernafasan
- Gonorrhea uretra dan serviks yang tidak serius.
- Jangkitan kulit dan tisu lembut

Bagaimana Oflomac 200 berfungsi

Ofloxacin tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil antibiotik quinolone. Ofloxacin adalah antibiotik yang dapat digunakan untuk merawat pelbagai jenis jangkitan.

Sebelum menggunakan Oflomac 200

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Oflomac 200 jika:

- Sekiranya anda alah terhadap ofloxacin atau mana-mana ramuan lain dari ubat ini.
- Sekiranya sebelum ini anda mempunyai reaksi alergi terhadap antibiotik quinolone lain, mis. ciprofloxacin atau norfloxacin.
- Sekiranya anda menderita dari epilepsi atau berisiko mengalami sawan.
- Sekiranya anda mempunyai sejarah keradangan dan pembengkakan tendon (tendonitis) yang boleh menjejaskan bahagian tubuh badan seperti pergelangan tangan atau

tendon achilles selepas rawatan dengan antibiotik quinolone, mis. ciprofloxacin, norfloxacin, atau nadifloxacin.

- Sekiranya anda menderita dari atau mempunyai sejarah penyakit kekurangan glukosa-6-fosfat dehidrogenase (gangguan yang diwarisi yang mempengaruhi sel darah merah) dari keluarga.
- Sekiranya anda hamil, fikir anda mungkin hamil atau merancang untuk mengandung.
- Sekiranya anda menyusui
- Sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun, atau masih membesar.

Sila bertanya kepada doktor anda mengenai sebarang keadaan yang dinyatakan di atas.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil, baru-baru ini mengambil atau mungkin mengambil ubat lain.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat berikut :

- Ubat-ubatan atau suplemen yang mengandungi zat besi (untuk anemia) atau zink.
- Sucralfate yang digunakan untuk ulser perut.
- Antasid yang digunakan untuk masalah pencernaan yang mengandungi magnesium atau aluminium.
- Tarivid dan anti-koagulan yang boleh memanjangkan tempoh pendarahan.
- Ubat penahan sakit yang disebut sebagai ubat anti-radang bukan steroid (NSAID) mis. ibuprofen atau diclofenac atau theophylline yang , digunakan untuk merawat asma atau penyakit paru-paru obstruktif kronik kerana ini boleh membuat anda lebih mudah terkena sawan jika diambil dengan ofloxacin.
- Glibenclamide, ubat yang digunakan untuk mengawal tahap kandungan gula dalam darah, kerana tahap

kandungan ubat ini dalam darah dapat meningkat dan memberi kesan yang lebih besar.

- Ubat yang boleh menjejaskan fungsi buah pinggang anda, mis. cimetidine (digunakan untuk ulser perut atau masalah pencernaan), probenecid (digunakan untuk gout) dan methotrexate (digunakan untuk rheumatism) kerana ubat-ubat tersebut dapat meningkatkan tahap ofloxacin dalam darah.

Sekiranya anda menjalani ujian air kencing untuk porphyrin (pigmen dalam darah), atau opiat (ubat penahan sakit yang kuat), beritahu doktor atau jururawat anda bahawa anda mengambil ubat ini.

Mengandung & menyusukan anak

Jangan mengambil Oflomac 200 jika anda hamil atau menyusui, fikir anda mungkin hamil atau merancang untuk mengandung. Sekiranya anda hamil semasa mengambil Oflomac 200, hentikan pengambilan tablet dan segera hubungi doktor anda.

Cara menggunakan Oflomac 200

Sentiasa mengambil ubat ini sama seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Tanyakan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

- Untuk penggunaan oral. Anda harus menelan tablet ini dengan air. Jangan mengunyah.
- Tablet boleh diambil dengan atau tanpa makanan dan boleh dibahagikan kepada dos yang sama.
- Semasa mengambil Oflomac 200, elakkan dari terkena cahaya matahari yang kuat dan jangan gunakan lampu matahari atau solaria kerana kulit anda mungkin lebih sensitif terhadap cahaya.
- Sekiranya anda mengambil tablet zat besi (untuk anemia), antasid (untuk masalah pencernaan atau pedih ulu hati) atau sucralfate (untuk ulser perut), penting untuk tidak mengambil dua jam sebelum atau

OFLOMAC 200

Ofloxacin tablets USP 200mg

selepas mengambil Ofloxacin. Sekiranya anda merasakan kesan ubat anda terlalu lemah atau kuat, jangan ubah dos anda sendiri, tetapi tanyakan kepada doktor anda.

- Bila harus menggunakan

- Tempoh rawatan anda bergantung pada betapa seriusnya jangkitan anda.
- Rawatan tidak boleh melebihi 2 bulan.
- Dos sehingga 400 mg diambil sehari sekali pada waktu pagi.
- Dos yang lebih tinggi harus diambil dalam dua dos, satu pada waktu pagi dan satu pada waktu petang.

Cara mengambil Oflomac 200

Dos

Dewasa (Termasuk warga emas) : Dos yang akan diambil bergantung pada lokasi dan jenis jangkitan yang akan dirawat. Untuk kebanyakan jangkitan, dos yang disyorkan adalah antara 200 mg dan 400 mg Ofloxacin setiap hari, lebih baik pada waktu pagi. Untuk jangkitan yang lebih teruk, doktor anda boleh meningkatkan dos kepada 400 mg Ofloxacin dua kali sehari (pagi dan petang).

Dos yang disyorkan untuk jangkitan yang berbeza ditunjukkan di bawah. Walau bagaimanapun, doktor anda mungkin akan menetapkan jika anda memerlukan dos yang berbeza.

• Jangkitan saluran kencing bahagian bawah

Dos yang disyorkan ialah 200 mg atau 400 mg Ofloxacin setiap hari

• Jangkitan saluran kencing bahagian atas

Peningkatan 200-400 mg setiap hari, jika perlu, menjadi 400 mg dua kali sehari.

• Jangkitan saluran pernafasan

Dos yang disyorkan ialah 400 mg Ofloxacin setiap hari. Sekiranya perlu, doktor anda boleh meningkatkannya kepada 400 mg dua kali sehari.

• Gonorrhea organ bahagian bawah

Dos tunggal 400 mg Ofloxacin pada waktu pagi biasanya cukup. Untuk merawat jangkitan lain pada organ kelamin yang mana Ofloxacin adalah antibiotik yang sesuai, dosnya biasanya 400 mg setiap hari.

• Uretritis dan serviksitis bukan gonococcal

Dos yang disyorkan ialah 400 mg Ofloxacin setiap hari. Sekiranya perlu, doktor anda boleh meningkatkannya kepada 400 mg dua kali sehari.

• Jangkitan kulit & tisu lembut

Dos yang disyorkan ialah 400 mg Ofloxacin dua kali sehari.

Penggunaan pada kanak-kanak & remaja

Kanak-kanak atau remaja di bawah 18 tahun tidak boleh mengambil tablet ini.

- Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda terlupa mengambil dos, ambil segera setelah anda ingat melainkan sudah tiba masanya untuk dos seterusnya. Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda mengambil lebih banyak tablet daripada yang sepatutnya, anda mungkin menjadi keliru dan pening atau hilang kesedaran, anda mungkin mengalami sawan, dan anda mungkin merasa tidak sihat. Segera hubungi doktor atau jabatan casualty hospital anda. Bawa bekas dan baki tablet yang tertinggal bersama anda.

Jika berhenti menggunakan

Doktor anda akan memberitahu anda berapa lama anda perlu mengambil tablet anda. Jangan tiba-tiba berhenti mengambil ubat ini tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu.

Sekiranya anda berhenti, jangkitan anda mungkin bertambah teruk. Sekiranya

anda merasakan kesan ubat anda terlalu lemah atau kuat, jangan ubah dos anda sendiri, tetapi tanyakan kepada doktor anda.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai penggunaan ubat ini, tanyakan kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa menggunakan Oflomac 200

Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada doktor, doktor gigi ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Oflomac 200.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali disuruh oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Oflomac 200 kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Bercakap dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Oflomac 200.

Pengambilan Oflomac 200 boleh membuatkan anda merasa mengantuk, pening atau boleh menjejaskan penglihatan anda. Jangan memandu atau menggunakan mesin sehingga anda mengetahui bagaimana ubat ini menjejaskan anda. Pengambilan alkohol boleh memburukkan lagi symptom ini.

OFLOMAC 200

Ofloxacin tablets USP 200mg

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, OfloMAC 200 boleh menyebabkan masalah kepada anda walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Kesan sampingan sistem penghadaman & hati:

Biasa : Rasa mual dan muntah, cirit-birit, sakit perut, simptom gastrik. (Cirit-birit kadang-kadang merupakan gejala enterokolitis yang, dalam sesetengah kes, boleh menjadi hemoragik).

Jarang : Hilang selera makan, peningkatan enzim hati dan / atau bilirubin.

Sangat jarang : masalah hati, seperti radang hati (hepatitis) atau sumbatan pada saluran empedu, yang boleh menyebabkan mata atau kulit anda menjadi kuning (penyakit kuning)

Sistem saraf

Biasa : Sakit kepala, pening, gangguan tidur, rasa gelisah.

Jarang : Rasa keliru atau cemas, mimpi buruk, melihat, merasakan atau mendengar perkara yang tidak ada, kemurungan dan penyakit mental, pening, rasa gementar, gegaran, pergerakan otot yang tidak biasa (tidak sukarela), neuropati, rasa kebas atau kesemutan di tangan dan kaki atau menjadi sangat sensitif terhadap sentuhan, kekebasan atau kelemahan lengan dan kaki, gangguan visual, gangguan rasa dan bau.

Sangat jarang : masalah pendengaran atau hilang pendengaran, pergerakan yang tidak terkawal, ketidakstabilan dan gegaran, kemurungan yang teruk atau penyakit mental. Sesetengah orang yang tertekan berfikir untuk mencederakan atau membunuh diri sendiri.

Sistem kardiovaskular

Biasa : Denyutan jantung yang cepat & penurunan tekanan darah yang sementara.

Jarang : Penurunan tekana darah yang mendadak.

Hematologi

Sangat jarang : keadaan di mana jumlah pigmen pembawa oksigen (hemoglobin)

dalam darah berada di bawah tahap normal atau penyakit yang disebabkan oleh pemusnahan sel darah merah dengan simptom berikut; berasa letih, pengsan, pening, sesak nafas ketika bersenam dan mempunyai kulit yang pucat.

Ini mungkin tanda-tanda anemia atau anemia hemolitik

Kesan sampingan ginjal

Jarang : Gangguan fungsi buah pinggang
Sangat jarang : Masalah buah pinggang yang teruk, yang boleh mengakibatkan buah pinggang anda berhenti berfungsi. Tanda-tanda mungkin termasuk ruam, suhu badan yang tinggi, sakit badan yang umum dan sakit, atau darah dalam air kencing.

Kesan sampingan alahan & kulit

Biasa: Ruam kulit, gatal-gatal

Jarang : Ruam kulit, yang mungkin melepuh, dan kelihatan seperti sasaran kecil (bintik-bintik gelap di tengah dikelilingi oleh kawasan yang lebih pucat, dengan ruam bentuk cincin yang gelap di sekitar pinggir kulit) (eritema multiforme).

Ruam yang meluas dengan lepuh dan kulit mengelupas di sebahagian besar permukaan badan (nekrolisis epidermis toksik).

Penyempitan, penyumbatan atau kebocoran saluran darah, dalam kes yang luar biasa menyebabkan reaksi kulit yang teruk dan sesetengah permukaan kulit mati. Ruam yang meluas dengan lepuh dan kulit mengelupas, terutama di sekitar mulut, hidung, mata dan alat kelamin (sindrom Stevens Johnson).

Kesan sampingan yang lain

Jarang : Rasa tidak selesa, sakit, atau kegelisahan yang penyebabnya sukar dikenal pasti.

Sangat jarang : Kenaikan mendadak atau penurunan kadar gula dalam darah
Kelemahan, sakit sendi dan otot.

Kes yang sangat jarang berlaku yang berpanjangan (hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun) atau tindak balas

ubat yang kekal, seperti radang tendon, pecah tendon, sakit sendi, sakit pada anggota badan, kesukaran berjalan, sensasi seperti pin dan jarum yang tidak normal, rasa kesemutan, menggelitik, rasa kulit terbakar, kekebasan atau sakit (neuropati), kemurungan, keletihan, gangguan tidur, gangguan ingatan, serta gangguan pendengaran, penglihatan, dan rasa dan bau telah dikaitkan dengan pemberian antibiotik quinolone dan fluoroquinolone, dalam beberapa kes yang terlepas dari faktor risiko yang ada sebelumnya.

Melaporkan kesan sampingan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Medicinal Problems/ Sides Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

Cara penyimpanan dan pelupusan OfloMAC 200

Jangan gunakan ubat anda selepas tarikh luput yang ditunjukkan pada label.

SIMPAN UBAT INI DI TEMPAT SESUAI DI MANA KANAK-KANAK TIDAK BOLEH MELIHAT ATAU MENGELUARKAN UBAT.

Simpan di bawah 30 ° C di tempat yang kering. Lindungi dari cahaya.

Jangan membuang ubat-ubatan dengan air buangan atau sampah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat yang tidak lagi anda gunakan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*

OfloMAC 200 adalah tablet bersalut filem biconvex berbentuk bujur berwarna kuning dengan permukaan kosong di kedua sisi.

OFLOMAC 200

Ofloxacin tablets USP 200mg

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Bahan aktif adalah ofloxacin.

- Bahan tidak aktif

Microcrystalline cellulose, Lactose, Sodium lauryl sulphate, Povidone, Sodium starch glycollate, Crospovidone, Colloidal anhydrous silica, purified talc, magnesium stearate, Isopropyl alcohol, Hypromellose, titanium dioxide, lake quinoline yellow, Polyethylene glycol, Diethyl Phthalate and purified water.

- MAL number(s):

Pengilang

Macleods Pharmaceuticals Ltd
Plot No. 25-27, Survey No. 366,
Premier Ind. Estate,
Kachigam, Daman - 396 210 (U.T.),
India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Zulat Pharmacy Sdn Bhd
23 & 23A Jalan Bandar 3
Taman Melawati
53100 Kuala Lumpur
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

Apr 2021

Nombor Siri NPRA

NPRA(R2/1)210601/686