

QUACE ECZEMA CREAM / OINTMENT

Clobetasol propionate (0.05% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Quace Eczema
2. Bagaimana Quace Eczema berfungsi
3. Sebelum menggunakan Quace Eczema
4. Cara menggunakan Quace Eczema
5. Semasa menggunakan Quace Eczema
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Quace Eczema
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Quace Eczema

Quace eczema Cream dan Ointment melegakan simptom kulit tertentu yang tidak berkesan dengan penggunaan steroid yang kurang poten termasuk:

- Ekzema yang berulang
- Psoriasis (tompok kulit menebal yang radang dan kemerahan, biasanya diliputi dengan sisik berwarna perak)
- *Lichen planus* (penyakit kulit yang menyebabkan kegatalan, ungu kemerahan, benjolan rata pada pergelangan tangan, bawah lengan atau kaki)
- *Discoïd Lupus Erythematosus* (penyakit kulit yang menghasilkan parut dan meningkatkan kepekaan kulit terhadap cahaya matahari terutamanya pada muka, telinga dan kulit kepala)

Bagaimana Quace Eczema berfungsi

Quace Eczema cream atau Ointment mengandungi clobetasol propionate yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai steroid. Steroid membantu mengurangkan kemerahan, bengkak dan kerengsaan kulit.

Sebelum mengguna Quace Eczema

- Bila tidak boleh menggunakan

Beritahu doktor anda jika anda alah (hipersensitif) kepada clobetasol propionate atau sebarang bahan lain yang disenaraikan di hujung risalah.

Jangan gunakan Quace Eczema Cream atau Ointment untuk merawat sebarang masalah kulit yang berikut, ia boleh menjadi lebih teruk:

- Jangkitan kulit (kecuali jangkitan tersebut sedang dirawat dengan antibiotik pada masa yang sama)

Sekiranya anda rasa anda mempunyai mana-mana keadaan ini, jangan gunakan Quace Eczema Cream atau Ointment sehingga anda telah rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Sebelum menggunakan Quace Eczema

Sekiranya anda hamil, atau rasa anda mungkin hamil, atau jika anda merancang untuk mengandung, jangan gunakan Quace Eczema Cream atau Ointment tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu.

Sekiranya anda sedang menyusukan bayi, anda mesti rujuk kepada doktor anda sebelum menggunakan Quace Eczema Cream atau Ointment.

Jika anda menggunakan Quace Eczema semasa menyusukan bayi, jangan sapu Quace Eczema pada payudara anda untuk memastikan bayi tidak termakan Quace Eczema.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sesetengah ubat boleh menjejaskan kesan Quace Eczema Cream atau Ointment atau menyebabkan anda lebih mudah mendapat kesan sampingan.

Walau bagaimanapun, tiada interaksi berbahaya yang telah dilaporkan.

- Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan Quace Eczema Cream atau Ointment sebagaimana doktor anda arahkan. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

- Sapukan satu lapisan yang nipis dan gosok dengan ringan dan perlahan, hanya gunakan kuantiti yang cukup untuk kawasan yang terjejas.
- Basuhkan tangan anda selepas sapuan kecuali tangan yang dirawat.
- Sekiranya anda juga menggunakan emolien (pelembab), tunggu sekejap selepas setiap penggunaan supaya Quace Eczema diserap sebelum sapuan emolien.

Doktor anda mungkin mencadangkan untuk mengurangkan kekerapan penggunaan Quace Eczema apabila ekzema anda terkawal, untuk mencegah ekzema berulang.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Sapukan Quace Eczema Cream atau Ointment sekali atau dua kali sehari. Kekerapan penggunaan ubat anda boleh dikurangkan atau doktor anda mungkin mempreskripsikan steroid yang kurang poten untuk anda semasa kulit anda bertambah baik.

- Berapa lama perlu digunakan

Jangan berhenti menggunakan Quace Eczema atau Ointment tanpa nasihat doktor. Sekiranya anda menggunakan Quace Eczema dengan kerap, anda haruslah memaklumkan doktor anda sebelum berhenti menggunakannya.

Hanya gunakan Quace eczema cream atau ointment untuk tempoh yang disarankan oleh doktor anda. Sekiranya keadaan anda tidak bertambah baik dalam masa 2-4 minggu selepas rawatan, berbincanglah dengan doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda terlupa menggunakan Quace Eczema Cream atau Ointment, gunakannya sebaik sahaja anda ingat kemudian teruskan seperti biasa.

Jangan gunakan Quace Eczema tambahan untuk mengganti dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebi dos)

Sekiranya anda menyapu terlalu banyak Quace Eczema atau menelan Quace Eczema secara tidak sengaja, itu boleh membuat anda tidak sihat. Sekiranya anda tertelan Quace Eczema, bilas mulut anda dengan air yang banyak dan hubungi doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat.

Semasa menggunakan Quace Eczema

- Perkara yang perlu dilakukan

-
- Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat anda dan menggunakannya seperti yang dipreskripsikan oleh doktor anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini hanya dipreskripsikan untuk anda sahaja. Jangan berikannya kepada orang lain. Ia boleh menjejaskan kesihatan mereka, walaupun gejala-gejala mereka adalah sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Berhati-hati ketika menyapu Quace Eczema pada kelopak mata supaya ia tidak termasuk ke dalam mata anda.
- Berhati-hati semasa menyapu Quace Eczema pada muka untuk tempoh masa yang panjang kerana ia boleh menyebabkan penipisan kulit.

- Hanya gunakan pembalut luka yang oklusif (kedap udara) jika diarahkan oleh doktor anda. Sekiranya anda menggunakan Quace Eczema di bawah pembalut luka yang kedap udara, termasuk lampin kanak-kanak, pastikan kulit dibersihkan sebelum pembalut baharu digunakan untuk mencegah jangkitan.

Hubungi doktor anda jika jangkitan berlaku. (Lihat Kesan-kesan Sampingan).

Jika anda mengalami penglihatan yang kabur atau gangguan visual lain, berbincanglah dengan doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Quace Eczema Cream atau Ointment boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan akan menjejaskan kulit dan bahagian tubuh anda yang lain jika kuantiti ubat yang mencukupi diserap melalui kulit dan memasuki aliran darah anda.

Jika masalah kulit anda menjadi lebih teruk atau jika kulit anda bengkak semasa rawatan, anda mungkin alah kepada ubat ini, mengalami jangkitan atau memerlukan rawatan yang lain.

Berhenti menggunakan Quace Eczema Cream atau Ointment dan rujuk kepada doktor anda dengan segera.

Kesan sampingan paling kerap berlaku

- Rasa kulit terbakar atau menyengat

Kesan-kesan sampingan yang tidak kerap berlaku

- Kegatalan
- Penipisan kulit

- Keretakan & rekahan kulit

Kesan-kesan sampingan yang lain

- Kerengsaan
- Kekeringan kulit
- Jangkitan folikel rambut
- Pertumbuhan rambut yang berlebihan
- Jerawat
- Kehilangan warna kulit
- Ruam meradang di sekitar mulut
- Tindak balas alahan yang menyebabkan ruam merah, gatal
- Kulit menjadi lembut & pecah
- Jangkitan sekunder
- Tanda regangan
- Ruam panas
- Sindrom *Cushing* (pertambahan berat badan, muka sembab, pengumpulan lemak di antara bahu)
- Peningkatan paras gula dalam darah
- Kehadiran gula dalam kencing

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika mana-mana kesan sampingan bertambah teruk atau menyusahkan, atau jika anda mendapati sebarang kesan sampingan yang tidak tersenarai dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicine (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Quace Eczema

- Penyimpanan

Jauhkan daripada capaian dan penglihatan kanak-kanak.

Jangan gunakan Quace Eczema Cream atau Ointment selepas tarikh luput pada tiub, atau karton (Exp).

Simpan di tempat yang kering dan di bawah 30 °C. Jangan bekukan.

- Pelupusan

Jangan lupuskan ubat-ubatan melalui sisa air atau sisa-sisa buangan isi rumah. Rujuk kepada ahli farmasi anda cara- cara pelupusan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah- langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Quace Eczema cream atau ointment adalah krim putih, licin dan tanpa bau.

Quace Eczema Cream dan Ointment dibungkus dalam tiub aluminium yang boleh dilipat.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Clobetasol propionate

- Bahan tidak aktif

Cream:

Chlorocresol 0.10% w/w, Disodium hydrogen phosphate, glyceryl monostearate, glycerin, Isopropyl myristate, propylene glycol, Tween 40, stearic acid, purified water.

Ointment:

Microcrystalline Wax, Cetostearyl alcohol, liquid paraffin, white soft paraffin

- Nombor MAL

- Quace Eczema Cream
MAL11010001AZ

- Quace Eczema Ointment
MAL09072750AZ

Pengilang

Torrent Pharmaceuticals Ltd

Plot No. 810, Sector III, Industrial Area, Pithampur, District Dhar - 454 775 (M.P.) INDIA

Pemegang Pendaftaran Produk

Zulat Pharmacy Sdn Bhd

No 23A, Jln Bandar 3, Tmn Melawati, 53100 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

13/09/2021

Nombor siri:

NPRA(R4/1)170821/00067